



Spendetauglichkeitskriterien – Blutstammzellspende

Dokumentation und allgemeine Grundsätze

Die Spendetauglichkeitskriterien-Blutstammzellspende sind die Grundlage für die Sicherheit von Spenderin und Empfänger und sind verbindlich. Sie gelangen im gesamten Verlauf des Prozesses Blutstammzellspende inkl. Lymphozytenspende (DLI) zur Anwendung (Registrierung, Kontrolltypisierung, Medical CheckUp).

Die Kriterien werden unter Beachtung der national und international verbindlichen Gesetze, Standards und Richtlinien verfasst und regelmässig von der zuständigen Fachgruppe aktualisiert.

Die Kriterien sind alphabetisch aufgelistet. Die Datei ist über die Vorschriften-Website der Blutspende SRK Schweiz (vorschriften.blutstammzellspende.ch) zugänglich. Ergänzt wird diese Datei durch weitere Dokumente der Vorschriften Blutspende SRK Schweiz und SBSC wie

- [Online Travelcheck](#) oder [Anhang Art. 7.2](#), Travelcheck: Länder oder Gebiete mit Infektionsrisiken
- [Online Impfcheck](#) oder [Anhang Art. 7.3](#), Vaccine Check: Überprüfung der Impfung
- [Anhang Art. 7.1](#), Medikamente: Rückweisungsfristen bei / nach Einnahme von Medikamenten
- 1413_DOK_Classification_Risk_Behaviour
- 1407_DOK_Procedure_Malaria_CT_MC

Zusätzlich sind für die Risikobeurteilung übertragbarer Krankheiten **aktuelle SBSC- oder BSD-Beschlüsse mit zu berücksichtigen** ([Beschlüsse SBSC](#); [Beschlüsse BSD](#)).

Die Spendetauglichkeit wird durch ausgebildetes Personal unter der Verantwortung einer Ärztin/eines Arztes (SBSC, RBSD, Entnahmezentrums) ermittelt. Zeigen sich bei der Befragung / Untersuchung Hinweise oder Befunde, welche die Spendetauglichkeit in Frage stellen, so müssen diese anhand der Kriterien interpretiert und beurteilt werden. Bei Rückweisung oder Ausschluss muss die Spenderin/der Spender eine detaillierte Erklärung über den Grund der Rückweisung erhalten.

Wenn Zweifel über die Spendetauglichkeit bestehen oder ein gesundheitliches Risiko für Spenderin oder Empfänger vermutet oder erkannt wird, dass in den Kriterien nicht oder ungenügend beschrieben ist, entscheidet die zuständige Ärztin. Bei Unklarheiten kann mit dem medizinischen Dienst SBSC Rücksprache gehalten werden.

Spenderschutz / Patientenschutz

Es liegt in der Verantwortung von SBSC und den Entnahmezentren, die Spenderinnen vor Risiken im Zusammenhang mit einer Spende zu schützen. Daher müssen die Spendetauglichkeitskriterien im Falle eines **spenderseitigen** Risikos strikt eingehalten werden.

Bei Situationen, in welchen der Spender vom Entnahmezentrum als spendefähig beurteilt wird, aber ein **Risiko für die Patientin** besteht, (z.B. Aufenthalt des Spenders in einem Malaria-Risikogebiet), kann ein gewisser Spielraum bezüglich Anwendung der Spendetauglichkeitskriterien, d.h. eine Ausnahmeregelung möglich sein (z.B. Verkürzung der Rückweisungsfrist nach Auslandsaufenthalt). Jeder Fall muss individuell überprüft und beurteilt werden.

Allfällige Ausnahmeregelungen müssen mit dem medizinischen Dienst SBSC besprochen werden. Das Auftrag gebende Register / Transplantationszentrum wird durch SBSC über das Risiko informiert und in die Entscheidung über das weitere Vorgehen eingebunden. Es liegt in der Verantwortung des transplantierenden Arztes, ein Risiko für einen Patienten anzunehmen oder abzulehnen (2097_FOR_Declaration_Risk_Acceptance).

Nr: 1410	Name: DOK_Donor_Eligibility_Criteria_Blood_Stem_Cell_Donation_D	Version: 10.0	Gültig ab: 14.08.2026
			Seite: 1 von 191



In diesem Dokument verwendete Terminologie

Ausschluss	Zeitlich unlimitierte Massnahme. Die Spenderin/der Spender scheidet aus dem Register aus und muss in einer für ihn verständlichen Form informiert werden
Rückweisung	Zeitlich limitierte Massnahme. Die Spenderin/der Spender muss wissen, wann und wie er wieder zugelassen wird
Akzeptieren	Die Spenderin/der Spender wird zur Registrierung als Blutstammzellspender, zur Kontrolltypisierung oder zum Medical CheckUp zugelassen
Gehe zu	Muss konsultiert werden – dort ist das gesuchte Vorgehen zu diesem Kriterium zu finden (gleiches Vorgehen)
Siehe auch	Kann bei Bedarf konsultiert werden
Zu beachten	Besonderer Hinweis, der beim betreffenden Kriterium beachtet werden muss
Ergänzung	Entscheidungshilfe
CT / VT	Kontrolltypisierung (Confirmatory Typing / Verification Typing)
MC	Medical CheckUp
EZ / TZ	Entnahmezentrum / Transplantationszentrum



Abort	Definition	Schwangerschaftsabbruch, Fehlgeburt
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung ab Abbruchdatum für Anzahl Monate der Schwangerschaft (Schwangerschaft vor Ende der 28. Woche) Rückweisung für 12 Monate, falls Schwangerschaftsabbruch im 3. Quartal (> 28 Wochen)
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Operation / Eingriff_1_allgemein

Abszess	Definition	Jegliche Art von Abszess, z.B. Haut-, Zahnabszess
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 1 Woche nach Abschluss systemischer Antibiotikabehandlung und bis zur vollständigen Genesung
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Operation / Eingriff_2_klein Operation / Eingriff_3_mittel Operation / Eingriff_4_gross

Acicutan	Gehe zu	Teratogene Medikamente
-----------------	---------	------------------------



ADS / ADHS	Definition	Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (ADS), Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) Verhaltens- und emotionale Störung mit Beginn in der Kindheit oder Jugend. Es bestehen Probleme mit Aufmerksamkeit, Selbstregulation und Impulsivität. Beim ADHS liegt zusätzlich eine übermässige körperliche Unruhe vor. Die Symptome können allerdings sehr unterschiedlich ausgeprägt sein und müssen nicht gleichzeitig auftreten. Hyperaktivität geht meist mit zunehmendem Alter zurück.
	Registrierung	Akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • Zustand des Spenders stabil ist (unabhängig von medikamentöser Behandlung) • Spender einwilligungsfähig ist • Er/sie versteht den Prozess der Spende und kann die Verpflichtung eingehen
	CT / VT	Wie Registrierung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt
	MC	Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin

AIDS	Gehe zu	HIV-Infektion
-------------	---------	---------------

Akne	Definition	Erkrankung des Talgdrüsenapparates und der Haarfollikel mit Bildung von zunächst nicht entzündlichen Komedonen (Mitesser), im weiteren Verlauf entzündliche Effloreszenzen wie Papeln, Pusteln und Knoten. Behandlung je nach Schweregrad lokal oder systemisch
	Zu beachten	Information an Transplantationszentrum TZ
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren wenn Spender bereit ist / es möglich ist, eine medikamentöse Behandlung vor der Spende abzusetzen
	MC	Wie CT / VT Absetzen 4 Wochen vor Entnahme bei Anwendung von oralem Isotretinoin (Curakne®, Roaccutan®, Tretinac®), Tretinoin (Vesanoid®), oder Alitretinoin (Toctino®) Absetzen 2 Wochen vor Entnahme bei Anwendung von topischen Retinoiden (Roaccutan® Gel, Differin®) und/oder oralen Antibiotika
	Siehe auch	Akne inversa



Akne inversa	Definition	Chronische Hauterkrankung mit schmerzhaften knotigen Entzündungen, die sich zu Abszessen und Fisteln weiterentwickeln können. Betroffene Körperregionen sind v.a. Achselhöhlen, Leistenregion, Genital- und Analregion. Behandlung je nach Schweregrad medikamentös und/oder operativ.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren bei milder Form mit einzelnen lokalen, nicht flächigen Entzündungen Nicht akzeptieren bei: <ul style="list-style-type: none"> • Flächigem Befall • Fistelbildung • Systemischer Therapie Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT

Akromegalie	Definition	Endokrinologische Erkrankung. Vergrößerung der Akren (Endglieder, vorspringende Körperteile z.B. Kinn) aufgrund Überproduktion des Wachstumshormons Somatotropin. Ursache meist gutartiger Tumor der Adenohypophyse (Hirnanhangdrüse)
	Registrierung	Akzeptieren, wenn Tumor erfolgreich entfernt ist und keine medikamentöse Therapie nötig ist
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung



Akupunktur	Definition	Behandlungsmethode der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) durch Einstechen steriler Nadeln an bestimmten Punkten des Körpers
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • Akupunktur in der Schweiz durchgeführt wurde • Kein Zweifel an steriler Arbeitstechnik und Verwendung von Einwegmaterial besteht • Kein Hinweis auf eine (bakterielle) Infektion besteht <p>Rückweisung für 1 Monat wenn Akupunktur in einem Land mit erhöhtem Infektionsrisiko durchgeführt wurde</p>
	MC	Akzeptieren 48 Stunden nach Behandlung, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • Akupunktur in der Schweiz durchgeführt wurde • Kein Zweifel an steriler Arbeitstechnik und Einwegmaterial besteht • Kein Hinweis auf eine (bakterielle) Infektion besteht <p>Rückweisung für 2 Monate nach Behandlung wenn Akupunktur in einem Land mit erhöhtem Infektionsrisiko</p>
	Siehe auch	Neurofibromatose (NF)
Akustikusneurinom	Definition	Gutartiger Tumor ausgehend von Zellen der Nervenhülle des 8. Hirnnerven (Nervus vestibulocochlearis, Gleichgewichtsnerv) (Schwann'sche Zellen), Synonym: Vestibularis-schwannom
	Registrierung	Akzeptieren, wenn operativ vollständig entfernt oder bestrahlt, ohne relevante Residuen
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Neurofibromatose (NF)
Alitretinoin	Gehe zu	Teratogene Medikamente



Alkoholkonsum	Zu beachten	„Urteilsfähigkeit“ kann unter Alkoholeinfluss beeinträchtigt sein (Einverständniserklärung)
	Registrierung	Nicht akzeptieren wenn: <ul style="list-style-type: none">• Spender regelmässig/permanent unter Alkoholeinfluss ist• Spender sich selbst als Alkoholiker bezeichnet• Konsum von > 40 Einheiten/Woche• Spender in Entzugsprogramm (Antabus) Eine Einheit Alkohol entspricht: <ul style="list-style-type: none">• 1 Glas Bier mit 5 % (2.5 dl)• 1 Glas Wein oder Champagner mit 12 % (1 dl)• 1 Glas Aperitif mit 20 % (6 cl)• 1 Glas Wodka oder Whisky mit 40 % (3 cl)• 1 Glas Alkopop/Premix mit 5 % (2.5 dl).
	CT / VT	Wie Registrierung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Drogengebrauch



Allergie	Definition	Krankhafte Reaktion des Immunsystems auf Allergene (z.B. Medikamente, Nahrungsmittel, Bienen- /Wespenstich etc.) <u>Gradeinteilung für <i>akute Reaktionen</i>:</u> Grad 1: Juckreiz, Rötung, Urtikaria, Schwellung Grad 2: Grad 1, Heiserkeit, Luftnot, Übelkeit, Erbrechen, Anstieg der Herzfrequenz, Blutdruckabfall, Rhythmusstörung Grad 3: Grad 1, Erbrechen, Schwellung der Atemwege, Bronchospasmus, Schock Grad 4: Grad 1, Erbrechen, Atemstillstand, Kreislaufstillstand.
	Zu beachten	Bei Allergie immer EZ und TZ informieren. Schwerwiegende Reaktionen auf Medikamente, v.a. Anästhetika, besonders beachten !!
	Registrierung	Akzeptieren bei Grad 1 mit / ohne Behandlung: <ul style="list-style-type: none"> • nur lokale Behandlung/nur bei Anfall / nur Inhalationstherapie Nicht akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • Grad 2 - 4 Reaktionen • regelmässige perorale Behandlung notwendig • anaphylaktische Reaktion bekannt
	CT / VT	Akzeptieren bei Grad 2, wenn einmaliges Ereignis bei bekanntem Allergen, welches nicht kritisch ist für Mobilisierung/Entnahme Nicht akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • Grad 3 - 4 Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	Siehe auch	Arzneimittel-behandlung Asthma (bronchiale) Desensibilisierung Ekzem Heuschnupfen Nahrungsmittelallergie Urtikaria



Alloantikörper, anti-erythrozytäre	Zu beachten	Bei Vorliegen von anti-erythrozytären Alloantikörpern TZ immer informieren
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren
	MC	Akzeptieren

Alocapil	Gehe zu	Teratogene Medikamente
-----------------	---------	------------------------



Alopezie	Definition	<p>Krankhafter Haarausfall, Alopezie, kann angeboren oder erworben, diffus, herdförmig oder total sein.</p> <p>Formen:</p> <p><u>Diffuse Alopezie</u>: Fortschreitender Haarausfall auf dem gesamten Kopf, Symptom verschiedener Störungen des Gesamtorganismus (z.B. schwere Allgemeinkrankheit, Hormonschwankungen, Schilddrüsenerkrankung, Vitamin-/Eisenmangel, Infektionskrankheiten, Medikamente, Stress)</p> <p><u>Alopecia androgenetica</u>: androgenetischer Haarausfall, erblich/hormonell bedingt. Überempfindlichkeit der Haarfollikel auf Androgene, ca. 80% der Männer betroffen. Behandlung mit Finasterid (beim Mann)</p> <p><u>Alopecia areata</u>: Kreisrunder Haarausfall. Lokal begrenzte, entzündliche Haarausfall-Erkrankung, whs Autoimmunerkrankung</p>
	Registrierung	<p>Akzeptieren, wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeinzustand dies erlaubt bei <u>diffuser Alopezie</u> • Absetzen einer allfälligen medikamentösen Behandlung für die Zeit der Spende möglich ist bei <u>Alopecia androgenetica</u> <p>Nicht akzeptieren bei Alopecia areata</p>
	CT / VT	<p>Nicht akzeptieren bei systemischer Immunsuppressiver Therapie</p> <p>Bei Einnahme von teratogenen Medikamenten siehe Kriterium Teratogene Medikamente) (z.B. Alocapil®, Finacapil®, oder Propecia®)</p> <p>Alopecia areata: Nur BM Spende, Info an TZ</p> <p>Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin</p>
	MC	<p>Wie CT / VT</p> <p>Bei Alopecia areata: risk acceptance durch TZ</p>
	Siehe auch	Autoimmunerkrankung



Alpha-1-Antitrypsinmangel (A1AT)	Definition	Autosomal-rezessive Erbkrankheit. Stoffwechselerkrankung mit verminderter Bildung von Alpha-1-Antitrypsin (Proteasainhibitor, hemmt verschiedene Enzyme, die bei Entzündungsprozessen freigesetzt werden, ungehinderte Proteolyse). Auswirkungen v.a. in Leber und Lunge. Leber: Alpha-1-Antitrypsin-sekretion reduziert, akkumuliert in Leberzellen -> Zellschaden -> Zirrhose (bis 40%) und Leberversagen (ca.15%) Lunge: Zerstörung des Lungengerüsts durch ungehemmte Leukozytenelastase -> progredientes Lungenemphysem
	Registrierung	Akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> keine Symptome von Seiten Leber und Lunge asymptomatischer Trägerstatus
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung

Alport-Syndrom	Definition	Vererbare chronisch progrediente Nephropathie mit Nierenversagen. 80% x-chromosomal-dominant vererbt, ca. 10% autosomal rezessiv, ca. 10% Neumutationen. Folge: defekte Kollagenfasern des Typ IV, das in den Basalmembranen des Innenohres und der Niere vorkommt -> Innenohrschwerhörigkeit und chronisch progrediente Niereninsuffizienz, auch Augenveränderungen möglich.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss

Amöbiasis	Definition	Amöbenruhr. Infektion des Darmes durch Amöben der Art Entamoeba histolytica. Behandlung mit Antibiotika (Metronidazol, Tetrazykline) sowie Chloroquin.
	Registrierung	Rückweisung für 6 Monate nach Ende der Behandlung falls viszeral Rückweisung bis zur vollständigen Genesung und Ende der Behandlung falls intestinal
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung



Amyotrophe Lateralsklerose, ALS

Definition	Nicht heilbare degenerative Erkrankung des motorischen Nervensystems.
Registrierung	Nicht akzeptieren
CT / VT	Ausschluss
MC	Ausschluss

Analfissur

Definition	Schmerzhafter Einriss der Haut- oder Schleimhaut des Anus, kann akut oder chronisch auftreten.
Registrierung	Akzeptieren
CT / VT	Rückweisung bei florider Entzündung
MC	Wie CT / VT
Siehe auch	Operation / Eingriff_2_klein Proktitis

Anämie

Definition	Blutarmut, Blutmangel. Verminderung der Hämoglobin-Konzentration im Blut unter die alters- und geschlechtsspezifische Norm. Einteilung nach Morphologie der Erythrozyten, akut / chronisch, angeboren oder erworben.
Zu beachten	Immer Ursache der Anämie abklären. Keine Spende im anämischen Zustand. Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt.
Siehe auch	Anämie, aplastische Anämie, Eisenmangel Anämie, hämolytische Anämie, Vit B12- oder Folsäuremangel Sichelzellanämie Sphärozytose, hereditäre Thalassämie



Anämie, aplastische	Definition	Sonderform der Anämie. Störung der Knochenmarksfunktion mit Panzytopenie aufgrund angeborener oder erworbener Knochenmarksaplasie. <ul style="list-style-type: none"> • angeboren: Fanconi-Anämie, Diamond-Blackfan-Syndrom • erworben: idiopathisch, medikamentös, Toxine, ionisierende Strahlung, Viren
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss

Anämie, Eisenmangel	Definition	Verminderte Hämoglobinkonzentration aufgrund Verminderung des physiologischen Eisenspiegels. Häufigste Anämieform, ca. 80% der Betroffenen sind Frauen (Menstruation, Schwangerschaft, Laktation). Häufigste Ursache: Eisenverlust durch (chronische) Blutungen. Weiter mangelhafte Zufuhr mit der Ernährung, verminderte/gestörte Eisenresorption. Ausschluss chronischer Blutungen (Blutungsquelle) und Tumorerkrankungen!
	Zu beachten	Keine Spende in anämischem Zustand. PBSC ist vorzuziehen.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren, wenn Spender eisensubstituiert ist und Hb-Wert im Normbereich Ursache eruieren und wenn nötig behandeln Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Hämoglobin

Anämie, hämolytische	Definition	Vorzeitige Destruktion der Erythrozyten durch (Auto-) Immunprozess, mechanisch bedingt oder als Folge einer vererbten Erkrankung.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss



Anämie, Vit B12- oder Folsäuremangel	Definition	Mangel an Vitamin B12 durch i.d.Regel über Jahre mangelnde Zufuhr oder Aufnahme. Folge u.a. eine megaloblastäre Anämie. <ul style="list-style-type: none"> • ungenügende Zufuhr: ernährungsbedingt • reduzierte Aufnahme: Magenveränderungen (Fehlen von Intrinsic-Factor z.B. durch chron. Gastritis, Magenoperation, Helicobacter-Infektion), entzündliche Darmerkrankung, Darmresektion, • erhöhter Bedarf: z.B.Schwangerschaft
	Zu beachten	Keine Spende in anämischem Zustand. PBSC ist vorzuziehen.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren, wenn Spender Vit.B12-substituiert ist und Hb-Wert im Normbereich Ursache eruieren und wenn nötig behandeln Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT
Anaphylaxie	Gehe zu	Allergie
Anästhesie	Gehe zu	Operation / Eingriff_1_allgemein
Anfälle, psychogen	Definition	Plötzlich auftretende Wesensveränderung
	Registrierung	Ursache und psychische Stabilität abklären
	CT / VT	Ursache und psychische Stabilität abklären Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT
Angina	Gehe zu	Tonsillitis akut
Angina pectoris	Gehe zu	Kardiovaskuläre Erkrankung



Angioid streaks	Definition	Auch Knapp streaks oder Knapp striae genannt. Kleine Brüche in der Bruch-Membran (eine elastische Membran der Retina), bilateral, durch Kalzifikation. Häufig assoziiert mit: Pseudoxanthoma elasticum, Ehlers-Danlos Syndrom, Paget's disease, Sichelzellanämie, andere Hämoglobinopathien u.a.m
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
	Siehe auch	Ehlers-Danlos Syndrom Sichelzellanämie
Anorexie	Gehe zu	Essstörung
Anosmie / Parosmie / Ageusie im Verlauf einer COVID-19 Infektion	Gehe zu	Infekt der oberen Atemwege
Antabus	Gehe zu	Alkoholkonsum
Antikoagulation	Definition	Medikamentöse Hemmung der Blutgerinnung
	Zu beachten	Immer Ursache der Einnahme abklären
	Registrierung	Nicht akzeptieren solange Einnahme. Je nach zugrundeliegender Krankheit. ev. Registrierung nach Absetzen
	CT / VT	Nicht akzeptieren solange Einnahme. Akzeptieren je nach zugrunde liegender Krankheit und wenn Absetzung bis zur Entnahme möglich.
	MC	Wie CT / VT
Siehe auch	Kardiale Erkrankung Kardiovaskuläre Erkrankung Medikamentenliste Phlebothrombose Vaskuläre Erkrankung, arteriell	



Apoplexie	Gehe zu	Zerebrovaskuläre Erkrankung
Appendektomie	Gehe zu	Operation / Eingriff_3_mittel
Arteriosklerose	Siehe auch	Kardiovaskuläre Erkrankung Zerebrovaskuläre Erkrankung
Arthritis, infektiös	Definition	Infektion des Gelenkes direkt (posttraumatisch, iatrogen bei Operationen oder Injektionen) oder hämatogen
	Registrierung	Rückweisung für 2 Wochen nach Abschluss der Therapie und bis zur vollständigen Genesung
	CT / VT	Wie Registrierung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT
Arthritis, nicht infektiös	Definition	Entzündliche Gelenkerkrankung des rheumatischen Formenkreises, Autoimmunerkrankung. Dazu gehören u.a.: <ul style="list-style-type: none"> • Rheumatoide Arthritis • Psoriasis Arthritis • (Juvenile) Polyarthritis
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss



Arthrose	Definition	Degenerative Gelenkerkrankung
	Registrierung	Akzeptieren, wenn keine relevante Einschränkung im alltäglichen Leben
	CT / VT	Akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • keine akute Phase • keine relevante Einschränkung im alltäglichen Leben
	MC	Akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • keine akute Phase • Lokalisation der Arthrose mit der Entnahmetechnik vereinbar ist • Spende physisch möglich ist Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
Arthroskopie	Definition	Gelenkspiegelung
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 1 Monat oder je nach Befund
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Operation / Eingriff_2_klein Operation / Eingriff_3_mittel
Arzneimittelallergie	Gehe zu	Allergie



Arzneimittel-behandlung	Registrierung	<p>Akzeptieren, wenn der Spender bei ärztlich verordneter medikamentöser Therapie gut eingestellt / stabil ist (z.B. Blutdruck, Diabetes)</p> <p>Nicht akzeptieren bei schwerer, chronischer Krankheit als Grund für die Einnahme</p> <p>Bei gewissen Medikamenten, die z.B. Teratogene enthalten, muss der Spender bereit sein/es möglich sein, das Medikament im Fall einer Spende für eine bestimmte Zeit abzusetzen (z.B. Vit-A-Derivate, Finasteride, Vismodegib etc.)</p> <p>Grund für die Medikamenteneinnahme prüfen</p> <p>Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin</p>
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Medikamentenliste
<hr/>		
Asperger Syndrom	Definition	Tiefgreifende Entwicklungsstörung und Autismus-Spektrum-Störung mit Beeinträchtigung der sozialen Interaktion und Empathie im Vordergrund. Normal bis hoher IQ, Inselbegabungen, normale, oft frühzeitige Sprachentwicklung
	Registrierung	<p>Akzeptieren, wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spender urteils- und einwilligungsfähig ist und • den Prozess der Spende versteht • Zustand des Spenders stabil ist (unabhängig von medikamentöser Behandlung) <p>Wichtig: Erfragung von Arbeitssituation, Einschränkungen im Alltag</p>
	CT / VT	<p>Wie Registrierung , erneute Einschätzung des Zustandes und allfälliger Einschränkungen</p> <p>Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt</p>
	MC	<p>Wie CT / VT</p> <p>Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin</p>



Aspirin®, Aspirin Cardio®	Definition	Acetylsalicylsäure
	Registrierung	Akzeptieren, wenn sporadische oder präventive Einnahme (ohne manifeste koronare Herzkrankheit) Grund für Einnahme prüfenErmessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Kardiovaskuläre Erkrankung Medikamentenliste
Asthma (bronchiale)	Definition	Chronische, entzündliche Erkrankung der Atemwege charakterisiert durch variable, wiederkehrende Beschwerden, reversibler Atemwegsobstruktion und Bronchospasmen. Auslösung durch eine Vielzahl von Reizen (allergisch / nicht allergisch, infektiös)
	Zu beachten	Asthmatiker haben ein höheres Risiko bei Spende, insbesondere durch Anästhesie.
	Registrierung	Akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • Behandlung mit Inhalativa allein ausreichend (auch in Kombination, inkl. Kortikosteroide) • Inhalativa präventiv Nicht akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • Asthma-Anfälle häufig • Regelmässige perorale Therapie notwendig (Theophyllin, orale Kortikosteroide, Leukotrien-antagonist) • Wiederholte stationäre Behandlung • Spender jemals wegen Asthma-Anfall auf der Intensivstation behandelt werden musste
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
Atriumseptumdefekt (ASD)	Gehe zu	Kardiale Erkrankung



Augenlaserbehandlung	Definition	Methode zur Behandlung von Fehlsichtigkeit
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung
	MC	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung
	Siehe auch	Netzhautablösung Operation / Eingriff_1_allgemein Sehfehlerkorrektur, operativ

Augenvenenthrombose	Gehe zu	Zentralvenenthrombose
----------------------------	---------	-----------------------

Auslandsaufenthalt	Siehe auch	Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, Risiko 7_Grossbritannien-Aufenthalt Länderliste
---------------------------	------------	---

Autismus	Gehe zu	Asperger Syndrom
-----------------	---------	------------------



Autoimmunerkrankung	Definition	Überschiessende Reaktion des Immunsystems gegen körpereigenes Gewebe. Reaktion kann durch G-CSF verstärkt / ausgelöst werden. Dies betrifft beispielsweise folgende Erkrankungen: <ul style="list-style-type: none"> • Blut: Autoimmunhämolytische Anämie • chronisch entzündliche rheumatische Erkrankungen (z.B. Spondylitis ankylosans / M. Bechterew, Reiter-Syndrom) • chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (z.B. M. Crohn, Colitis ulcerosa, siehe auch Zöliakie) • Haut & Haare: Lichen sclerosus, Sklerodermie, Pemphigus, Alopecia areata, Sjögren-Syndrom • Nieren: Glomerulonephritis • Schilddrüse: siehe auch Hashimoto-Thyreoiditis / Schilddrüsenerkrankung • ZNS: Guillain-Barré-syndrom, Multiple Sklerose, Myasthenia gravis • Systemerkrankungen: Sarkoidose, Systemischer Lupus erythematodes (SLE)
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
	Siehe auch	Hashimoto Thyreoiditis Schilddrüsenerkrankung Zöliakie
Avodart	Gehe zu	Teratogene Medikamente



Babesiose	Definition	<p>Infektionskrankheit verursacht durch Babesien, kleine intrazelluläre Parasiten. Übertragung durch Zeckenbiss, Symptomatik ähnelt der Malaria. Auch bei Tieren auftretend (z.B. Hund, Schaf, Ziege, Reh).</p> <p>Parasiten befallen die Erythrozyten > mehr oder weniger ausgeprägte Hämolyse.</p> <p>Kongenitale Übertragung möglich.</p>
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Bakteriurie, asymptomatisch	Definition	Nachweis von Bakterien im Urin ohne Symptome eines Harnwegsinfekts
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
Bänderriss, Operation	Gehe zu	Operation / Eingriff_2_klein
Bandwurm	Gehe zu	Echinokokkose
Barrett-Oesophagus	Definition	Umwandlung der Schleimhaut am Übergang der Speiseröhre in den Magen. Erkrankung tritt häufig im Zusammenhang von gastroösophagealem Reflux auf. Präkanzerose für ein Adenokarzinom des Ösophagus.
	Registrierung	<p>Akzeptieren bei Barrett-Mukosa ohne Dysplasien</p> <p>Nicht akzeptieren bei Barrett-Mukosa mit Dysplasien</p>
	CT / VT	<p>Wie Registrierung</p> <p>Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin</p>
	MC	<p>Wie Registrierung</p> <p>Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin</p>



Basaliom	Definition	Semimaligner Hautkrebs (lokal destruktiv, metastasiert nicht)
	Registrierung	Nicht akzeptieren, wenn unter Behandlung mit Vismodegib (Erivedge®). Registrierung erst 2 Jahre nach Absetzen der Behandlung
	CT / VT	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung nach Exzision Nicht akzeptieren, wenn unter Behandlung mit Vismodegib (Erivedge®). CT erst 2 Jahre nach Absetzen der Behandlung.
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Operation / Eingriff_1_allgemein Teratogene Medikamente

Bechterew-Krankheit	Gehe zu	Spondylitis ankylosans
----------------------------	---------	------------------------

Betablocker	Definition	Blutdrucksenkendes Arzneimittel, Anwendung bei Bluthochdruck, Herzschwäche, Angina pectoris, Herzrhythmusstörungen u.v.m
	Zu beachten	Ursache der Einnahme feststellen
	Registrierung	Akzeptieren , wenn Grund der Einnahme dies erlaubt
	CT / VT	Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Hypertonie, arteriell Kardiale Erkrankung Kardiovaskuläre Erkrankung



Bewusstlosigkeit	Definition	Diverse Ursachen möglich, z.B. Kreislaufkollaps.
	Zu beachten	Immer Ursache einer Bewusstlosigkeit massgebend.
	Registrierung	Nicht akzeptieren wenn: <ul style="list-style-type: none"> • die Person zu Ohnmachtsanfällen neigt • Grundleiden die Registrierung verbietet • die Ursache nicht bekannt ist Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Epilepsie Hypoglykämie Hypotonie Kardiale Erkrankung Kardiovaskuläre Erkrankung Kopfverletzung, schwer
Bilharziose	Definition	Tropenkrankheit, auch Schistosomiasis genannt. Erreger: Schistosoma (der Saugwürmergattung Trematoda). Beim Menschen sind 5 pathogene Arten beschrieben (S.mansoni,- haematobium,-japonicum,-intercalatum,-mekongi). Wurmerkrankung mit 2 Formen: Urogenital-Bilharziose (Befall Harnblase und Harnröhre), Darm-Bilharziose (Saugwürmer in verunreinigten Süswasser-Gewässern)
	Registrierung	Rückweisung für 12 Monate nach Ende der Behandlung (Praziquantel)
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
Bing-Horton Neuralgie	Gehe zu	Cluster-Kopfschmerzen
Biopsie	Gehe zu	Operation / Eingriff_2_klein



Biotidinasemangel	Definition	Seltene, autosomal rezessiv vererbte Stoffwechselstörung, bei der es durch Defekt des Enzyms Biotinidase zu Biotinmangel kommt. Bei früher Diagnose (Neugeborenenenscreening) durch lebenslange Substitution mit Biotin therapierbar.
	Registrierung	Akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> entsprechende Abklärung erfolgt ist Spender mit Biotin substituiert ist und keine Folgeerscheinung einer inadäquaten Therapie vorliegen
	CT / VT	Wie Registrierung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT
Bipolare affektive Störung	Definition	Früher manisch-depressive Erkrankung mit extrem zweipolig entgegengesetzten (bipolare) Auslenkungen des Antriebs, der Aktivität und der Stimmung.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Bissverletzung, Haus-/Wildtiere	Registrierung	Rückweisung für 12 Monate nach Tollwutimpfung post-Exposition / passive Impfung
	CT / VT	Rückweisung für 2 Wochen nach Absetzen Antibiotikatherapie und bis zur vollständigen Genesung Rückweisung für 12 Monate nach Tollwutimpfung post-Exposition / passive Impfung
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Impfliste
Blasenentzündung	Gehe zu	Harnwegsinfekt (HWI)



Blepharitis	Definition	Entzündung des Augenlides. Auftreten in Kombination mit Hautkrankheiten, Konjunktivitis, kann infektiös oder allergisch bedingt sein.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 2 Wochen nach Antibiotikatherapie und bis zur vollständigen Genesung
	MC	Wie CT / VT
Blinddarmoperation	Gehe zu	Operation / Eingriff_3_mittel
Blutdruck, hoher	Gehe zu	Hypertonie, arteriell
Blutdruck, tiefer	Gehe zu	Hypotonie
Blutegelbehandlung	Definition	In der Blutegeltherapie werden medizinische Blutegel zur lokalen Behandlung eingesetzt. Sie wirken entzündungshemmend, schmerzlindernd und blutverdünnend.
	Registrierung	Akzeptieren, wenn Grunderkrankung dies erlaubt
	CT / VT	Rückweisung für 2 Monate nach Blutegelbehandlung
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Vaskuläre Erkrankung, venös
Blutkrankheit, autoimmun	Gehe zu	Autoimmunerkrankung
Blutkrankheit, maligne	Definition	Dazu gehören alle Leukämien, Hodgkin-Lymphome und Non-Hodgkin-Lymphome, Myeloproliferative Neoplasien, u.a.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss



**Blutkrankheit, nicht
maligne**

Siehe auch

Anämie
Blutungsneigung, angeborene Störung
Blutungsneigung, erworbene Störungen
Thrombophilie

Blutspende, allgemein

Zu beachten

Von einer Blutspende sollte im Vorfeld einer Blutstammzellspende (v.a. KM-Spende) abgesehen werden.

Nach einer Blutstammzellspende (inklusive DLI) ist eine Blutspende frühestens nach 1 Jahr wieder erlaubt.



Bluttransfusion	Definition	<p>Labile Blutprodukte: homologe Erythrozyten, Thrombozyten, frisch gefrorenes Plasma (FGP).</p> <p>Stabile Blutprodukte: Albumin, Immunglobulin und Gerinnungsfaktoren aus Plasma.</p> <p>Rekombinante Gerinnungsfaktoren: Gentechnisch hergestellte Produkte.</p>
	Zu beachten	Immer Zusatzfrage: Wann und wo ist die Transfusion erfolgt?
	Registrierung	Rückweisung für 12 Monate nach Transfusion in einem AIDS-Risikoland, sonst akzeptieren in Abhängigkeit der Ursache
	CT / VT	<p>Rückweisung für 1 Monat oder länger je nach Situation / Spenderschutz nach Transfusion in einem Nicht-AIDS-Risikoland</p> <p>NB: bei Transfusion in Gross-Britannien: akzeptieren für CT/VT, aber Transplantationszentrum immer informieren</p> <p>Rückweisung für 12 Monate nach Transfusion in einem AIDS-Risikoland</p> <p>Falls Sexualpartner eine Transfusion in einem AIDS-Risikoland hatte, gehe zu: "Risikoverhalten sonstiges, B8/C8/D8"</p> <p>Bei Bluttransfusion in einem Chagas-Risikogebiet: Chagas Serologie beim CT</p>
	MC	<p>Rückweisung für 2 Monate oder länger je nach Situation / Spenderschutz nach Transfusion in einem Nicht-AIDS-Risikoland</p> <p>NB: bei Transfusion in Gross-Britannien: Medical Check ok, aber Transplantationszentrum immer informieren</p> <p>Rückweisung für 12 Monate nach Transfusion in einem AIDS-Risikoland</p> <p>Falls Sexualpartner eine Transfusion in einem AIDS-Risikoland hatte, gehe zu "Risikoverhalten sonstiges, B8/C8/D8"</p>
	Siehe auch	<p>Operation / Eingriff_1_allgemein</p> <p>Polytrauma</p> <p>Risikosituation</p> <p>Risikoverhalten, sexuell und sonstiges</p> <p>Risikoverhalten, sonstiges, C8</p> <p>Risikoverhalten, sonstiges, D8</p>



Blutungsneigung, angeborene Störung	Definition	Angeborene Störungen mit Mangel an Gerinnungsfaktoren. Die häufigsten sind: <ul style="list-style-type: none"> • Hämophilie A: Mangel an Faktor VIII • Hämophilie B: Mangel an Faktor IX • Von Willebrand-Jürgens Syndrom: Mangel oder Strukturdefekt des von Willebrandfaktors (vWF)
	Siehe auch	Hämophilie A und B Von-Willebrand-Jürgens-Syndrom
Blutungsneigung, erworbene Störungen	Definition	Dazu gehören: <ul style="list-style-type: none"> • Mangel an Vitamin K (funktionell bei Therapie mit <u>Vitamin-K-Antagonisten</u>, Synthesestörung bei Leberinsuffizienz, Malabsorption, Cholestase) • Immunkoagulopathie (<u>Hemmkörperhämophilie</u>, <u>Autoantikörper</u> gegen Gerinnungsfaktoren) • <u>Verbrauchskoagulopathie</u> (DIC) • Systemische Hyperfibrinolyse (z.B. im Rahmen von Malignomen. Operation an Lunge und Prostata, Lysetherapie)
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
BMI	Gehe zu	Gewicht
Boeck-Krankheit	Gehe zu	Sarkoidose



Borderline	Definition	Eine Persönlichkeitsstörung, die durch Impulsivität und Instabilität in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen, Stimmung und Selbstbild gekennzeichnet ist. Hohe Komorbidität mit Depressionen und ADHS (Aufmerksamkeits Defizit-/Hyperaktivitäts-Störung).
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Borreliose	Definition	Bakterielle Infektion durch Borrelien, Übertragung durch Zecken. Auch Lyme-Krankheit / Lyme-Borreliose genannt.
	Registrierung	Akzeptieren, wenn keine Symptome Nicht akzeptieren, wenn chronische Infektion
	CT / VT	Rückweisung für 2 Wochen nach abgeschlossener antibiotischer Behandlung und bis zur vollständigen Genesung (keine Symptome mehr) Ausschluss bei chronischer Infektion, falls schon registriert
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Zeckenbiss / -stich
	Botox Behandlung	Definition
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren, wenn kein Hinweis auf eine (bakterielle) Infektion Rückweisung für 1 Monat nach letzter Injektion
	MC	Akzeptieren, wenn kein Hinweis auf eine (bakterielle) Infektion Rückweisung für 2 Monate nach letzter Injektion
	Siehe auch	Hyperhidrose



Bradykardie	Definition	Herzfrequenz < 60/Min. Ursachen u.a. Erkrankungen des Sinusknotens (z.B. Sick-Sinus-Syndrom, Blockierung der Erregungs-leitung (SA-Block), Erkrankung des AV-Knotens (AV-Block), langsames Vorhofflimmern (VHF)). Auch KHK, Medikamente (Betablocker) Immer kardiale Ursache ausschliessen
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss bei kardialer Ursache Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT
BRCA 1 Trägerin	Definition	Loss-of-function-Mutation oder Deletion des BRCA-1-Gens, erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Tumorbildung (insbesondere Mamma- oder Ovarial-Ca).
	Registrierung	Nicht akzeptieren, wenn bekannt
	CT / VT	Nicht akzeptieren, falls nicht unter regelmässiger und vollständiger Kontrolle gemäss BAG-Richtlinien Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin Information an Transplantationszentrum TZ
	MC	Wie CT / VT Risk acceptance durch TZ
Bronchitis, akut	Definition	Akute Entzündung der Bronchien, ansteckende Infektionskrankheit wenn durch Bakterien oder Viren verursacht
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 2 Wochen nach Absetzen der antibiotischen Behandlung und bis zur vollständigen Genesung
	MC	Wie CT / VT



Bronchitis, chronisch	Definition	Husten und Auswurf an den meisten Tagen während mindestens drei Monaten in zwei aufeinanderfolgenden Jahren. Geht häufig in eine COPD über.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Brucellose	Definition	Infektion durch Bakterien der Gattung Brucella: Anthropozoonose, Übertragung auf den Menschen durch infizierte Tiere, mit denen der Mensch in Kontakt kommt (Rinder, Ziegen, Schafe, Schweine, Pferde und Hunde). Eintritt des Erregers über Schleimhäute (Verdauungstrakt oder Respirationstrakt via Kot, Urin, auch unpasteurisierte Milch und daraus hergestelltem Käse).
	Registrierung	Nicht akzeptieren, wenn bestätigte Infektion in der Anamnese
	CT / VT	Rückweisung für 3 Monate nach Einnahme von verdächtigen Nahrungsmitteln Ausschluss falls bestätigte Infektion
	MC	Wie CT / VT
Brustfellentzündung	Gehe zu	Pleuritis
Bulimie	Gehe zu	Essstörung
Cannabidiol, CBD	Gehe zu	Drogengebrauch
Cannabis	Gehe zu	Drogengebrauch



Chagas, Infektion	Definition	Infektion mit dem Parasiten Trypanosoma cruzi. Verbreitet in Mittel- und Südamerika. Übertragung durch blutsaugende Raubwanzen. Nachgewiesene Chagas-Erkrankung, aktuell oder durchgemacht (positiver Anti-T.cruzi Test)
	Zu beachten	Bei Unsicherheit immer Test machen. Akzeptieren nur wenn Test negativ
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
	Siehe auch	Länderliste
Chagas, Risiko	Definition	Spenderin ist geboren, aufgewachsen oder hat > 6 Monate in Chagas-Risikoland gelebt, oder Mutter stammt aus Chagas-Endemiegebiet (siehe Anhang 7, Travelcheck). Die Krankheit wird in ländlichen Gegenden von Wanzen auf den Menschen übertragen, sie kommt bei touristisch Reisenden sehr selten vor.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 2 Monate nach Rückkehr nach Langzeitaufenthalt oder nach Bluttransfusion, dann CT mit Chagas-Test (Antikörpertest anti-T-cruzi) Kein Test nötig, wenn bereits negatives Testresultat vorhanden und seither keine Exposition Ausschluss bei positivem Chagas-Test
	MC	Wie CT / VT
Chikungunya, durchgemacht	Definition	Nachgewiesene Erkrankung (positiver NAT-Test)
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 4 Monate nach Diagnose oder Beginn Symptome (Patientenrisiko) TZ über positiven NAT Befund / Erkrankung informieren. In dringenden Fällen kann TZ entscheiden, die Rückweisungsfrist unter Akzeptanz des Risikos zu verkürzen, wenn Spender asymptomatisch -> siehe " Chikungunya, Risiko "
MC	Wie CT / VT	



Chikungunya, Risiko	Definition	Aufenthalt in Chikungunya-endemischem Gebiet (siehe Anhang Art. 7, Travelcheck)
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	<p>Rückkehr vor > 1 Monat, mit oder ohne Symptome:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akzeptieren • Keine Rückweisungsfrist • Kein Test <p>Rückkehr vor < 1 Monat, ohne Symptome:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akzeptieren • Keine Rückweisungsfrist • Kein Test <p>Rückkehr vor < 1 Monat, mit Symptomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akzeptieren für CT / VT • NAT Test durchführen - frühestens 5 Tage nach Rückkehr
	MC	<p>Rückkehr vor > 1 Monat, mit oder ohne Symptome:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akzeptieren • Keine Rückweisungsfrist • Kein Test <p>Rückkehr vor < 1 Monat, mit oder ohne Symptome:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akzeptieren • NAT Test durchführen - frühestens 5 Tage nach Rückkehr
Chlamydien, Infektion	Definition	Infektion mit dem Bakterium Chlamydia trachomatis (mehrere Serotypen). Infektion im Genitalbereich, gehört zu den häufigsten sexuell übertragenen Krankheiten. Häufig bei jungen, sexuell aktiven Erwachsenen, oft asymptomatisch.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 2 Wochen nach Absetzen der Behandlung vorausgesetzt, es liegen anamnestisch keine anderen sexuell übertragbaren Krankheiten vor und stabile Partnerschaft.
	MC	Wie CT / VT



Cholelithiasis	Definition	Gallensteine. Kleine steinartige Gebilde, die sich aus der Gallenflüssigkeit verfestigen. Können zu Entzündungen der Gallenblase oder des Gallengangs führen.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren falls symptomfrei Rückweisung bis zur vollständigen Genesung falls symptomatisch und therapiebedürftig
	MC	Wie CT / VT Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	Siehe auch	Cholezystitis

Cholera	Definition	Schwere bakterielle Infektion des Darmes (v.a. Dünndarm) durch das Bakterium <i>Vibrio cholerae</i> . Höchst ansteckend. Infektion meist über verunreinigtes Trinkwasser oder infizierte Nahrung (schlechte sanitäre Bedingungen!) Schwere Exsikkose und Elektrolytverlust durch extreme Durchfälle und starkes Erbrechen Inkubationszeit 1-3 Tage
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 3 Monate nach vollständiger Genesung
	MC	Wie CT / VT

Cholera, Kontakt	Definition	Kontakt mit erkrankter Person, Aufenthalt in Endemiegebiet
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 1 Woche nach Kontakt mit erkrankter Person oder Rückkehr aus Endemiegebiet
	MC	Wie CT / VT

Cholezystektomie	Gehe zu	Operation / Eingriff_3_mittel
-------------------------	---------	-------------------------------



Cholezystitis	Definition	Gallenblasenentzündung
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 2 Wochen nach Absetzen der Antibiotika- behandlung und bis zur vollständigen Genesung
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Cholelithiasis
Chronisch venöse In- suffizienz (CVI)	Definition	Chronisch venöses Stauungssyndrom, chronische Venenin- suffizienz. Mikrozirkulationsstörung der Gefässe infolge ve- nöser Abflussbehinderung. Folgen: z.T. schwere Venen- und Hautveränderungen.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Claudicatio intermit- tens	Gehe zu	Vaskuläre Erkrankung, arteriell
Cluster-Kopfschmerzen	Definition	Auch Bing-Horton Neuralgie genannt. Primäre Kopfschmerzerkrankung, charakterisiert durch streng einseitige und in Attacken auftretende, sehr heftige Schmerzen im Bereich Schläfe und Auge. Tritt periodisch stark gehäuft auf („cluster“), dann längere anfallsfreie Peri- oden. Ausgeprägte Tagesrhythmik. Ursache unklar, soll nicht wie Migräne mit Durchblutungsstörungen assoziiert sein.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren, wenn in anfallsfreier Periode Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Migräne
CMV	Gehe zu	Zytomegalievirus



Colitis	Definition	Akute oder chronische Entzündung des Dickdarms (infektiös / nicht infektiös / chronisch entzündlich / auto-immun)
	Zu beachten	Immer Ursache abklären
	Registrierung	Nicht akzeptieren, wenn chronisch entzündlich oder autoimmune Genese
	CT / VT	Rückweisung für 2 Wochen nach Absetzen der Behandlung und bis zur vollständigen Genesung, wenn Ursache die Akzeptierung nicht ausschliesst Nicht akzeptieren, wenn chronisch entzündlich oder autoimmune Genese
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Durchfallerkrankung
Colitis ulcerosa	Definition	Chronisch entzündliche Darmerkrankung, Autoimmunerkrankung
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
	Siehe auch	Autoimmunerkrankung
Common variable immune deficiency, CVID	Definition	Variables Immundefektsyndrom, Antikörpermangel-Syndrom. Angeborener Immundefekt, relativ seltene Erkrankung, jedoch häufigste genetische Ursache für einen symptomatischen Immundefekt mit Mangel an IgG. Häufig auch IgA und IgM vermindert.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Condylomata acuminata	Gehe zu	Genitalwarzen



COPD	Definition	Chronisch obstruktive Lungenerkrankung, (Chronic obstructive pulmonary disease)
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Cotton Wool Flecken/Herde	Definition	Wattebauschartige, weissliche Veränderungen im Augenhintergrund im Rahmen von Augenerkrankungen (z.B. Zentralvenenthrombose) oder Allgemeinerkrankungen (z.B. Diabetes mellitus, Hypertonie, Kollagenosen, HIV). Ursache: Kapillarverschlüsse der Netzhaut, Zeichen für Nervenfasereinfarke.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
COVID-19	Gehe zu	Infekt der oberen Atemwege
Creutzfeldt-Jakob Krankheit, Risiko	Definition	Risiko Prionenübertragung / vCJD (variant Creutzfeldt-Jacob Disease)
	Zu beachten	Immer Zusatzfrage: Wenn ja, was und warum?
Creutzfeldt-Jakob Krankheit, nachgewiesen	Definition	Nachgewiesene Erkrankung oder Verdacht auf Erkrankung
	Registrierung	Nicht akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • Spender selbst betroffen • 1 Verwandter ersten Grades betroffen
	CT / VT	Ausschluss, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • Spender selbst betroffen • 1 Verwandter ersten Grades betroffen • ≥ 2 Personen in der weiteren Verwandtschaft betroffen
	MC	Wie CT / VT



Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, Risiko 1_Übertragung von menschlichem Gewebe	Registrierung	Nicht akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • Übertragung von Dura mater Gewebe • Transplantation wegen Malignität, viraler Hepatitis oder Autoimmunerkrankung erfolgt ist • Spender eine immunsuppressive Therapie erhalten hat • Spender organtransplantiert wurde (Grunderkrankung) <p>Ursache für Gewebeübertragung berücksichtigen!</p>
	CT / VT	Wie Registrierung ; zusätzlich Frage nach Übertragung von Cornea, Sklera und sonstigem Augengewebe → Information an das TZ
	MC	Wie CT / VT, zusätzlich → Risk acceptance durch TZ
	Siehe auch	Bluttransfusion

Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, Risiko 2_Bluttransfusion	Gehe zu	Bluttransfusion
--	---------	-----------------

Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, Risiko 3_Operation an Gehirn oder Rückenmark	Registrierung	Nicht akzeptieren, wenn Rückweisung wegen Grunderkrankung indiziert ist Nicht akzeptieren, wenn Übertragung von Dura mater Bohrlochtrepantation und Diskushernien-operation sind akzeptabel
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Diskushernie/DH-Operation



Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, Risiko 4 Übertragung von tierischem Gewebe	Registrierung	Nicht akzeptieren Einzige Ausnahme: Akzeptieren bei Präparaten bovinen Ursprunges wie Bio-Oss®, Bio-Gide®, Cerabone® zum Knochenaufbau, wenn keine chronische Grunderkrankung oder rezidivierende Infektion vorliegt
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Immunbiotherapie Knochen- und Sehnenimplantate
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, Risiko 5 Wachstumshormonbehandlung vor 1.1.1986	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, Risiko 6 Hormonspritzen wegen Unfruchtbarkeit vor 1.1.1986	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, Risiko 7 Grossbritannien-Aufenthalt	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren
	MC	Akzeptieren
Curakne	Gehe zu	Teratogene Medikamente
Cushing-Syndrom	Definition	Erhöhter Cortisolspiegel im Blut, der körperliche Veränderungen verursacht. Die Ursachen können zentral, Nebennierenrinden-bedingt, ektopisch (paraneoplastisch) oder iatrogen sein.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss



Dengue Fieber, durchgemacht	Definition	Nachgewiesene Erkrankung (positiver NAT-Test)
	Zu beachten	Nach hämorrhagischer Form des Dengue-Fiebers fragen !
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 4 Monate nach Diagnose oder Beginn Symptome (Patientenrisiko) TZ über positiven NAT-Befund / Erkrankung informieren. In dringenden Fällen kann TZ entscheiden, die Rückweisungsfrist unter Akzeptanz des Risikos zu verkürzen, wenn Spender asymptomatisch -> siehe "Dengue, Risiko"
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Hämorrhagisches virales Fieber (VHF)



Dengue, Risiko

Definition	Aufenthalt in Dengue-endemischem Gebiet (siehe Anhang Art. 7, Travelcheck)
Registrierung	Akzeptieren
CT / VT	<p>Rückkehr vor > 1 Monat, mit oder ohne Symptome:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akzeptieren • Keine Rückweisungsfrist • Kein Test <p>Rückkehr vor < 1 Monat, ohne Symptome:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akzeptieren • Keine Rückweisungsfrist • Kein Test <p>Rückkehr vor < 1 Monat, mit Symptomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akzeptieren für CT / VT • NAT Test durchführen - frühestens 5 Tage nach Rückkehr
MC	<p>Rückkehr vor > 1 Monat mit oder ohne Symptome:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akzeptieren • Keine Rückweisungsfrist • Kein Test <p>Rückkehr vor < 1 Monat mit oder ohne Symptome:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akzeptieren • NAT-Test durchführen - frühestens 5 Tage nach Rückkehr
Siehe auch	Hämorrhagisches virales Fieber, Kontakt Länderliste

Depression

Zu beachten	Immer psychisches Befinden und Belastbarkeit abklären
Registrierung	<p>Akzeptieren wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nicht > 2 Medikamente • keine Lithiumtherapie und • psychisch stabil
CT / VT	Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
MC	Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin



Dermatitis	Definition	Entzündung der Haut. Ursache feststellen (Infektion, Allergie, Ekzem etc).
	Registrierung	Akzeptieren, wenn ohne systemische Behandlung
	CT / VT	Akzeptieren, wenn ohne systemische Behandlung und Einstichstelle nicht betroffen
	MC	Wie CT / VT

Desensibilisierung	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Immunbiotherapie

Diabetes insipidus	Definition	Angeborene oder erworbene Hormonmangel-Erkrankung (Mangel oder unzureichende Wirkung des antidiuretischen Hormons ADH).
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss

Diabetes mellitus	Definition	Unterscheidung in Diabetes Typ 1 / Diabetes Typ 2 / Schwangerschaftsdiabetes.
	Registrierung	Akzeptieren, wenn unter diätetischer Behandlung mit oder ohne orale Antidiabetika, gut kontrolliert und sonst gesund Akzeptieren bei Schwangerschaftsdiabetes, wenn Frauen nach der Schwangerschaft nicht mehr insulinabhängig sind Nicht akzeptieren bei Diabetes Typ 1 Nicht akzeptieren, wenn unter Insulinbehandlung
	CT / VT	Wie Registrierung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT



Diät, hCG-Injektion	Definition	Behandlung zur Gewichtsreduktion: tägliche hCG-Injektionen, kombiniert mit einer individuellen ultra-kalorienarmen (<500kcal/d), proteinreichen, kohlenhydrat- und fettarmen Diät – Ziel dieser Diät wäre der Verlust von Fettgewebe ohne dabei an Muskelgewebe zu verlieren.
	Registrierung	Akzeptieren 1 Monat nach komplikationsloser Beendigung der Diät
	CT / VT	Wie Registrierung und Information an TZ
	MC	Wie CT / VT
Diphtherie	Definition	Akute, ansteckende Infektionskrankheit; Infektion der oberen Atemwege durch das Corynebacterium diphtheriae.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 1 Monat nach vollständiger Genesung
	MC	Wie CT / VT
Diskushernie, Operation	Gehe zu	Operation / Eingriff_3_mittel
Divertikulitis	Definition	Entzündung von Divertikeln (Ausstülpungen) der Darmschleimhaut. Am häufigsten Sigmoid betroffen.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 3 Monate nach Absetzen der Behandlung
	MC	Wie CT / VT
Divertikulose	Definition	Gehäuftes Auftreten von Divertikel im Colon, v.a. Colon sigmoideum betroffen. Meist asymptomatisch, Symptome erst bei Entwicklung einer Divertikulitis.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung falls Symptome
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Divertikulitis



Drei-Tage-Fieber, Kontakt	Gehe zu	Kinderkrankheiten, Kontakt
Drogengebrauch	Definition	<p>Droge = Substanz, die das zentrale Nervensystem (Wahrnehmung, Gefühle, Emotionen, Motorik) beeinflusst und das Bewusstsein verändert. Dazu gehören u.a. Alkohol, Cannabis (Haschisch/Marihuana), Kokain, Heroin, Medikamente, Ecstasy, Amphetamine, Schnüffelstoffe, Halluzinogene.</p> <p>CBD-Produkte (Cannabidiol) sind in der Schweiz erlaubt und können ohne ärztliche Verordnung erworben werden. Der Einnahmegrund und die Regelmässigkeit ist immer zu prüfen.</p>
Drogengebrauch, intravenös	Definition	Intravenöse Anwendung von Drogen ohne medizinische Verschreibung.
	Registrierung	Akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> Intravenöser Drogengebrauch vor > 10 Jahren
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Risikoverhalten, sexuell und sonstiges



Drogengebrauch, per os oder per Inhalation	Zu beachten	Nicht akzeptieren bei Sucht, das heisst wenn Zweifel bestehen, dass der Spender die Substanzen nicht mindestens zwei Wochen absetzen kann.
	Registrierung	Akzeptieren bei Cannabisprodukten und wenn keine Hinweise auf schlechte Compliance bestehen Nicht akzeptieren, wenn regelmässiger Gebrauch von Drogen (mehrmals wöchentlich)
	CT / VT	Nicht akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • Aktueller regelmässiger Gebrauch (mehrmals wöchentlich) Ausnahme: Akzeptieren bei Cannabisprodukten und wenn keine Hinweise auf schlechte Compliance • Zurechnungsfähigkeit infolge Konsum beeinträchtigt/fraglich (Einverständniserklärung) • Spender in Entzugsprogramm (z.B. Antabus) Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Drogensubstitution

Drogensubstitution	Registrierung	Akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • Substitution mit Buprenorphin • stabile Lebenssituation • Langzeitgebrauch Nicht akzeptieren wenn: <ul style="list-style-type: none"> • Substitution mit Methadon
	CT / VT	Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Drogengebrauch, intravenös



Dry Needling	Definition	Auch "trigger point dry needling", Ergänzung zur manuellen Triggerpunkttherapie. Anwendung bei Personen mit chronischen oder auch akuten myofaszialen Schmerzen. Behandlung erfolgt durch Arzt, Heilpraktiker oder Physiotherapeut mit entsprechender Ausbildung (in CH).
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	<p>Akzeptieren, wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dry Needling in der Schweiz durchgeführt wurde • Kein Zweifel an steriler Arbeitstechnik und Verwendung von Einwegmaterial besteht • Kein Hinweis auf eine (bakterielle) Infektion besteht <p>Rückweisung für 1 Monat wenn Dry Needling in einem Land mit erhöhtem Infektionsrisiko durchgeführt wurde</p>
	MC	<p>Akzeptieren 48 Stunden nach Behandlung, wenn</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dry Needling in der Schweiz durchgeführt wurde • Kein Zweifel an steriler Arbeitstechnik und Einwegmaterial besteht • Kein Hinweis auf eine (bakterielle) Infektion besteht <p>Rückweisung für 2 Monate nach Behandlung wenn Dry Needling in einem Land mit erhöhtem Infektionsrisiko durchgeführt wurde</p>
Duodart	Gehe zu	Teratogene Medikamente
Dura mater	Gehe zu	Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, Risiko 1_Übertragung von menschlichem Gewebe



Durchfallerkrankung	Definition	Mögliche Erreger: Bakterien: z.B. Enterotoxischer E.coli, Vibrio cholerae (Cholera), Salmonella enteritidis (Salmonellose), Yersinia enterocolitica, Shigellen, Campylobacter, Clostridium difficile, Salmonella typhi (Typhus, Paratyphus) Viren: Rotavirus, Norovirus Darmparasiten: Würmer oder Protozoen, Giardia lamblia (Lambliasis)
	Zu beachten	Nach Frequenz und Dauer fragen, Ursache abklären
	Registrierung	Akzeptieren, wenn keine autoimmune oder chronisch entzündliche Ursache
	CT / VT	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung und 2 Wochen nach Absetzen allfälliger Antibiotika Rückweisung für 3 Monate nach vollständiger Genesung bei Cholera Rückweisung für 6 Monate nach vollständiger Genesung bei Shigellose, Yersiniose
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Nahrungsmittelallergie Typhus/Paratyphus

Durchfallerkrankung, chronisch-entzündlich	Gehe zu	Autoimmunerkrankung
---	---------	---------------------

Durchfallerkrankung, Kontakt	Definition	Kontakt mit einer an einer infektiösen Durchfallerkrankung erkrankten Person
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 2 Wochen nach Kontakt bei allen anderen Durchfallerkrankungen Rückweisung für 2 Monate bei Kontakt mit an Typhus / Paratyphus erkrankten Personen Rückweisung für 3 Monate bei Kontakt mit Personen mit Wurm- oder Protozoeninfektion (Amöben, Giardia lamblia, Crypto- / Mikrosporidien, etc.)
	MC	Wie CT / VT

Dutasterid	Gehe zu	Teratogene Medikamente
-------------------	---------	------------------------



Ebola	Gehe zu	Hämorrhagisches virales Fieber (VHF)
Echinokokkose	Definition	Infektion mit einem Bandwurm der Gattung Echinococcus (Darmparasit, z.B. Fuchsbandwurm, Hundebandwurm). Der Mensch ist dabei Feh-Zwischenwirt. Infektionsweg: orale Aufnahme von Eiern durch Kontakt mit Füchsen, Hunden, Katzen, oder Genuss von mit Kot kontaminiertem Obst oder Gemüse.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Ehlers-Danlos Syndrom	Definition	Heterogene Gruppe von angeborenen Störungen des Bindegewebes / Kollagensynthese. Überdehnbarkeit der Haut, überbewegliche Gelenke. Betrifft auch Gefässe, Muskeln, Bänder, innere Organe. Folge: leichtes Zerreißen der betroffenen Strukturen, v.a. Blutgefässe > Blutungen, Darmruptur, Hernien, Verkrümmungen der Wirbelsäule, rezidivierende Pneumothoraces.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Eileiterentzündung	Gehe zu	Salpingitis
Eisenbehandlung	Gehe zu	Anämie, Eisenmangel



Ekzem	Definition	Entzündliche Hauterkrankung / nicht infektiöse Entzündungsreaktion der Haut. Verschiedene Auslöser. Hauptgruppen: <ul style="list-style-type: none"> • atopisches Ekzem • allergisches Kontaktekzem • toxisches Kontaktekzem
	Registrierung	Akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • die Einstichstellen läsionsfrei sind • Lokalbehandlung ausreichend ist
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Allergie Dermatitis

Emphysem	Gehe zu	Lungenemphysem
-----------------	---------	----------------

Endokarditis	Definition	Entzündung des Endokards (Herzinnenwand), oft Herzklappen betroffen. Nicht infektiös oder infektiös (bakteriell: akut / subakut / viral / mykotisch).
	Registrierung	Akzeptieren , wenn: <ul style="list-style-type: none"> • unkomplizierter Verlauf • vollständig abgeheilt • keine Herzfunktionsstörung • keine Endokarditisprophylaxe erforderlich
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung



Endometriose	Definition	Häufige, gutartige Erkrankung, bei der Gebärmutter Schleimhaut ausserhalb des Uterus vorkommt (meist im unteren Bauch-, Beckenbereich, oft Eierstöcke betroffen).
	Zu beachten	Nach Lokalisation und Symptomen nachfragen
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung falls Symptome Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT
Endoskopie	Definition	Magen- oder Darmspiegelung mit flexiblem Endoskop. Risiko der Übertragung von HBV oder HCV.
	Registrierung	Akzeptieren, wenn kein pathologischer Befund
	CT / VT	Akzeptieren, wenn keine Komplikationen und kein pathologischer Befund. Sonst entsprechende Rückweisung Rückweisung für 1 Monat nach Untersuchung
	MC	Akzeptieren, wenn keine Komplikationen und kein pathologischer Befund. Sonst entsprechende Rückweisung Rückweisung für 2 Monate nach Untersuchung
Englandaufenthalt	Gehe zu	Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, Risiko 7_Grossbritannien-Aufenthalt



Enzephalitis	Definition	Entzündung des Gehirns. Meist infektiös bedingt, fast immer durch Viren, seltener durch Bakterien, Protozoen oder Pilze.
	Zu beachten	Immer nach Spätfolgen wie Krämpfe oder Epilepsie, chronische Kopfschmerzen oder andere Symptome nachfragen!
	Registrierung	Akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • keine bleibenden Schäden • Erreger kein Ausschlussgrund ist Rückweisung für 12 Monate nach vollständiger Genesung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Meningitis
Epilepsie	Definition	Krampfanfall ausgelöst durch abnorme elektrische Aktivität im Gehirn. Kann primär (keine identifizierbare Ursache) oder sekundär/symptomatisch (identifizierbare Ursache, z.B. Hirntrauma, zerebro-vaskuläres Ereignis, Tumor) sein. Grand Mal: tonisch-klonischer Krampfanfall Petit Mal: Absence-Anfall, kurzzeitige Bewusstseinsstörung
	Registrierung	Akzeptieren, wenn seit mind. 3 Jahren keine Antiepileptika-Einnahme und in dieser Zeit keine Anfälle aufgetreten sind Nicht akzeptieren solange unter Behandlung mit Antiepileptika
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
Erivedge	Gehe zu	Teratogene Medikamente
Erkältung	Gehe zu	Infekt der oberen Atemwege



Erysipel	Definition	Bakterielle Infektion der oberen Hautschichten und der Lymphwege, auch Wundrose oder Rotlauf genannt. Scharf begrenzte starke Rötung. Meist durch β -hämolysierende Streptokokken der Gruppe A, selten andere Erreger wie Staphylococcus aureus oder Klebsiella pneumoniae. Eintrittspforte meist kleine Hautverletzung.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 1 Monat nach Abschluss der antibiotischen Behandlung und vollständiger Genesung
	MC	Wie CT / VT

Essstörung	Definition	Dazu gehören u.a.: <ul style="list-style-type: none">• Anorexie• Bulimie
	Registrierung	Nicht akzeptieren, ausser vollständig genesen und keine körperlichen Residuen Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung

Faktor V-Mangel, kongenital	Definition	Parahämophilie A, Hypoproakzelerinämie, Owren-Syndrom. Sehr seltene, autosomal-rezessiv vererbte Blutgerinnungsstörung, die zu einer Hämophilie führt (nicht zu verwechseln mit Faktor V Leiden-Mutation)
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss



Familiäres Mittelmeerfieber	Definition	Familiäre rezurrenre Polyserosiris. Genetisch bedingte Erkrankung mit rekurrendem Fieber. Schubartiger Verlauf mit hohem Fieber, starken Schmerzen durch Entzündung der Serosa (Peritoneum, Pleura oder Gelenkkapseln). Häufig sind Menschen aus dem östlichen Mittelmeerraum betroffen
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
Fazialislähmung, peripher	Definition	Fazialisparese. Lähmung im Versorgungsgebiet des Nervus facialis, welche durch eine Schädigung des Nerven in seinem peripheren Verlauf verursacht wird.
	Registrierung	Rückweisung für 3 Monate nach Symptombeginn, danach akzeptieren wenn Symptome klar regredient
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Herpes Zoster
Fazialislähmung, zentral	Definition	Lähmung im Versorgungsgebiet des Nervus facialis, welche durch eine Schädigung des Nerven in seinem zentralen Verlauf (Tractus corticonuclearis) verursacht wird.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Fehlgeburt	Gehe zu	Abort
Fibroadenom der Brust, Entfernung	Gehe zu	Operation / Eingriff_3_mittel



Fibromuskuläre Dysplasie	Definition	Nicht-entzündliche Proliferation von Bindegewebe und glatter Muskulatur in der Wand von Arterien. Tritt meist bei jungen Frauen auf mit allen Symptomen von Gefässverengung. Häufig betroffen: Nierenarterie > Hypertonie, Arteria carotis interna > neurologische Symptome.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Fibromyalgie-(syndrom)	Definition	Chronische, schmerzhaft, nicht-entzündliche Erkrankung des Bewegungsapparates unbekannter Aetiologie, fraglicher autoimmuner Prozess.
	Registrierung	Nicht akzeptieren (psychische Probleme wegen Dauerbelastung / chronischer Schmerzen)
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
	Siehe auch	Autoimmunerkrankung
Filariose	Definition	Infektion mit Filarien (parasitischen Fadenwürmern). Manifestieren sich je nach Art v.a. im Lymphgefässsystem oder im oberflächlichen oder tieferen Bindegewebe. Übertragung der Larven der Filarien durch blutsaugende Insekten, v.a. in tropischen Ländern.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Finacapil	Gehe zu	Teratogene Medikamente
Finasterid	Gehe zu	Teratogene Medikamente



Flammer-Syndrom	Definition	Sporadische, fokale oder generalisierte vaskuläre Dysregulationen.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung

Fokale noduläre Hyperplasie	Gehe zu	Hämangiom
------------------------------------	---------	-----------

Folikulitis	Definition	Entzündung der Haarfollikel. Unterscheidung zwischen infektiösen und nicht-infektiösen Formen. Die infektiöse Follikulitis ist meist bakteriell bedingt, kann aber auch durch andere Erreger (Viren, Pilze oder Parasiten) verursacht sein.
	Registrierung	Akzeptieren, bei leichten Symptomen, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • Befall lokal beschränkt • nur lokale Behandlung notwendig Nicht akzeptieren bei Hinweis auf Immunschwäche oder chronisch vernarbende Alopezie
	CT / VT	Wie Registrierung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT

Foramen ovale	Gehe zu	Kardiale Erkrankung
----------------------	---------	---------------------

Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)	Definition	Durch das FSME-Virus ausgelöste Erkrankung, mit grippeähnlichen Symptomen und bei einem Teil der Patienten mit einer Meningoenzephalitis, beim Grossteil verläuft sie jedoch asymptomatisch. Übertragung durch Zecken.
	Registrierung	Akzeptieren nach vollständiger Genesung ohne neurologische Residuen
	CT / VT	Rückweisung für 3 Monate nach vollständiger Heilung ohne neurologische Residuen
	MC	Wie CT / VT



Fuchsbandwurm	Gehe zu	Echinokokkose
Furunkel	Gehe zu	Abszess
Gallenblasenentfernung	Gehe zu	Operation / Eingriff_3_mittel
Gallenblasenentzündung	Gehe zu	Cholezystitis
Gallensteine	Gehe zu	Cholelithiasis
Gastrektomie	Gehe zu	Operation / Eingriff_4_gross
Gastritis	Definition	<p>Magenentzündung. Akut/chronisch, diverse Typen</p> <p>Typ-A: Autoimmunkrankheit mit Autoantikörpern gegen Belegzellen. Kann zu Vitamin B12-Mangel führen durch Zerstörung der Belegzellen -> Intrinsic Factor reduziert -> verminderte B12-Resorption -> perniziöse Anämie</p> <p>Typ-B: Bakterielle Infektion, Erreger: Helicobacter pylori</p> <p>Typ-C: chemisch ausgelöst (Galleflüssigkeit, Medikamente wie nicht-steroidale Antirheumatika, Diclofenac, Ibuprofen), Antibiotika</p> <p>Therapie: Antazida (Magensäurehemmer)</p>
	Registrierung	<p>Akzeptieren, wenn leichte Oberbauchbeschwerden, die durch Antazida gelindert werden</p> <p>Nicht akzeptieren :</p> <ul style="list-style-type: none"> • bei Typ-A mit oder ohne Vitamin B12-Mangel • wenn Antazida die Gastritis nicht lindern
	CT / VT	<p>Akzeptieren, wenn unter Antazida symptomfrei</p> <p>Rückweisung für 2 Wochen nach Absetzen der Antibiotika und bis zur vollständigen Genesung bei akuter Gastritis</p> <p>Ausschluss bei Typ-A</p>
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Ulcus ventriculi / Ulcus duodeni



Gastroenteritis	Gehe zu	Durchfallerkrankung
Gastroenteritis, Kontakt	Gehe zu	Durchfallerkrankung, Kontakt
Gebärmutterentfernung	Gehe zu	Operation / Eingriff_3_mittel
Gebärmutterhalskrebs	Siehe auch	Krebs Zervixkarzinom in situ
Gebärmuttersenkung, Operation	Gehe zu	Operation / Eingriff_3_mittel
Gefährliche Berufe oder Hobbies	Definition	Bei Berufen mit besonderer Verantwortung für andere Personen (z.B. Piloten, Busschauffeure, Lokomotivführer) oder Berufen, die besonders gefährlich sind (z.B. Bedienung schwerer Maschinen, Kranführer, Dachdecker, Tätigkeiten auf Leitern oder Gerüsten, Taucher) können besondere Bedingungen für die Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit nach einer Spende gelten. Bei Piloten z.B. zusätzliche Untersuchung / Freigabe durch den Flugarzt / Dienst- / Werkarzt. Diese gilt es vor einer Spende individuell abzuklären. Bei Hobbies wie Tiefseetauchen, Gleitschirmfliegen, Segel- oder Motorflug, Klettern, Auto- oder Motorradrennen: Besprechung mit dem Entnahmezentrum, wie lange nach einer Spende die Wartefrist bis zur Wiederaufnahme sein soll. Bei Leistungs- und Spitzensportlern wird empfohlen, für mindestens eine Woche nach Spende das Training aussetzen.
Gehirnerschütterung	Gehe zu	Kopfverletzung, schwer
Gehirnprellung	Gehe zu	Kopfverletzung, schwer
Gehirnquetschung	Gehe zu	Kopfverletzung, schwer



Gelbfieber	Definition	Infektionskrankheit durch das Gelbfieber-Virus (RNA-Virus aus der Familie der Flava-Viren). Vorkommen in tropischen und subtropischen Gebieten in Südamerika und Afrika, Übertragung durch Stechmücken. Inkubationszeit 3-6 Tage. In schweren Fällen tödlicher Verlauf möglich. Impfung effektiv.
	Registrierung	Rückweisung für 3 Monate nach vollständiger Genesung
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
Gelbfieber, Kontakt	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 1 Monat nach Kontakt
	MC	Wie CT / VT
Gelbsucht	Definition	Ikterus. Gelbfärbung der Augen, der Haut und der Schleimhäute als Symptom einer erhöhten Bilirubinkonzentration im Körper. Auftreten bei verschiedenen Erkrankungen, u.a. der Leber oder der Galle. Einteilung nach Ursache / Lokalisation der Störung: <ul style="list-style-type: none"> • Hämolytischer Ikterus (prähepatisch), z.B. Neugeborenen-Ikterus • Hepatozellulärer Ikterus (intrahepatisch) • Cholestatischer Ikterus (posthepatisch) Gelbsucht wird oft mit viraler Hepatitis gleichgesetzt
	Registrierung	Akzeptieren bei Anamnese einer nicht infektiösen Ursache ohne aktuelle Symptomatik
	CT / VT	Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	Siehe auch	Hepatitis
	Gelbsucht, infektiös	Gehe zu
Gelenkentzündung	Gehe zu	Arthritis, nicht infektiös



Genitalwarzen	Definition	Condylomata acuminata. Eine der häufigsten sexuell übertragbaren Erkrankungen, welche durch humane Papilloma-Viren verursacht werden.
	Registrierung	Akzeptieren, wenn anamnestisch keine andere sexuell übertragbare Krankheit vorliegt
	CT / VT	Wie Registrierung und Information TZ falls symptomatisch
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Humane Papilloma Viren (HPV) Risikoverhalten, sexuell
Gerinnungsfaktoren-Konzentrate	Definition	Stabile Blutprodukte zur Behandlung von Gerinnungsstörungen: <ul style="list-style-type: none"> • Gerinnungsfaktoren aus Plasma • rekombinante Gerinnungsfaktoren (gentechnisch hergestellt)
	Registrierung	Akzeptieren, falls die zugrunde liegenden Krankheit dies erlaubt
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Bluttransfusion Gerinnungsstörung Hämophilie A und B
Gerinnungsstörung	Definition	Koagulopathie. Gestörter Ablauf der (plasmatischen) Blutgerinnung, führt zu erhöhter Blutungsneigung(hämorrhagische Diathese, Hämophilie) odererhöhter Thromboseneigung (Thrombophilie, Hyperkoagulabilität). Angeboren oder erworben.
	Siehe auch	Hämophilie A und B Thrombophilie Von-Willebrand-Jürgens-Syndrom
Gerstenkorn	Gehe zu	Hordeolum



Gewicht	Registrierung	Nicht akzeptieren, wenn Gewicht < 50 Kg oder BMI ≥ 40
	CT / VT	Ausschluss : Bei BMI ≥ 40 Nicht akzeptieren, wenn Gewicht < 50 Kg
	MC	Wie CT / VT

Gicht	Definition	Purin-Stoffwechselerkrankung, Verlauf schubweise. Ablagerung von Harnsäurekristallen in peripheren Gelenken (und Geweben) führt zu Arthritis (urica). Oft Grosszehengrundgelenk betroffen = Podagra. Akut (Gichtanfall) / chronisch Niereninsuffizienz durch langfristige Schädigung der Niere möglich.
	Zu beachten	Gichtanfall könnte durch G-CSF ausgelöst werden.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren, bei stabiler und gut kontrollierter Erkrankung Nur BM Spende Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT

Gilbert-Syndrom	Gehe zu	Meulengracht-Syndrom
------------------------	---------	----------------------

Glaukom	Definition	Grüner Star. Augenerkrankung, die zu einem Verlust von Nervenfasern und im Extremfall zur Erblindung führen kann. Verschiedene Ursachen, ist oft mit einem erhöhten Augeninnendruck verbunden.
	Registrierung	Nicht akzeptieren, auch wenn operiert
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss



Glomerulonephritis	Definition	Beidseitige Entzündung der Nieren, bei denen die Nierenkörperchen (Glomeruli) primär betroffen sind. Verschiedene Ursachen, u.a. Autoimmunprozesse, Infektionen, Stoffwechselerkrankungen, Medikamente. Kann zu schwerer Niereninsuffizienz führen.
	Zu beachten	Immer Ursache abklären
	Registrierung	Rückweisung für 5 Jahre nach vollständiger Genesung, wenn die auslösende Ursache dies erlaubt und keine Nierenfunktionsstörung vorliegt Nicht akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • mit einer Autoimmunkrankheit assoziiert • chronische bzw. sekundäre Glomerulonephritis
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
GLP-1-Agonisten	Definition	Antidiabetikum der Gruppe der GLP-1-Agonisten. Wird bei Diabetes mellitus Typ 2 und zur Gewichtsreduktion bei Adipositas eingesetzt. <ul style="list-style-type: none"> • Semaglutid: zB. Ozempic®, Wegovy®, Rybel-sus® • Liraglutid: zB. Saxenda®
	Zu beachten	Information an Transplantationszentrum TZ
	Registrierung	Akzeptieren, wenn Übergewicht/Grundkrankheit nicht dagegen sprechen
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel (G6PD)	Definition	Genetisch bedingter Mangel des Enzyms Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase -> vermehrte Zerstörbarkeit der Erythrozyten -> hämolytische Anämie unterschiedlichen Ausmasses.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss



Glutenunverträglichkeit	Gehe zu	Zöliakie
--------------------------------	---------	----------

Gonorrhoe	Definition	Tripper. Bakterielle Infektion durch Gonokokken. Vorkommen weltweit, nur beim Menschen auftretend, sexuell übertragen.
	Registrierung	Rückweisung für 12 Monate nach Behandlungsende des Spenders und des Sexualpartners
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung

Grauer Star	Gehe zu	Katarakt
--------------------	---------	----------

Grippe	Gehe zu	Infekt der oberen Atemwege
---------------	---------	----------------------------

Grippe, Kontakt	Definition	Influenza
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren
	MC	Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin

Grüner Star	Gehe zu	Glaukom
--------------------	---------	---------

Guillain-Barré Syndrom	Gehe zu	Autoimmunerkrankung
-------------------------------	---------	---------------------

Gürtelrose	Gehe zu	Herpes Zoster
-------------------	---------	---------------

Haarausfall	Gehe zu	Alopezie
--------------------	---------	----------



Hämangiom	Definition	Gutartiger Tumor der Blutgefässe. Tritt häufig in der Haut oder Leber auf, kann aber überall im Körper vorkommen.
	Registrierung	Akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • asymptomatisch • Tumorgrosse stabil • solitär Sonst Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie CT / VT

Hämochromatose	Definition	Hämosiderose / Eisenspeicherkrankheit. <ul style="list-style-type: none"> • autosomal-rezessive Erbkrankheit: erhöhte Aufnahme von Eisen im oberen Dünndarm mit Organschädigung durch Eisenablagerung. • sekundär / erworben (z.B. durch viele Bluttransfusionen, langdauernde Hämolyse)
	Registrierung	Akzeptieren, falls genetische Veranlagung ohne End-Organ-schäden und unter adäquater Behandlung
	CT / VT	Akzeptieren , wenn keine Zeichen der Organbeteiligung (Herz, Leber, Pankreas), sonst Ausschluss
	MC	Wie CT / VT

Hämoglobinopathie	Definition	Erkrankung infolge gestörter Hämoglobinbildung durch genetischen Defekt. Klinische Relevanz unterschiedlich, je nach Erbgang, Dominanz (Heterozygotie, Homozygotie) und Lokalisation des Defekts.
	Zu beachten	Abschliessende Beurteilung der Spendetauglichkeit durch Arzt, TZ informieren
	Siehe auch	Sichelzellanämie Thalassämie



Hämophilie A und B	Definition	Bluterkrankheit. Erbkrankheit mit x-chromosomal rezessivem Erbgang, betrifft häufiger Männer. Hämophilie A: Mangel an Faktor VIII Hämophilie B: Mangel an Faktor IX
	Registrierung	Nicht akzeptieren Weibliche Trägerinnen können akzeptiert werden. TZ informieren.
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung

Hämorrhagisches virales Fieber (VHF)	Definition	Infektiöse Fiebererkrankungen, die mit Blutungen einhergehen. Meist durch Virusinfektionen verursacht, oft hochinfektiös, meist gefährlich bis lebensbedrohlich. Meldepflichtig. Treten v.a. in Afrika, Südamerika und Südostasien auf. Tödliche VHF sind in Mitteleuropa und Nordamerika sehr selten. Dazu gehören z.B.: Lassa Fieber, Krim Kongo Fieber (CCHF), Ebola Fieber , Marburg Fieber, Dengue Fieber (hämorrhagische Form).
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss

Hämorrhagisches virales Fieber, Kontakt	Definition	Inkubationszeit allgemein 2 - 21 Tage, meist 7 - 10 Tage
	Registrierung	Rückweisung für 6 Monate nach Rückkehr aus Endemiegebiet / Kontakt mit erkrankter Person und allfällige Abklärungen abgeschlossen
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Länderliste



Hämorrhoiden	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung wenn starke Blutungen
	MC	Wie CT / VT
Hämorrhoiden, chirurgische Behandlung	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 1 Monat nach Exzision
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Operation / Eingriff_2_klein
Hand-Fuss-Mund-Krankheit	Definition	Viral bedingte, hoch ansteckende Infektionskrankheit. Kommt weltweit vor, betrifft v.a. Kinder, kann auch bei Erwachsenen vorkommen. Erreger v.a. Enteroviren, u.a. Coxsackie-Viren, humane Enteroviren. Übertragung durch direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten (Speichel, Tröpfchen, Bläschensekret) oder fäko-oral. Indirekt via kontaminierte Oberflächen. Immunität nur gegen den auslösenden Erreger.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung
	MC	Wie CT / VT
Harnwegsinfekt (HWI)	Definition	Infektionskrankheit der ableitenden Harnwege
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 2 Wochen nach Abschluss der Antibiotikabehandlung und bis zur vollständigen Genesung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin bei rezidivierenden HWI
	MC	Wie CT / VT
Haschisch	Gehe zu	Drogengebrauch



Hashimoto Thyreoiditis	Definition	Autoimmunentzündung der Schilddrüse
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren, wenn stabil und beschwerdefrei nach mind. 3 Monaten Substitutionstherapie Nur Knochenmark-Spende erlaubt; Information an das TZ Nicht akzeptieren bei: <ul style="list-style-type: none"> • Aktiver Thyreoiditis • Einnahme von Thyreostatika
	MC	Wie CT / VT Risk acceptance durch TZ
	Siehe auch	Schilddrüsenerkrankung

Hautentzündung	Gehe zu	Dermatitis
-----------------------	---------	------------

Hautkrebs	Definition	Bösartige Veränderung der Haut. Z.B. malignes Melanom, Mycosis fungoides, Fibrosarkome, Angiosarkome
	Registrierung	Nicht akzeptieren. Ausnahme: Basaliom
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
	Siehe auch	Basaliom



Hepatitis	Definition	Leberentzündung, nicht-infektiös/infektiös, akut/chronisch, zahlreiche Ursachen
	Registrierung	Nicht akzeptieren bei unbekannter Ursache
	CT / VT	Akzeptieren bei Begleithepatitis zu viralem Infekt nach vollständiger Genesung und Normalisierung der Leberwerte
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Hand-Fuss-Mund-Krankheit Hepatitis A Hepatitis B, akut Hepatitis C Hepatitis E Herpes labialis Mononukleose, infektiöse
Hepatitis A	Definition	Infektion mit dem Hepatitis A Virus
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 3 Monate nach vollständiger Genesung
	MC	Rückweisung für 4 Monate nach vollständiger Genesung
Hepatitis B, akut	Registrierung	Rückweisung für 2 Jahre nach vollständiger Genesung
	CT / VT	Rückweisung für 2 Jahre Danach akzeptieren, wenn HBs-Ag negativ, Anti-HBc positiv, Anti-HBs positiv und Anti-HBs-Titer > 100 IU/L, HBV-NAT negativ
	MC	Wie CT / VT
Hepatitis B, chronisch	Definition	Chronischer Virusträger, persistierende Infektion: HBs-Ag positiv und/oder HBV-NAT positiv, Anti-HBc positiv, Anti-HBs negativ
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss



Hepatitis B, durchgemacht	Registrierung	Rückweisung 2 Jahre nach vollständiger Genesung
	CT / VT	Akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • Infektion vor > 2 Jahren, oder asymptomatisch • HBs-Ag negativ, Anti-HBc positiv, Anti-HBs positiv und Anti-HBs-Titer > 100 IU/L, HBV-NAT negativ
	MC	Wie CT / VT
Hepatitis B, Haushaltskontakt	Definition	Seropositiver Wohnpartner
	Registrierung	Akzeptieren, wenn Spender geimpft ist
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Hepatitis Hepatitis, Risikotätigkeiten, Risiken, Kontakte Risikotätigkeiten
Hepatitis B, Sexualpartner	Definition	Sexualpartner mit akuter Hepatitis B oder Virusträger
	Registrierung	Akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • Letzter sexueller Kontakt mit Partner mit Hepatitis B vor > 12 Monaten oder • Spender geimpft ist
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Hepatitis Hepatitis, Risikotätigkeiten, Risiken, Kontakte Risikotätigkeiten



Hepatitis C	Definition	Infektion mit dem Hepatitis C Virus, akut oder chronisch. Positiver Test für Anti-HCV-Antikörper und/oder HCV NAT.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
	Siehe auch	Hepatitis Hepatitis, Risikotätigkeiten, Risiken, Kontakte Risikosituation Risikotätigkeiten Risikoverhalten, sexuell und sonstiges

Hepatitis C, Sexualpartner	Definition	Sexualpartner mit Hepatitis C
	Registrierung	Akzeptieren, wenn letzter Kontakt vor > 12 Monaten
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Risikosituation Risikoverhalten, sexuell und sonstiges



Hepatitis E	Definition	<p>Infektion mit dem Hepatitis E Virus. In Europa Typ 3&4 -> Übertragung von Tieren über die Lebensmittelkette durch Verzehr von rohem oder nicht ausreichend gekochtem Fleisch (Schwein, Wild, Muscheln). Übertragung via Blutprodukte möglich.</p> <p>Akute Infektion in der Regel asymptomatisch (90%) / mild, selbstlimitierend. Inkubationszeit 3-8 Wochen. Schwere / chronische Verläufe bei vorbestehender Lebererkrankung, immunsupprimierten / transplantierten Patienten, Früh-oder Neugeborene (Risikogruppen).</p> <p>Ab 1.10.2018 HEV-Testung bei allen Blutspendern (freigaberelevant) und Blutstammzellspendern (nicht freigaberelevant).</p>
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	<p>Rückweisung für 2 Monate wenn HEV NAT positiv, dann NAT wiederholen</p> <p>Transplantationszentrum kann Rückweisungsfrist unter Akzeptanz des Risikos kürzen, wenn Spender asymptomatisch</p>
	MC	Wie CT / VT

Heroin	Gehe zu	Drogengebrauch
---------------	---------	----------------

Herpes genitalis	Definition	Infektion im Genitalbereich mit dem Herpes Simplex Virus (HSV), übertragbar durch Sexualkontakt.
	Registrierung	Akzeptieren, wenn anamnestisch keine andere sexuell übertragbare Krankheit vorliegt
	CT / VT	Rückweisung bis Läsionen abgeheilt sind und bis 2 Wochen nach Abschluss der Behandlung, wenn keine andere sexuell übertragbare Krankheit vorliegt
	MC	Wie CT / VT



Herpes labialis	Definition	"Fieberbläschen". Häufigste Manifestation einer Infektion mit dem Herpes Simplex Virus mit Bläschenbildung an den Lippen.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren
	MC	Akzeptieren Information TZ falls symptomatisch bei Spende

Herpes Zoster	Definition	Viruserkrankung, ausgelöst durch das Varizella-Zoster-Virus (VZV, ein Herpesvirus). Endogene Reaktivierung einer früheren Erst-Infektion (meist Windpocken in der Kindheit). Das Virus persistiert in den Gliazellen der Spinalganglien lebenslang.
	Zu beachten	Immer TZ informieren
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 1 Monat nach vollständiger Genesung (Hautläsionen abgeheilt)
MC	Rückweisung für 2 Monate nach vollständiger Genesung (Hautläsionen abgeheilt)	

Herpes Zoster, Kontakt	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin TZ informieren
	MC	Wie CT / VT, mit Varizellen-Serologie



Herzfehler, angeboren	Definition	Angeborene oder erworbene Strukturbesonderheit des Herzens oder angrenzender Gefässe mit Funktionseinschränkung des Herz-Kreislauf- oder des Herz-Lungensystems, z.B.: <ul style="list-style-type: none"> • Atrioventrikulärer Septumdefekt (AVSD) • Atriumseptumdefekt (ASD) / Persistierendes Foramen ovale (PFO) • Gefäss- und Klappenfehlbildungen
	Registrierung	Nicht akzeptieren, ausser operiertes Foramen ovale ohne Residuen oder Therapie
	CT / VT	Wie Registrierung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie Registrierung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
Herzgeräusch	Definition	Meist pathologisches, im oder am Herzen entstehendes Geräusch, das bei der Auskultation gehört werden kann.
	Registrierung	Akzeptieren, falls asymptomatisch und ärztlich abgeklärt
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung MC mit kardiologischer Abklärung
Herzinfarkt	Gehe zu	Kardiovaskuläre Erkrankung
Herzinsuffizienz	Definition	Eine der häufigsten internistischen Erkrankungen (in Europa). 80-90% aufgrund Funktionsstörung des Herzmuskels. Mögliche Ursachen: Häufig: Koronare Herzkrankheit (KHK), arterielle Hypertonie, Vorhofflimmern Seltener: Kardiomyopathie, Herzklappenfehler, Perikardkrankung Prävalenz und Inzidenz mit Alter zunehmend
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss



Herzklappenfehler	Definition	Angeborene oder erworbene Funktionsstörung der Herzklappen; kann jede der 4 Klappen betreffen und aus Stenose (Verengung), Insuffizienz (Schlussunfähigkeit) oder beidem bestehen (kombiniertes Vitium). Leichtgradige Klappenfehler verursachen u.U. keine Symptome, bei symptomatischen Vitien ist meist die operative Behandlung notwendig (Klappen-rekonstruktion oder -ersatz).
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Herz-Operation	Registrierung	Nicht akzeptieren, ausser operiertes Foramen ovale ohne Residuen oder Therapie
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss



Herzrhythmusstörung	Definition	<p>Arrhythmie. Störung der normalen Herzschlagfolge, verursacht durch Störungen /Unregelmässigkeiten bei der Erregungsbildung und –leitung im Herzmuskel.</p> <p>Einteilung meist nach dem Entstehungsort (Vorhof, Kammer, Erregungsbildung und –leitung): z.B.</p> <p>Supraventriculär: Extrasystolen (ES), supraventrikuläre Tachykardie, Vorhofflimmern, Vorhofflattern, sinu-atrialer Block</p> <p>Ventrikulär: ES, ventrikuläre Tachykardie, Kammerflimmern, Kammerflattern</p> <p>Erregungsbildung- und –leitungssystem: Sick-Sinus syndrom, AV-Blocks, Wolff-Parkinson-White Syndrom (WPW-Syndrom)</p>
	Zu beachten	Nach allfälliger (kardialer) Grunderkrankung fragen
	Registrierung	<p>Akzeptieren, wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extrasystolen sporadisch • Arrhythmie atemabhängig • nach erfolgreicher ablativer Therapie, stabil und ohne Medikamente
	CT / VT	<p>Wie Registrierung</p> <p>Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin</p>
	MC	<p>Wie Registrierung</p> <p>Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin</p>
	Siehe auch	Posturales Tachykardiesyndrom (POTS)
	<hr/>	
Heuschnupfen	Definition	Pollenbedingte allergische Entzündung der Nasenschleimhaut (Rhinitis), Pollinose.
	Zu beachten	EZ und TZ informieren bei Allergien
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	<p>Rückweisung, falls schwerwiegende Symptome während der Pollensaison</p> <p>Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin</p>
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Allergie



Hiatushernie, Operation	Gehe zu	Operation / Eingriff_3_mittel
Hirnblutung, nicht unfallbedingt	Gehe zu	Zerebrovaskuläre Erkrankung
Hirnblutung, unfallbedingt	Definition	durch einen Unfall verursachte (traumatische) Hirnblutung, z.B. <ul style="list-style-type: none"> • traumatische Subarachnoidalblutung • traumatische Epiduralblutung • traumatische Subduralblutung
	Registrierung	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung Nicht akzeptieren solange unter Epilepsie-Prophylaxe und wenn neurologische Spätfolgen
	CT / VT	Wie Registrierung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, Risiko 3_Operation an Gehirn oder Rückenmark Epilepsie Operation / Eingriff_3_mittel Operation / Eingriff_4_gross
Hirndurchblutungsstörung	Gehe zu	Zerebrovaskuläre Erkrankung
Hirnschlag	Gehe zu	Zerebrovaskuläre Erkrankung
Hirntumor, bösartig	Definition	Bösartige Geschwulst im Gehirn
	Registrierung	Nicht akzeptieren, auch nach Entfernung
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss



Hirntumor, gutartig	Definition	Gutartige Geschwulst im Gehirn
	Registrierung	Akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • operativ vollständig entfernt • keine neurologischen Residuen • keine medikamentöse Therapie (z.B. Hormonpräparate, Antiepileptika) • Nachsorge abgeschlossen Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
Histaminintoleranz	Definition	Verzehr histaminreicher Nahrungsmittel (z.B. reifer Käse, Wurst, Rotwein) führt zu pseudoallergischen Reaktionen.
	Registrierung	Akzeptieren bei leichten Symptomen mit/ohne Behandlung Nicht akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • Beschwerden schwerwiegend • schwere Kreislaufreaktion (z.B. Schock) bekannt
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
HIV-Infektion	Definition	Infektion mit dem HIV Virus, positiver Test für HIV
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss



HNO Erkrankung	Definition	Erkrankungen / Funktionsstörungen im Gebiet aller Strukturen und Organe an Kopf und Hals, mit Ausnahme von Gehirn und Augen. Häufig sind entzündliche / infektiöse Erkrankungen.
	Siehe auch	Laryngitis Mastoiditis Otitis media, akut Otitis media, chronisch Pharyngitis Tonsillitis akut Tonsillitis, chronisch / rezidivierend

Homosexualität	Definition	Homosexualität per se ist kein Rückweisungs- oder Ausschlussgrund. Siehe 1413_DOK_Classification_Risk_Behaviour_D
	Siehe auch	Risikoverhalten, sexuell

Hordeolum	Definition	Gerstenkorn. Akute, eitrige Entzündung / Abszess des Augenlidrands (Entzündung der Talgdrüsen oder der apokrinen Schweißdrüsen). Heilt in der Regel spontan ab.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung bis die Infektion abgeklungen ist
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Blepharitis



Hormonbehandlung	Definition	Therapeutische Anwendung von synthetischen oder natürlichen Hormonen bei Erkrankungen oder Beschwerden, die durch ein Hormondefizit verursacht werden. z.B.: Schilddrüsenhormon bei Hypothyreose, Östrogene in der Menopause, Somatotropin bei Kleinwuchs, Hormonbehandlung bei Infertilität.
	Zu beachten	Immer Ursache für die Hormontherapie abklären
	Registrierung	Akzeptieren bei Anwendung synthetischer oder rekombinanter Hormone, wenn die Grunderkrankung dies erlaubt Nicht akzeptieren, bei Anwendung von Hormonen humanen Ursprungs
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
Hornhaut, Transplantation	Definition	Übertragung von Hornhaut (Cornea), Risiko der Übertragung von Prionen, Creutzfeld-Jakob Krankheit
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Wie Registrierung , Information an das TZ
	MC	Wie Registrierung , Risk acceptance durch TZ
	Siehe auch	Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, Risiko 1_Übertragung von menschlichem Gewebe
Hörsturz	Definition	"Ohrinfarkt". Plötzlich auftretender, meist einseitiger Hörverlust ohne auslösende oder verursachende Faktoren. Kann geringgradig sein oder bis zur Gehörlosigkeit gehen. Vermutlich aufgrund Durchblutungsstörung im Innenohr.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss



HTLV I/II, Infektion	Definition	Humanes T-lymphotropes Virus. Retrovirus, infiziert Menschen und andere verwandte Primaten und verursacht v.a. adulte T-Zell-Leukämie und die HTLV-1-assoziierte Myelopathie (Tropische Spastische Paraparese). Übertragung vertikal / transplazentär, via Blut (Transfusion infizierter Blutprodukte), durch Sexualkontakt. Endemisch in bestimmten Gebieten Afrikas (Sub-Sahara), Südamerika, Karibik, Japan.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss

Hüft-Prothese	Gehe zu	Operation / Eingriff_3_mittel
----------------------	---------	-------------------------------

Humane Papilloma Viren (HPV)	Definition	DNA-Virus, der Haut und Schleimhäute infiziert mit Bildung gutartiger Tumoren/Warzen am Ort der Infektion (Genitalwarzen, Feigwarzen). Übertragung via Hautkontakt, bei bestimmten Typen via ungeschützten Geschlechtsverkehr. HPV-Infektion ist eine der häufigsten sexuell übertragbaren Infektionen. Einige Virustypen (High-risk Typ) treten extrem gehäuft in Zusammenhang mit Karzinomen auf, v.a. Zervixkarzinom. Virus kann nach Infektion inaktiv bleiben, Manifestation erst Monate später möglich. Präventive Impfung möglich.
	Registrierung	Akzeptieren, wenn anamnestisch keine andere sexuell übertragbare Krankheit vorliegt
	CT / VT	Wie Registrierung und Information TZ falls symptomatisch
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Risikoverhalten, sexuell

Huntington-Chorea	Definition	Auch Chorea Huntington, Huntington-Krankheit. Unheilbare, erbliche neurodegenerative Erkrankung des Gehirns mit Bewegungsstörungen und psychischen Störungen. Immer schwerer Verlauf, führt durchschnittlich nach 15 Jahren zum Tod.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss



Hypercholesterinämie	Definition	Zu hoher Cholesterinspiegel im Blut. Relevanter Risikofaktor für die Arteriosklerose / kardiovaskuläre Ereignisse. Ursache vielfältig. Primär: Erbkrankheit (familiäre Hypercholesterinämie) Sekundär: bei Diabetes, Übergewicht, Alkoholismus, Hypothyreose, Niereninsuffizienz etc.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss wenn assoziiert mit kardiovaskulärer Erkrankung
	MC	Wie CT / VT
Hyperhidrose	Definition	Unphysiologische starke Schweissbildung. Kann generalisiert oder lokal (zB. Handflächen) auftreten. Unterteilung in primäre (keine identifizierbare Ursache) und sekundäre Hyperhidrose (identifizierbare Ursache, zB. Diabetes mellitus, Tumor, Infektionskrankheiten, endokrine oder psychische Störungen).
	Registrierung	Akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • Ursache primär • Zugrundeliegende Erkrankung bei sekundärer Hyperhidrose kein Ausschlussgrund ist
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Botox Behandlung
Hypermobilitätssyndrom	Gehe zu	Ehlers-Danlos Syndrom



Hyperparathyreoidismus	Definition	Vermehrte Sekretion von Parathormon (PTH) durch die Nebenschilddrüsen, welches den Calciumstoffwechsel massgeblich steuert, wodurch eine Hyperkalzämie entsteht.
	Registrierung	Akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • operativ therapiert oder milde Ausprägung mit oder ohne medikamentöse Therapie, • keine Malignität und • prämenopausal
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung

Hyperthyreose	Gehe zu	Schilddrüsenerkrankung
----------------------	---------	------------------------

Hypertonie, arteriell	Definition	Erhöhter Druck im arteriellen Gefässsystem. Meist nur unspezifische Symptome. Definition: $\geq 160/100$ (Grad 2 gemäss ESH European Society of Hypertension) Ursachen: Bis zu 95% primäre (essentielle Hypertonie): keine organische Ursache. In 5-15% sekundäre Hypertonie wegen Grundkrankheit, z.B. Störungen des Hormonsystems, Herz-Kreislaufsystems sowie Nierenschäden. Mögliche Folgeschäden: Koronare Herzkrankheit, Nierenversagen, Schlaganfall
	Registrierung	Akzeptieren, wenn unter antihypertensiver Therapie Blutdruck gut eingestellt und symptomfrei Nicht akzeptieren, solange unter Abklärung
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Bradykardie Kardiovaskuläre Erkrankung



Hypoglykämie	Definition	Stark erniedrigter Blutzuckerspiegel. Diverse Ursachen möglich.
	Registrierung	Ursache muss abgeklärt sein. Entscheid je nach Grunderkrankung. Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Diabetes mellitus
Hypogonadismus	Definition	Verminderte Sexualhormone aufgrund Keimdrüsen- (Hoden / Ovarien) oder zentraler Dysfunktion (Hypophyse / Thalamus).
	Registrierung	Akzeptieren , wenn: <ul style="list-style-type: none"> • Ursache kein Ausschlusskriterium • keine Osteoporose • unter adäquater Therapie
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
Hypothyreose	Gehe zu	Schilddrüsenerkrankung
Hypotonie	Definition	Blutdruck systolisch < 100 mmHg, diastolisch < 50 mmHg
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
Hysterektomie	Gehe zu	Operation / Eingriff_3_mittel



IgA-Mangel	Definition	Häufigster primärer Immundefekt. Viele Betroffene sind asymptomatisch, bei anderen erhöhte Infektanfälligkeit mit Entwicklung rezidivierender Infektionen der Luftwege und Autoimmunerkrankungen. IgG- und IgM-Werte sind normal Partieller IgA-Mangel: IgA-Wert unter der altersentsprechenden Norm Kompletter IgA-Mangel: IgA < 0.05 g/l
	Registrierung	Nicht akzeptieren. Dem Empfänger würde dadurch ein potentiell krankhaftes Immunsystem übertragen.
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Immunglobulinmangel

Ikterus	Gehe zu	Gelbsucht
----------------	---------	-----------

Ileostoma	Gehe zu	Stoma
------------------	---------	-------

Immunglobulinmangel	Definition	Verminderte Konzentration einer Immunglobulinklasse im Blut. Die am häufigsten betroffene Klasse ist das IgA.
	Registrierung	Nicht akzeptieren ; dem Empfänger würde dadurch ein potentiell krankhaftes Immunsystem übertragen werden.
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Common variable immune deficiency, CVID IgA-Mangel



Immunobiotherapie	Definition	<p>Behandlungsform, bei welcher das Immunsystem beeinflusst wird. Verschiedene Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stimulierend: aktive Impfung, Gabe von Immunstimulantien (aktive unspezifische Immuntherapie bei Tumorerkrankungen) • Supprimierend (Gabe von Immunsuppressiva): bei Autoimmunerkrankungen, nach (Organ)-Transplantation • Substituierend: passive Impfung mit Immunglobulinen, Gabe monoklonaler Antikörper (z.B. M.Crohn, spezifische Immuntherapie bei Tumorerkrankungen) • Modulierend: Hyposensibilisierung bei Allergien, Immunadsorption zur Entfernung von Autoantikörpern oder Immunkomplexen
	Registrierung	<p>Akzeptieren bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktiven Impfungen mit Rückweisungsfrist gemäss Anhang Art. 7, Vaccine Check • Anti-D Rhesusprophylaxe (Rhophylac®) (siehe auch Rückweisungsfrist Schwangerschaft / Abort) • De-/Hyposensibilisierung bei Allergien • Bakterielle Präparate (z.B. Broncho-Vaxom®, Buccalin® etc.), wenn keine chronische Grunderkrankung oder rezidivierende Infektion vorliegt • Präparate tierischen Ursprungs (z.B. Präparate bovinen Ursprungs wie Bio-Oss®, Bio-Gide®, Cerabone®), wenn keine chronische Grunderkrankung oder rezidivierende Infektion <p>Rückweisung für 12 Monate nach Absetzen von Serotherapie / Immunobiotherapie mit Präparaten menschlichen Ursprungs (z.B. Cytotect®, Hepatect®, Tollwut- oder Tetanus Passivimpfstoff, Varitect®)</p> <p>Nicht akzeptieren, wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einsatz zur Behandlung von Autoimmunerkrankheiten, Tumorerkrankungen, chronischen Grunderkrankungen oder rezidivierenden Infektionen
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Impfliste



Immunsuppression	Registrierung	Nicht akzeptieren , ausser topisch (z.B. Cortison-Salbe)
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Autoimmunerkrankung Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, Risiko 1_Übertragung von menschlichem Gewebe Immunobiotherapie
Immunthrombozytopenie (ITP)	Definition	Idiopathische thrombozytopenische Purpura. Autoimmunerkrankheit. Abbau der Thrombozyten durch freie und thrombozytenggebundene Antikörper → Thrombopenie <ul style="list-style-type: none"> • akute ITP: betrifft v.a. Kinder, verschwindet meist spontan • chronische ITP: betrifft v.a. Erwachsene (Morbus Werlhof). Fast immer chronischer Verlauf
	Registrierung	Nicht akzeptieren, ausser bei einmaliger Episode in der Kindheit mit vollständiger Erholung
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Impfliste	Definition
Impfung	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren gemäss Impfliste / Anhang Art. 7, Vaccine Check: Rückweisungsfrist nach Impfungen
	MC	Wie CT / VT



Infekt der oberen Atemwege

Definition	Akute, meist virale Infektionskrankheit der Schleimhaut von Nase (mit / ohne Nebenhöhlen), Hals oder Bronchien
Registrierung	Akzeptieren
CT / VT	Akzeptieren bei leichten Erkältungssymptomen und wenn Beschwerden rückläufig Rückweisung für 1 Woche bei Fieber und schlechtem Allgemeinzustand Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
MC	Akzeptieren bei leichten Erkältungssymptomen und wenn Beschwerden rückläufig Rückweisung für 2 Wochen bei Fieber und schlechtem Allgemeinzustand Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
Siehe auch	Sinusitis (Rhinosinusitis), akut

Infektionskrankheit

Zu beachten	Immer Ursache abklären. Das Vorgehen wird bei der jeweiligen Erkrankung aufgeführt.
Registrierung	Nicht akzeptieren, wenn chronische Infektion
CT / VT	Rückweisung, wenn akute Infektion, Dauer je nach Infektion und Heilungszustand des Spenders Normalerweise Rückweisung 2 Wochen nach Absetzen der Antibiotika und bis zur vollständigen Genesung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
MC	Wie CT / VT



Infektionskrankheit, Kontakt	Definition	Direkter Kontakt mit einer erkrankten Person ohne selbst krank zu sein.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren oder Rückweisung in Abhängigkeit der Grundkrankheit Akzeptieren, wenn Immunität vorhanden (Krankheit durchgemacht, Spender geimpft) Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Akzeptieren, wenn Immunität vorhanden (Krankheit durchgemacht, Spender geimpft) Rückweisung für 1 Monat nach letztem Kontakt, in Abhängigkeit der Grundkrankheit Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
Infektmarker (IDM) unspezifisch positiv	Zu beachten	Vorgehen gemäss SBSC Policies und Vorschriften BSD, beschrieben in - POL_003, Pkt. 3.1 und 4.1 - Kapitel 11A_Spendenanalytik_Infektmarker_BSD
	CT / VT	Akzeptieren, wenn Screeningtest positiv und Konfirmationstest negativ. Resultat als negativ erfassen und positiven Screeningtest als Bemerkung dokumentieren. Nach Bedarf zusätzlich NAT-Test
	MC	Wie CT / VT
Inguinalhernie	Gehe zu	Operation / Eingriff_3_mittel
Inokulationsverletzung	Gehe zu	Kontakt mit Fremdblut
Isotretinoin	Gehe zu	Teratogene Medikamente



Kala-Azar	Gehe zu	Leishmaniose
Kardiale Erkrankung	Definition	Herzerkrankung
	Siehe auch	Endokarditis Herzfehler, angeboren Herzinsuffizienz Herzklappenfehler Herzrhythmusstörung Kardiomyopathie Perikarditis / Perikarderguss
Kardiomyopathie	Definition	Erkrankung des Myokards / Herzmuskelerkrankung: sehr heterogene Gruppe von Krankheiten des Herzmuskels mit mechanischer und/oder elektrischer Funktionsstörung. Einteilung in: <ul style="list-style-type: none"> • primär: genetisch /gemischt gen.-erworben/ erworben • sekundär: Herz ist im Rahmen systemischer Krankheitsprozesse betroffen: z.B. Speicherkrankheiten, Entzündungen, Infektionen, Autoimmunkrankheit, toxisch, endokrinologische Ursachen
	Registrierung	Nicht akzeptieren, ausser: Status nach Begleitmyokarditis einer viralen Erkrankung und komplette Genesung ohne Therapie
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung MC mit kardiologischer Abklärung



Kardiovaskuläre Erkrankung	Definition	Erkrankung, die vom Gefässsystem und/oder vom Herz ausgeht. Dazu gehören: <ul style="list-style-type: none"> • Koronare Herzkrankheit (KHK) / Angina pectoris • Herzinfarkt (Koronarthrombose) • Periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK) /Claudicatio intermittens • Gefässaneurysma, z.B. Aortenaneurysma • Status nach Stenteinlage / Bypass-Operation
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
	Siehe auch	Hypertonie, arteriell
Karpaltunnel-Syndrom	Definition	Nervenkompressionssyndrom des Nervus medianus im Bereich der Handwurzel. Therapie konservativ oder operativ.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 1 Monat nach der Operation und bis zur vollständigen Genesung
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Operation / Eingriff_2_klein
Katarakt	Definition	Grauer Star. Trübung der Augenlinse. Therapie operativ, Ersatz der trüben Linse durch künstliches Linsenimplantat
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 1 Monat nach Eingriff
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Operation / Eingriff_2_klein
Kehlkopfentzündung	Gehe zu	Laryngitis



Keuchhusten	Definition	Pertussis. Infektion mit dem Bakterium Bordetella pertussis. Hochansteckend. Keuchhusten ist vor allem als Kinderkrankheit bekannt, betrifft aber auch Erwachsene.
	Registrierung	Rückweisung für 1 Monat nach vollständiger Genesung
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung

Keuchhusten, Kontakt	Gehe zu	Kinderkrankheiten, Kontakt
-----------------------------	---------	----------------------------

Kinderkrankheit	Definition	Infektionskrankheit mit hoher Durchseuchungsrate und Übertragungsfähigkeit, die typischerweise eine lebenslange Immunität hinterlässt und daher überwiegend im Kindesalter auftritt.
	Siehe auch	Herpes Zoster Masern Mumps Poliomyelitis Ringelröteln Röteln

Kinderkrankheiten, Kontakt	Definition	Direkter Kontakt mit einer an einer Kinderkrankheit erkrankten Person.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren
	MC	Akzeptieren, wenn Immunität vorhanden (Krankheit durchgemacht, geimpft) Rückweisung für 1 Monat nach letztem Kontakt, in Abhängigkeit von der Grundkrankheit Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin



Kinderwunsch	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Die Spenderin muss darüber informiert werden, dass sie nicht früher als 2 Monate nach der Spende schwanger werden sollte. Zum Wohle des Patienten (mögliche Nachfolgespende) wäre es wünschenswert, dass diese Latenz länger ist (4-6 Monate).
	MC	Wie CT / VT
Klinefelter Syndrom	Definition	Numerische Chromosomenaberration XXY
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren
	MC	Akzeptieren
Klinische Versuchsstudien	Definition	Teilnahme an einer klinischen Studie zur Beantwortung medizinisch-wissenschaftlicher Fragestellungen und zur Verbesserung der medizinischen Behandlung.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
Knie-Prothese	Gehe zu	Operation / Eingriff_3_mittel



Knochen- und Sehnen-implantate	Definition	Auch Knochenaugmentation.
	Registrierung	Nicht akzeptieren: Schädelknochen und Dura mater Implantate Einsatz folgender Produkte akzeptieren: <ul style="list-style-type: none"> • Bio-Oss© (aus dem mineralischen Anteil bovinen Knochens) • Bio-Oss Collagen© (90% Bio-Oss) • Bio-Gide© (porcine Kollagenmembran) • Cerabone® • Autograft • Menschliche Knochen- oder Sehnenallografte (ausser Schädelknochen)
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, Risiko 1_Übertragung von menschlichem Gewebe

Knochenbruch	Definition	Fraktur
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung nach operativer Behandlung situativ beurteilen Rückweisung für 1 Monat nach der Gipsentfernung Bei Fraktur von Femur, Becken, Sacrum oder Wirbel: evtl. nur PBSC möglich, Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin bei präventiver Behandlung mit Antikoagulanzen
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Operation / Eingriff_2_klein Operation / Eingriff_3_mittel Operation / Eingriff_4_gross

Knorpeloperation	Gehe zu	Operation / Eingriff_3_mittel
-------------------------	---------	-------------------------------

Kokain	Gehe zu	Drogengebrauch
---------------	---------	----------------



Komplexes regionales Schmerzsyndrom, (Complex regional pain syndrome, CRPS)	Definition	Komplikation nach Verletzung oder Operation der Extremitäten. Posttraumatisches Schmerzsyndrom mit unverhältnismässig starken / langdauernden Schmerzen, Durchblutungsstörungen, Bewegungseinschränkung und Wachstumsstörungen. Neuronale Entzündung, führt im Verlauf zu Dystrophie und Atrophie der Gliedmassen (früher: M. Sudeck)
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Konjunktivitis	Definition	Entzündung der Bindehaut des Auges
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 1 Monat nach vollständiger Heilung und 2 Wochen nach Absetzen einer allfälligen systemischen Antibiotika-Therapie
	MC	Wie CT / VT
Kontakt mit Fremdblut	Definition	Kontakt mit Fremdblut über Haut, Schleimhaut oder Nadelstichverletzung
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 1 Monat nach Ereignis
	MC	Rückweisung für 2 Monate nach Ereignis
	Siehe auch	Hepatitis Risikosituation Risikotätigkeiten



Kontrazeption, hormonal	Definition	Kontrazeption durch östrogen- und/oder gestagenhaltige Präparate.
	Registrierung	Akzeptieren, ausser bei St.n. thrombo-embolischem Ereignis oder weiterem konstitutionellem Thromboserisiko
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Thrombophilie
Kopfschmerzen	Zu beachten	Immer nach Dauer, Häufigkeit, möglicher Ursache oder Auslöser fragen!
	Registrierung	Akzeptieren, falls nur gelegentliche Kopfschmerzen, wenn der Spender sich sonst gesund fühlt Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin, wenn Kopfschmerzen häufig und / oder regelmässig auftreten
	CT / VT	Wie Registrierung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Cluster-Kopfschmerzen Migräne
Kopfverletzung allgemein	Definition	Verletzung des Schädels durch Gewalteinwirkung von aussen, mit oder ohne Hirnbeteiligung.
	Zu beachten	Von aussen harmlos erscheinende Kopfverletzung kann schwerwiegende Folgen haben, wenn tatsächliches Ausmass unerkannt bleibt. Allfällige neurologische Symptome beachten, wie Kopfschmerz, Schwindel, Übelkeit, Erinnerungslücken, Bewusstlosigkeit.
Kopfverletzung, leicht	Definition	Kopfverletzung mit Riss- / Platzwunde oder Schwellungen.
	Registrierung	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung



Kopfverletzung, schwer	Definition	Kopfverletzung mit Schädelverletzung / Schädelfraktur / Schädel-Hirn-Trauma. Hirngewebe verletzt oder in seiner Funktion gestört: <ul style="list-style-type: none"> • Gehirnerschütterung (Commotio cerebri) • Gehirnprellung (Contusio cerebri) • Gehirnquetschung (Compressio cerebri) Komplikationen: Bewusstlosigkeit, Hirndruck, Epidural- oder Subduralblutung. Neurologische Spätfolgen, z.B. Epilepsie.
	Registrierung	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung Nicht akzeptieren, wenn neurologische Spätfolgen Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Epilepsie Hirnblutung, unfallbedingt
Koronare Herzkrankheit	Gehe zu	Kardiovaskuläre Erkrankung
Koronarthrombose	Gehe zu	Kardiovaskuläre Erkrankung
Körperliche Einschränkung	Definition	Körperliche Behinderung, auch Blindheit, Taubheit.
	Registrierung	Akzeptieren , wenn: <ul style="list-style-type: none"> • Entnahme durchführbar • Informed Consent möglich • kein erhöhtes Thromboserisiko Beim Ausfüllen des medizinischen Fragebogens und der Einverständniserklärung ist sicherzustellen, dass der Spender die Fragen unbefangen beantworten kann.
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Paraplegie / Tetraplegie



Krampfaderentfernung	Gehe zu	Venenablationstherapie
Krampfadern	Gehe zu	Varizen, Beine
Krampfanfall	Definition	Unwillkürlich ausgelöstes Ereignis, welches sich mit krampfartigen oder zuckenden Bewegungen äussert.
	Registrierung	Nicht akzeptieren so lange Ursache unklar Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Alkoholkonsum Anfälle, psychogen Epilepsie Hirntumor, gutartig Hypoglykämie
Kraniopharyngeom	Definition	Dysontogenetischer, benigner Tumor, der durch eine Fehlbildung von Restgewebe im Bereich der Hirnanhangdrüse entsteht. Auch Erdheim-Tumor.
	Registrierung	Nicht akzeptieren, auch wenn operiert
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Krebs	Definition	Maligne Erkrankung
	Registrierung	Nicht akzeptieren, ausser: <ul style="list-style-type: none"> • Basaliom • Zervixkarzinom in situ ohne Chemo- oder Radiotherapie
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
Kreislaufkollaps	Gehe zu	Bewusstlosigkeit



Kropf	Gehe zu	Schilddrüsenerkrankung
--------------	---------	------------------------

Kugelzellanämie	Gehe zu	Sphärozytose, hereditäre
------------------------	---------	--------------------------

Kürettage, uterin	Definition	Abrasio uteri. Ausschabung der Gebärmutterschleimhaut.
	Registrierung	Akzeptieren, falls keine maligne Erkrankung
	CT / VT	Ausschluss falls maligne Erkrankung Rückweisungsdauer je nach Grund für den Eingriff
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Abort

Laktose-Intoleranz	Definition	Störung der Laktose-Verdauung als Folge eines Laktase-Mangels oder Laktose-Malabsorption. Angeboren, primär oder sekundär.
	Registrierung	Akzeptieren, wenn asymptomatisch Nicht akzeptieren bei sekundärer Laktose-Intoleranz, wenn die Grunderkrankung eine Kontraindikation darstellt
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Nahrungsmittelallergie Nahrungsmittelvergiftung

Lambliasis	Gehe zu	Durchfallerkrankung
-------------------	---------	---------------------



Laminektomie	Definition	Entfernung von Wirbelbögen an der Wirbelsäule, ein- oder beidseitig, zur Erweiterung des Rückenmarkkanals, Fenestration
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • Operation vor > 3 Monaten, Therapie abgeschlossen und Spende physisch möglich
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Diskushernie/DH-Operation Operation / Eingriff_3_mittel
Länderliste	Definition	Anhang Art. 7, Travelcheck, Liste von Ländern mit hohem viralem oder parasitärem Infektionsrisiko Vorschriften Blutspende SRK Schweiz
Laryngitis	Definition	Kehlkopfentzündung
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 2 Wochen nach Absetzen der Antibiotikabehandlung und bis zur vollständigen Genesung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT
Laserbehandlung	Definition	Anwendung eines Lasers zur paramedizinischen oder kosmetischen Zwecken z.B. Entfernung von Hautflecken, Tätowierungen, Haarentfernung. Die behandelte Hautfläche muss intakt sein!
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren ausser bei Entfernung von Tätowierung --> Rückweisung für 2 Wochen nach letzter Behandlung
	MC	Wie CT / VT



Legionärskrankheit	Definition	Legionellose. Bakterielle Infektion durch Bakterien der Gattung Legionella, häufigster Erreger (90-95%) ist Legionella pneumophila. Durch Tröpfcheninfektion hervorgerufene, lebensbedrohliche Pneumonie (Legionärskrankheit). Daneben möglich sind Wundbefall, Endokarditiden und Pyelonephritiden.
	Registrierung	Akzeptieren nach vollständiger Genesung (keine residuellen Atembeschwerden) und sofern allfällige Grunderkrankung dies erlaubt
	CT / VT	Rückweisung für 1 Monat nach vollständiger Genesung (keine residuellen Atembeschwerden) und Behandlungsabschluss und sofern allfällige Grunderkrankung dies erlaubt
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Pneumonie

Leishmaniose	Definition	Weltweit bei Mensch und Tier vorkommende Infektionserkrankung, die durch obligat intrazelluläre protozoische Parasiten der Gattung Leishmania verursacht wird. Erreger kommen in praktisch allen warmen Ländern vor. Übertragung v.a. durch Sandmücken, oft via infizierte Hunde (Mittelmeerraum) Formen der Leishmaniose: viszeral / kutan / mukokutan, Ausprägung abhängig von Immunkompetenz des infizierten Organismus. Bei viszeraler Form Leber, Milz, Knochenmark betroffen.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss



Leptospirose	Definition	Bakterielle Infektion durch Bakterien der Gattung <i>Leptospira</i> (Spirochäten). Vorkommen in Boden und Wasser, aber auch als Parasiten von Wild- und Haustieren. Überträger v.a. Nager (Mäuse, Ratten) auch Schweine & Rinder (Schweinehüterkrankheit). Übertragung auf den Menschen via Kontakt mit Urin, Blut, Gewebe infizierter Tiere oder verunreinigtem Wasser (meldpflichtige Zoonose). Formen: u.a. Morbus Weil, Batavia-Fieber, Feldfieber, Schweinehüterkrankheit.
	Registrierung	Rückweisung bis 2 Wochen nach vollständiger Genesung
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung

Lichen simplex (chronicus)	Definition	Neurodermitis circumscripta. Lokale, chronisch-entzündliche, plaque-förmige Hauterkrankung. Verlauf in Schüben, starker Juckreiz.
	Registrierung	Akzeptieren, wenn <ul style="list-style-type: none">• der betroffene Bereich flächenmässig klein ist• Einstichstellen läsionsfrei• Lokalbehandlung ausreichend ist Antihistaminika für den Juckreiz sind akzeptabel
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Ekzem

Lipödem	Definition	Anlagebedingte Fettverteilungsstörung, die im Verlauf zu einer pathologischen Vermehrung des Unterhautfettgewebes an Beinen und Armen führt. Chronische Beschwerdesymptomatik mit Berührungs- und Druckschmerzen, Spontanschmerzen. Neigung zu Ödemen und Blutergüssen. Wird in Stadien der Hautveränderungen I-III eingeteilt. Auftreten fast ausschliesslich bei Frauen.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung



Lipom	Definition	Gutartiger Fettgewebstumor. Meist im Subkutangewebe lokalisiert.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie CT / VT
Lithiumbehandlung	Definition	Medikament zur Behandlung von bipolaren Störungen, Manie, Depression. Teratogenes Medikament.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
	Siehe auch	Psychiatrische Erkrankung Teratogene Medikamente
Long Covid (Post Covid Syndrom)	Definition	Syndrom mit vielfältiger Ausprägung, ohne dass zum heutigen Kenntnisstand ein einheitliches pathophysiologisches Korrelat bekannt ist.
	Zu beachten	Aufgrund der unklaren/ uneinheitlichen Pathophysiologie gelten die Rückweisungsfristen der einzelnen Symptome: Siehe Pneumonie/ Atembeschwerden; Kopfschmerzen; Bronchitis/ Husten; Depression; etc. Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt
	Siehe auch	Anosmie/ Parosmie / Ageusie Depression Kopfschmerzen Pneumonie
Luftröhrentzündung	Gehe zu	Tracheitis



Lumpektomie	Definition	Brusterhaltende chirurgische Entfernung eines kleinen Tumors aus der Brust.
	Siehe auch	Krebs Operation / Eingriff_2_klein Operation / Eingriff_3_mittel Operation / Eingriff_4_gross
	<hr/>	
Lungenembolie	Definition	Verstopfung eines Blutgefässes in der Lunge. Ausgelöst in ca. 80% durch Thrombus in den tiefen Bein- oder Beckenvenen.
	Zu beachten	Thromboserisiko durch G-CSF erhöht
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
<hr/>		
Lungenemphysem	Definition	Irreversible Überblähung der Alveolen (Lungenbläschen) der Lunge. Endpunkt verschiedener chronischer Lungenerkrankungen.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
	Siehe auch	COPD



Lyell-Syndrom	Definition	Epidermolysis acuta toxica, toxische epidermale Nekrolyse, TEN. „Syndrom der verbrühten Haut“. Seltene, akute Hautveränderung mit blasiger Ablösung der Epidermis. Lebensbedrohliche Dermatose, Mortalitätsrate 25 –70%, je nach Ausmass. 2 Formen: - medikamentös induziert: schwerste allergische Arzneimittel-Nebenwirkung, u.a. auf Antibiotika (Sulfonamide), Antiepileptika (Phenytoin), Analgetika, NSAR (Metamizol, Ibuprofen, Diclofenac), Allopurinol. - staphylogenen: durch das Exotoxin der Staphylococcus aureus bedingt, betrifft v.a. Säuglinge in den ersten 3 Lebensmonaten oder immungeschwächte Erwachsene. Oft voraus lokalisierte Impetigo. TEN ist die schwerste Form der toxischen Epidermolyse, „Vorstufe“ ist das Stevens-Johnson-Syndrom (SJS)
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Stevens-Johnson-Syndrom

Lyme-Krankheit	Gehe zu	Borreliose
-----------------------	---------	------------

Lymphangitis	Definition	Entzündung der Lymphbahnen von Haut und Subkutis, welche meist durch Bakterien oder seltener durch Toxine hervorgerufen wird.
	Registrierung	Akzeptieren, sofern Grunderkrankung dies erlaubt
	CT / VT	Akzeptieren 1 Monat nach vollständiger Genesung und Absetzen allfälliger Antibiotika-Therapie
	MC	Wie CT / VT

Lymphogranuloma venereum	Definition	Auch Venerisches Granulom, Lymphogranuloma inguinale. Sexuell übertragbare Erkrankung, in den Tropen häufig. Erreger: Serotypen L1-L3 von Chlamydia trachomatis
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
	Siehe auch	Sexuell übertragbare Krankheit



Magen-Bypass	Registrierung	Akzeptieren 1 Jahr nach Operation, falls: <ul style="list-style-type: none"> • Grunderkrankung kein Ausschlusskriterium • Komplikationsloser Verlauf • BMI < 40 • Guter Allgemeinzustand • Letzte Verlaufsuntersuchung ohne Auffälligkeiten Sonst Spendetauglichkeit im Ermessen des Arztes
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Operation / Eingriff_4_gross
Magen-Darm-Entzündung	Gehe zu	Durchfallerkrankung
Magengeschwür	Gehe zu	Ulcus ventriculi / Ulcus duodeni
Malaria, durchgemacht	Definition	Durchgemachte Infektion, Erreger: Parasit der Gattung Plasmodium
	Registrierung	Akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • Erkrankung vor > 3 Jahren und keine Krankheitszeichen mehr
	CT / VT	Akzeptieren wenn: <ul style="list-style-type: none"> • Erkrankung vor > 3 Jahren • Spender behandelt und seither asymptomatisch • Malariatest durchführen (Antikörpertest und NAT)
	MC	Wie CT / VT Test bei Medical CheckUp wiederholen, auch wenn Test bei CT negativ war



Malaria, Risiko	Definition	Aufenthalt in einem Malaria-Endemiegebiet: siehe Anhang Art. 7, Travelcheck Zeitraumen: <ul style="list-style-type: none"> • Im Falle von Kurzaufenthalt: innerhalb der letzten 12 Monate • Im Falle von Langzeitaufenthalt > 6 Monate am Stück: Je im Laufe des Lebens
	Zu beachten	Immer Information ans Transplantationszentrum durch SBSC -> Entscheid über Spenderakzeptanz situativ
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 3 Monate nach Rückkehr aus Endemiegebiet Danach akzeptieren ohne Malariatest zum Zeitpunkt CT (Test wird beim MC durchgeführt): <ul style="list-style-type: none"> • bei Kurzaufenthalt (< 6 Monate) ohne Fieber / andere Symptome während oder nach Aufenthalt Akzeptieren mit Malariatest zum Zeitpunkt CT: <ul style="list-style-type: none"> • bei Kurzaufenthalt (< 6 Monate) mit Fieber / anderen Symptomen während oder nach Aufenthalt • bei Langzeitaufenthalt > 6 Monate mit oder ohne Fieber / andere Symptome während oder nach Aufenthalt • Malaria durchgemacht --> Gehe zu: Malaria, durchgemacht <p>Malariatest = Antikörpertest und NAT!</p>



MC

Immer Frage nach Aufenthalt in Malariagebiet in den letzten 12 Monaten

Bei allen Risikogruppen:

- Rückweisung für 4 Monate nach Rückkehr
- wenn Aufenthalt in Malariagebiet in den letzten 12 Monaten: bei MC immer Malariatest durchführen
- In jedem Fall: wenn Test bei CT / VT gemacht wurde, bei Medical CheckUp wiederholen
- Nicht akzeptieren, wenn aktueller Malariatest positiv. Bei grenzwertigem Befund Konsultation einer Spezialistin.

Malariatest = Antikörpertest und NAT!

Ausnahmeregelung:

In sehr dringenden Fällen kann das TZ entscheiden, unter Akzeptanz des Risikos, die Rückweisungsfrist von 4 Monaten zu kürzen:

- Rückweisung für **mindestens 3 Wochen** nach Rückkehr, dann NAT und AK testen
- Wenn NAT **negativ**: akzeptieren und **NAT am Entnahmetag wiederholen**
- Wenn NAT **am Entnahmetag negativ**: dokumentieren und Resultat an TZ weiterleiten

Malariaprohylaxe

Gehe zu

Malaria, Risiko

Nr: 1410	Name: DOK_Donor_Eligibility_Criteria_Blood_Stem_Cell_Donation_D	Version: 10.0	Gültig ab: 14.08.2026
			Seite: 107 von 191



Maligne Hyperthermie	Definition	Autosomal-dominant vererbte subklinische Myopathie. Lebensbedrohliche Funktionsstörung der Skelettmuskulatur, getriggert durch gasförmige Inhalationsanästhetika und depolarisierende Muskelrelaxantien (z.B. Halothan, Succinylcholin), welche bei Narkosen und auf Intensivstationen Anwendung finden. Bei Verdachtsfall in der Familie: Abklärung potentiell betroffener Familienmitglieder
	Registrierung	<p>Akzeptieren, wenn</p> <p>maligne Hyperthermie in der Familienanamnese bekannt ist, Spender abgeklärt und MH negativ ist (Abklärung: Muskelbiopsie und in vitro Kontrakturtest)</p> <p>Nicht akzeptieren, wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spender selbst betroffen • Verwandte ≤ 4. Grad betroffen (näher oder gleich verwandt wie Urgrosseltern, Grosstante/-onkel, Cousine, Grossnichte/-neffe, Urenkel/-in) und Spender nicht abgeklärt ist
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung

Marfan-Syndrom	Definition	<p>Autosomal-dominant vererbte Erkrankung des Bindegewebes (Bindegewebsschwäche). Betroffen sind v.a. Skelett-, kardiovaskuläres System und Augen, Ausprägungen unterschiedlich. Merkmale z.B.:</p> <p>Skelett: langer, schlanker Körperbau (<u>Hochwuchs</u>) mit auffällig langen <u>Extremitäten</u> und Fingern (Arachnodaktylie). Kardial: u.a. Dilatation der Aortenwurzel, „Floppy valves“ Herzklappeninsuffizienz.</p> <p>Augen: Linsenluxation, Kurzsichtigkeit.</p>
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss



Masern	Definition	Hochansteckende Infektionskrankheit, die v.a. Kinder betrifft. RNA-Virus aus der Familie der Paramyxoviren. Lebensbedrohliche Komplikationen wie Lungen- und Hirnentzündungen möglich.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 1 Monat nach vollständiger Genesung
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Kinderkrankheiten, Kontakt
Mastoiditis	Definition	Entzündung des Warzenfortsatzes des Schläfenbeins mit Knocheneinschmelzung. Die Mastoiditis ist eine Komplikation der akuten Mittelohrentzündung.
	Registrierung	Akzeptieren nach vollständiger Genesung und Abschluss der Behandlung
	CT / VT	Rückweisung für 2 Monate nach vollständiger Genesung und Abschluss der Behandlung
	MC	Wie CT / VT
Mastoidoperation	Gehe zu	Operation / Eingriff_3_mittel
Mastozytose	Definition	Wahrscheinlich genetisch verursachte Überproduktion der Mastzellen im Körper. Wird in die kutane (erhöhte Anzahl Mastzellen im Gewebe) und in die systemische Mastozytose eingeteilt (erhöhte Zahl von Mastzellen in Organen und im Knochenmark). Atypische Mastzellen mit gestörter Regulierung der Mastzellaktivierung. Stadien der systemischen Mastozytose: indolent → aggressiv → Mastzelleukämie.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung



Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-Syndrom (MRKH)	Definition	Angeborene Fehlbildung des weiblichen Genitals in Form von Vaginalaplasie mit oder ohne Uterusaplasie, vermutlich aufgrund Chromosomenanomalie. Dabei ist die Ovarialfunktion erhalten, wodurch eine normale Entwicklung der sekundären Geschlechtsmerkmale möglich ist. Häufigkeit: ca. 1:5000 Komplikation: ev. begleitende Fehlbildung der Nieren oder der Harnwege, oder eine skelettale Fehlbildung (Wirbelsäule)
	Registrierung	Akzeptieren, wenn Nierenfunktion normal und keine skelettale Fehlbildung
	CT / VT	Wie Registrierung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT
Medikamente	Gehe zu	Arzneimittel-behandlung
Medikamentenliste	Definition	Anhang Art. 7, Mediliste, Rückweisungsfristen bei / nach Einnahme von Medikamenten Vorschriften Blutspende SRK Schweiz
Menière-Krankheit	Definition	Morbus Menière. Erkrankung des Innenohres, die anfallsartig mit Drehschwindel, Hörminderung und Tinnitus (Hörgeräusch) einhergeht. Klassische Trias.
	Registrierung	Akzeptieren je nach Schweregrad der Symptome und Häufigkeit der Anfälle. Beschwerden könnten durch die Spende verschlimmert werden Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung



Meningitis	Definition	Entzündung der Hirn- und Rückenmarkshäute, verursacht durch Viren, Bakterien, andere Organismen oder auch nicht-infektiöse Reize. Kann auch Begleiterscheinung einer infektiösen Allgemeinerkrankung sein. Immer medizinischer Notfall , bakterielle Meningitis ist grundsätzlich lebensbedrohlich. Häufigste Erreger: Meningokokken, Pneumokokken, Haemophilus influenzae
	Zu beachten	Nach assoziierten Krampfanfällen in der Anamnese fragen (Epilepsie)
	Registrierung	Rückweisung für 3 Monate nach vollständiger Genesung ohne Folgeschäden
	CT / VT	Rückweisung für 6 Monate nach vollständiger Genesung ohne Folgeschäden
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Enzephalitis Epilepsie Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)

Meningo-Enzephalitis	Gehe zu	Enzephalitis
-----------------------------	---------	--------------

Meniskusoperation	Gehe zu	Operation / Eingriff_3_mittel
--------------------------	---------	-------------------------------

Meulengracht-Syndrom	Definition	Morbus Meulengracht, Gilbert-Syndrom, Morbus Gilbert-Meulengracht. Erblisch bedingte Störung des Bilirubin-Stoffwechsels. Führt zu einer leichten Hyperbilirubinämie, meist asymptomatisch und harmlos. Weit verbreitet, kein Therapiebedarf.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung falls ikterisch
	MC	Wie CT / VT



Migräne	Definition	Primäre Kopfschmerzkrankung mit periodisch wiederkehrendem, anfallartigem, pulsierendem, meist halbseitigem Kopfschmerz, oft begleitet von zusätzlichen Symptomen wie Nausea, Erbrechen, Licht- und Geräuschempfindlichkeit. Manchmal mit vorausgehender Migräne-Aura mit optischen oder sensiblen Wahrnehmungsstörungen. Diverse Auslösefaktoren, darunter hormonelle Faktoren, Schlaf, Stress, Lebensmittel, Umweltfaktoren. Auslöser und Schweregrad nachfragen!
	Registrierung	Akzeptieren, ausser die Attacken sind häufig (1-2x / Monat) und schwer oder erfordern eine prophylaktische Medikation
	CT / VT	Wie Registrierung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Cluster-Kopfschmerzen

Mittelohrentzündung	Siehe auch	Otitis media, akut Otitis media, chronisch
----------------------------	------------	---

Monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz (MGUS)	Definition	Vorkommen eines monoklonalen Immunglobulins (Paraproteins) im Blut. Kann die Vorstufe einer malignen lymphoproliferativen Erkrankung, z.B. eines Multiplen Myeloms, Morbus Waldenström oder Amyloidose sein. Wahrscheinlichkeit einer Progression ca. 1-1.5% pro Jahr
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss



Mononukleose, infektiöse	Definition	Mononucleosis infectiosa. Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus. Ist in der Bevölkerung weit verbreitet. Verlauf oft asymptomatisch. Übertragung via Speichel, Tröpfcheninfektion. Viren infizieren B-Lymphozyten und bleiben lebenslang im Körper. Reaktivierung bei geschwächtem Immunzustand möglich (Patienten mit Immunsuppression !) Komplikationen sonst selten.
	Registrierung	Rückweisung für 6 Monate nach vollständiger Genesung
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
Morbus Boeck	Gehe zu	Sarkoidose
Morbus Crohn	Gehe zu	Autoimmunerkrankung
Morbus Mondor	Definition	Gutartige, indurative Entzündung der oberflächlichen Venen im Thorax- und (Ober-) Armbereich; Sonderform: peniler M. Mondor. Kann als Begleiterscheinung eines Krebsleidens auftreten daher Abklärung von Tumorleiden (Brustkrebs bei Frauen). Frauen häufiger betroffen, 75 % sind in mittlerem Alter
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Morbus Perthes	Definition	Im Kindesalter auftretende, idiopathische aseptische Knochennekrose des Hüftkopfes.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren, sofern keine Beschwerden/Einschränkungen im Alltag bestehen Nur PBSC Spende Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT



Mukoviszidose	Definition	Erbliche Stoffwechselkrankheit mit zähflüssiger Sekretproduktion der exokrinen Drüsen und damit verbundenen zum Teil schwerwiegenden Folgekomplikationen.
	Registrierung	Nicht akzeptieren, ausser nur Träger
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
Mukoviszidose, Trägerstatus	Definition	Träger für Mukoviszidose
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
Multiple Sklerose	Gehe zu	Autoimmunerkrankung
Mumps	Definition	Parotitis epidemica, „Ziegenpeter“. Ansteckende Viruserkrankung mit Befall der Speicheldrüsen und anderer Organe. Klassische Kinderkrankheit, i.d.R lebenslange Immunität. Häufige Komplikationen: Meningitis und Orchitis
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 1 Monat nach vollständiger Genesung
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Kinderkrankheiten, Kontakt
Muskeldystrophie	Definition	Gruppe von erblichen Muskelerkrankungen, die durch defekte oder mangelnde in der Muskulatur vorkommende Proteine (z.B. Dystrophin) verursacht werden; dies führt zu Muskelschwäche und Muskelschwund.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
	Siehe auch	Körperliche Einschränkung



Mykose	Definition	Durch Pilze verursachte Infektionskrankheit. Häufigste Pilze: <ul style="list-style-type: none"> • Dermatophyten: Fadenpilze • Hefen (Sprosspilze): z.B. Candida • Schimmelpilze (Fadenpilze): z.B. Aspergillus Einteilung in: <ul style="list-style-type: none"> • Oberflächliche Mykose: Haut, Nägel, Schleimhaut • Systemische Mykose: Erreger gelangt in Blutkreislauf (meist über Lunge) und befällt innere Organe -> normalerweise nur bei Patienten mit geschwächtem Immunsystem, schwere Erkrankungen, schwer zu beherrschen. Können tödlich verlaufen.
	Registrierung	Akzeptieren ausser Organmykose / systemische Mykose
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
Myoma uteri Entfernung, inkl. Myomenuk- leation	Gehe zu	Operation / Eingriff_3_mittel
Myxödem	Definition	Ödematöse Auftreibung der Unterhaut durch Einlagerung von Glykosaminoglykanen. Kommt als generalisiertes Ödem im Rahmen einer Hypothyreose oder als prätibiales Myxödem bei einer Hyperthyreose (Morbus Basedow) vor.
	Registrierung	Akzeptieren, wenn Grundkrankheit kein Ausschlusskriterium ist
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Schilddrüsenerkrankung



Nadelphobie	Definition	Ausgeprägte Angst vor Spritzen und Nadeln.
	Registrierung	Akzeptieren, wenn der Spender, die Spenderin umfassend über die Voruntersuchungen und das Verfahren der Blutstammzellspende aufgeklärt wurde und sich eine Entnahme vorstellen kann.
	CT / VT	Wie Registrierung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt
	MC	Wie CT / VT
Nadelstichverletzung	Definition	Verletzung mit potentiell kontaminierter Punktions- oder Injektionsnadel vor allem im medizinischen Bereich.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren nur wenn kein Hinweis auf (bakteriellen) Infekt und keine Komplikationen vorliegen Rückweisung für 1 Monat nach Ereignis Rückweisung für 12 Monate, wenn Verabreichung von Hepatitis-B-Immunglobulin nach Nadelstichverletzung
	MC	Akzeptieren nur wenn kein Hinweis auf (bakteriellen) Infekt und keine Komplikationen vorliegen Rückweisung für 2 Monate nach Ereignis Rückweisung für 12 Monate, wenn Verabreichung von Hepatitis-B-Immunglobulin nach Nadelstichverletzung
	Siehe auch	Akupunktur Tätowierung , Piercing, (Semi-) Permanentes Make-Up, elektrische Epilierung, Mikroblading



Nahrungsmittelallergie	Definition	Spezifische Überempfindlichkeit gegenüber bestimmten Stoffen, die in der Nahrung enthalten sind.
	Zu beachten	Bei jeder Allergie EZ und TZ informieren !
	Registrierung	Akzeptieren bei leichten Symptomen Nicht akzeptieren, wenn Anamnese von anaphylaktischem Schock
	CT / VT	Rückweisung bei aktuellen Symptomen unklarer Ursache Nicht akzeptieren, wenn Anamnese von anaphylaktischem Schock
	MC	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung bei aktuellen Symptomen Nicht akzeptieren , wenn Anamnese von anaphylaktischem Schock
	Siehe auch	Allergie Urtikaria

Nahrungsmittelvergiftung	Gehe zu	Durchfallerkrankung
---------------------------------	---------	---------------------

Narkolepsie	Definition	Hypersomnie aufgrund einer zentralen Störung der Schlaf-Wach-Regulation, welche entweder als kataplektische Form (klassisch) oder als nicht-kataplektische Form (monosymptomatisch) auftritt.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung

Narkose	Siehe auch	Operation / Eingriff_2_klein Operation / Eingriff_3_mittel Operation / Eingriff_4_gross
----------------	------------	---



Nasenbluten	Definition	Epistaxis. Meist lokale Ursache und nicht gefährlich, kann aber auch Symptom einer Allgemeinerkrankung und schwerwiegend / lebensbedrohlich sein.
	Registrierung	Akzeptieren, ausser wenn schwerwiegend, regelmässig auftretend und nicht abgeklärt
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
Naturheilmedizin	Definition	Alternative Medizin, z.B. Homöopathie, Akupunktur, chinesische Medizin, etc.
	Zu beachten	Behandlung mit Naturheilmitteln ist per se kein Rückweisungsgrund, aber Grundkrankheit und Art der Verabreichung (iv, sc, extrakorporal) beachten.
	Registrierung	Akzeptieren, wenn Grund für Behandlung dies erlaubt
	CT / VT	Inhaltsstoff eruieren, ggf. Behandlung sistieren bis zur Entnahme Allfällige Rückweisungsfristen einhalten (z.B. Akupunktur)
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Akupunktur Nadelstichverletzung
Nebennieren-Hyperplasie	Definition	Erbliche, durch den Mangel eines steroidbildenden Enzyms bedingte endokrine Störung.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Nebenniereninsuffizienz	Definition	Unterfunktion der Nebennieren, welche unbehandelt zu einem lebensbedrohlichen Mangel an Nebennierenhormonen führt.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss



Nematoden	Gehe zu	Wurmerkrankung
Neotigason	Gehe zu	Teratogene Medikamente
Nephrektomie	Definition	Resektion der Niere, oder Teil davon. Ursache und verbleibende Nierenfunktion abklären.
	Registrierung	Akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • nach Trauma • nach Teilresektion bei benigner Ursache (z.B. gutartiger, abgekapselter Tumor) • nach Nierenspende Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Operation / Eingriff_3_mittel Operation / Eingriff_4_gross
Nephritis	Definition	Akute oder chronische entzündliche Erkrankung der Niere. Ursachen: Infektionen, Toxine, Autoimmunerkrankungen, Folge von Systemerkrankungen (wie Diabetes, Systemischer Lupus erythomatodes). Ursache abklären!
	Siehe auch	Glomerulonephritis Nephritis, interstitiell Pyelonephritis



Nephritis, interstitiell	Definition	Entzündliche Erkrankung der Niere, welche zum Funktionsverlust führt und meist durch Medikamente, Infektionen oder Systemerkrankungen bedingt wird.
	Registrierung	Akzeptieren <ul style="list-style-type: none"> • 6 Monate nach vollständiger Genesung • normale Nierenfunktion
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
Nephrozirrhose	Definition	Endzustand vieler Nierenparenchym-Erkrankungen mit zunehmender Fibrosierung und in der Regel mit fast vollständigen Funktionsverlust.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Nesselfieber	Gehe zu	Urtikaria
Netzhautablösung	Definition	Ablösung der inneren Anteile der Netzhaut des Auges von ihrer Versorgungsschicht.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Neurodermitis	Definition	Chronische, nicht ansteckende, atopische Hauterkrankung, die sich vermehrt im Kindesalter zeigt und bei der es in der Pubertät häufig zu einer Remission kommt.
	Registrierung	Akzeptieren, ausser bei weiterhin ausgeprägter chronischer Symptomatik im Erwachsenenalter
	CT / VT	Wie Registrierung und solange Punktionsstellen nicht betroffen sind
	MC	Wie CT / VT



Neurofibromatose (NF)	Definition	Erbkrankheit, die u.a. Neurofibrome verursachen kann und autosomal-dominant vererbt wird. Typ 1 (Morbus Recklinghausen): periphere NF Typ 2: zentrale NF
	Registrierung	Nicht akzeptieren, wenn Hinweis auf zentrale NF und/oder maligne Entartung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung

Neurose	Definition	Veralteter Überbegriff für leichtgradige psychische Störungen, die durch einen Konflikt verursacht werden.
	Registrierung	Akzeptieren, wenn ohne medikamentöse Therapie, sonst genaue Diagnose klären und demgemäss vorgehen
	CT / VT	Wie Registrierung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Borderline Depression Lithiumbehandlung Psychose Schizophrenie

Nierenerkrankung, akut	Siehe auch	Glomerulonephritis Nephritis Niereninsuffizienz (NI), akut / chronisch Nierenkolik Nierensteine Pyelonephritis
-------------------------------	------------	---



**Nierenerkrankung,
chronisch**

Definition

Dazu gehören:

- Glomerulonephritis
- Nephritis
- Niereninsuffizienz
- Nierensteine
- Nierenkrebs
- Nierentumor, gutartig
- Fibromuskuläre Dysplasie der Niere

Registrierung

Nicht akzeptieren

CT / VT

Wie Registrierung

MC

Wie Registrierung

**Niereninsuffizienz (NI),
akut / chronisch**

Definition

Nierenversagen. Unterfunktion einer oder beider Nieren. Erhöhung der Konzentration an harnpflichtigen Substanzen im Blut.

- Akut (ANI): innert Stunden bis Tage einsetzende Verschlechterung der Nierenfunktion, prinzipiell rückbildungsfähig. Ursache prärenal / renal / postrenal
- Chronisch (CNI): progredienter Verlust der Nierenfunktion über längere Zeit, meist irreversibel. Verschiedene Ursachen, z.B. Diabetes, Hypertonie, Glomerulopathien, Interstitielle Nephritis

Registrierung

Nicht akzeptieren bei chronischer Niereninsuffizienz
 Sonst Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt

CT / VT

Wie Registrierung

MC

Wie Registrierung



Nierenkolik	Definition	Krampfartige Schmerzen in der Lendengegend oder Bauchraum, starker bis unerträglicher Schmerz. Ursache akute Harnabflussstörung im Harnleiter durch Nierenstein oder Nierenriess.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung bei akuter Symptomatik
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Nierensteine
Nierenkrebs	Gehe zu	Krebs
Nierensteine	Definition	Kristalline Ablagerungen (Harnsteine) im Bereich des Nierenbeckenkelchsystems. Harnsteine, die in den Harnleiter wandern, können an engen Stellen festklemmen und einen akuten Harnstau (Nierenkolik) auslösen. Gefahr der Infektion (Pyelonephritis). Therapie medikamentös / nicht-operativ (ESWL: extrakorporelle Stosswellen Lithotripsie) / operativ.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung bei akuter Symptomatik
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Nephritis Nierenkolik
Nierensteine, Operation	Gehe zu	Operation / Eingriff_3_mittel
Nierentumor, gutartig	Definition	Typische gutartige Nierentumore: Fettgewebs- und Blutgefässgeschwülste (Angiomyolipome).
	Registrierung	Akzeptieren evtl. nach Exzision, wenn Nierenfunktion normal Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung



Norovirus	Gehe zu	Durchfallerkrankung
Oesophagitis	Definition	Entzündung der Schleimhaut der Speiseröhre. Lokal / diffus, akut / chronisch. Häufigste Form: Reflux-Oesophagitis (Rückfluss sauren Mageninhaltes). Andere Ursachen: Infektionen, medikamentös-toxisch Risiko maligner Entartung der Schleimhaut bei chronischer Oesophagitis.
	Registrierung	Nicht akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • symptomatisch • chronisch • Hinweis auf Malignität
	CT / VT	Akzeptieren, wenn unter Therapie asymptomatisch und kein Hinweis für Malignität
	MC	Wie CT / VT
Oesophagusvarizen	Gehe zu	Portale Hypertonie
Ohnmachtsanfall	Gehe zu	Bewusstlosigkeit
Operation / Eingriff_1_allgemein	Definition	Immer Grundkrankheit abklären. <ul style="list-style-type: none"> • Ausschluss immer bei maligner Grunderkrankung ausser Basaliom und Zervixkarzinom in situ • Rückweisungsfrist richtet sich nach der Grösse des Eingriffs • generell Spendetauglichkeit und Sperrfrist im Ermessen Arzt, die Karenzfristen betreffend Operationen sind als Richtwerte zu verstehen
	Siehe auch	Operation / Eingriff_2_klein Operation / Eingriff_3_mittel Operation / Eingriff_4_gross



Operation / Eingriff_2_klein	Definition	Richtwert Operationsdauer: <15 Min. Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> • kleine dermatologische und ophthalmologische Eingriffe, inkl. Katarakt-Operation • diagnostische / therapeutische Punktionen, z.B. Arthroskopie • kleine Varizen-Operation (1 Varize)
	Registrierung	Akzeptieren 1 Monat nach Operation, falls: <ul style="list-style-type: none"> • Grunderkrankung kein Ausschlusskriterium • Komplikationsloser Verlauf • Behandlung abgeschlossen Sonst Ermessen der Spendetauglichkeit Arzt
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung



Operation / Eingriff_3_mittel	Definition	Richtwert Operationsdauer: 15-60 Min. Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> • jegliche knöcherne Operation am Schädel ohne Schädelöffnung, inkl. Korrektur Septumdeviation • Laparo- / arthroskopische Eingriffe • Amputationen von Fingern und Zehen • lumbale Diskushernien-Operation • Leistenhernien-Operation • orthopädische Operationen an grossen Röhrenknochen, ausser Femur (Tibia, Humerus, Radius, Ulna), inkl. Knie-Totalendoprothese und Materialentfernung • grosses Wunddébridement • Varizen-Operation >1 Varize
	Registrierung	Akzeptieren 3-6 Monaten nach Operation, falls: <ul style="list-style-type: none"> • Grunderkrankung kein Ausschlusskriterium • Komplikationsloser Verlauf • Behandlung abgeschlossen Sonst Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung



Operation / Eingriff_4_gross	Definition	Richtwert Operationsdauer: > 60 min <ul style="list-style-type: none"> • Notfalloperationen nach Polytrauma • jegliche Schädelöffnung • Offene Thoraxoperationen • Offene Abdomenoperationen, inkl. Kaiserschnitt • Operationen an der Wirbelsäule, ausser lumbale Diskushernien-Operation • Beckenteilersatz, inkl. Os-sacrum-Teilresektion • Femur-Operation, inkl. Hüft-Totalendoprothese • Endoprothesen-Wechsel
	Registrierung	Akzeptieren 1 Jahr nach Operation, falls: <ul style="list-style-type: none"> • Grunderkrankung kein Ausschlusskriterium • Komplikationsloser Verlauf • Behandlung abgeschlossen Sonst Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, Risiko 3_Operation an Gehirn oder Rückenmark

Osteomyelitis / Osteitis	Definition	Akute oder chronische Entzündung des Knochens / Knochenmarks, durch Infektion verursacht.
	Registrierung	Rückweisung für 2 Jahre nach Ausheilung und Absetzen der Antibiotikabehandlung (wenn einmaliges Ereignis und kein Rückfall) Ursache abklären! Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung



Osteoporose	Definition	Abnahme der Knochendichte infolge eines Ungleichgewichts zwischen Auf- und Abbau von Knochengewebe zugunsten des Abbaus.
	Registrierung	Nicht akzeptieren bei diagnostizierter Osteoporose
	CT / VT	Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT
Otitis media, akut	Definition	Plötzlich auftretende Form der Mittelohrentzündung, die infektiös bedingt ist.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung und 2 Wochen nach Absetzen der Antibiotika
	MC	Wie CT / VT
Otitis media, chronisch	Definition	Chronische Mittelohrentzündung, die sich entweder als chronische Schleimhaut- oder Knocheneiterung zeigt.
	Registrierung	Nicht akzeptieren, ausser nach erfolgreicher operativer Sanierung und Absetzen der antibiotischen Therapie
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Operation / Eingriff_3_mittel
Otosklerose	Definition	Veränderung der Knochenstrukturen im Bereich des Innen- und Mittelohrs mit progredienter Schallleitungschwerhörigkeit. Diskutierte Ursachen: Vireninfektionen, Autoimmunreaktionen, erbliche Faktoren und Hormonelle Einflüsse.
	Registrierung	Akzeptieren bei asymptomatischer oder oligosymptomatischer Otosklerose Nicht akzeptieren bei progredienter Erkrankung
	CT / VT	Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin



Ovarialzyste	Definition	Eierstockzyste. Gutartiger, flüssigkeitsgefüllter Tumor im Eierstock. Meist funktionelle Zysten. Auftreten im Rahmen der normalen hormonell bedingten zyklischen Veränderungen an den Eierstöcken, oder wegen gestörtem Hormonhaushalt / Folge einer Hormontherapie Sonderform: polyzystische Ovarien (PCOD: polycystic ovarian disease)
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung bei Komplikationen
	MC	Wie CT / VT
Owren-Syndrom	Gehe zu	Faktor V-Mangel, kongenital
Pacemaker	Definition	Herzschrittmacher
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Panikstörung	Definition	Eine Angststörung, gekennzeichnet durch mehrere Panikattacken pro Monat und, damit verbunden, Erwartungsangst oder Vermeidungsverhalten und Alltagsbeschränkungen.
	Registrierung	Akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • die Risikosituationen weitgehend bekannt sind • Panikattacken kontrolliert werden können, so dass kein erhöhtes Risiko für einen Abbruch einer PBSC-Spende besteht
	CT / VT	Wie Registrierung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT
Pankreas, Pseudozysten	Gehe zu	Pankreatitis, chronisch



Pankreatitis, akut	Definition	Akute Entzündung der Bauchspeicheldrüse, verursacht in 60-70% durch biliären Stau im Rahmen von Gallenwegserkrankungen, in 30% durch Alkoholabusus.
	Registrierung	Akzeptieren, wenn Ursache <ul style="list-style-type: none"> • biliär • viral (Mumps) • traumatisch • iatrogen sonst Ausschluss
	CT / VT	Wie Registrierung und Rückweisung bis 3 Monate nach vollständiger Genesung
	MC	Wie CT / VT
Pankreatitis, chronisch	Definition	Anhaltende Entzündung der Bauchspeicheldrüse mit dauerhaftem Ausfall der exokrinen und im Verlauf auch endokrinen Funktion -> Pankreasinsuffizienz. Pseudozysten Ursache : > 70% Alkoholabusus, auch Hyperkalzämie oder Verschluss der Gallengänge.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Parahämophilie	Gehe zu	Faktor V-Mangel, kongenital
Paraplegie / Tetraplegie	Definition	Aus einer Schädigung des Rückenmarkquerschnittes resultierendes Lähmungsbild mit Ausfall motorischer, sensibler oder vegetativer Funktionen.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss



Parkinson-Syndrom	Definition	Auch Morbus Parkinson. Langsam fortschreitende neurodegenerative Erkrankung mit motorischen und kognitiven Symptomen.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Pemphigus	Gehe zu	Autoimmunerkrankung
Perikarditis / Perikarderguss	Definition	Entzündung des Herzbeutels. Einteilung in akut / chronisch, Sonderform: Pericarditis constrictiva. Ursachen: Infektionen (bakteriell, viral, mykotisch, parasitär), im Rahmen systemischer Erkrankungen (wie Autoimmunerkrankungen, Kollagenosen, Sarkoidose, endokrinologische Erkrankungen), paraneoplastisch, posttraumatisch, idiopathisch.
	Registrierung	Nicht akzeptieren, ausser bei Status nach Trauma oder viraler Erkrankung und komplette Genesung ohne Therapie
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
Periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK)	Gehe zu	Vaskuläre Erkrankung, arteriell



Peritonitis	Definition	Entzündung des Bauchfells (Peritoneum). Lokal / diffus. Selten eigenständige Erkrankung, meist Leitsymptom. Mögliche Ursachen: Lokal: am häufigsten bei akuter, perforierter Appendizitis, Cholezystitis Diffus: u.a. aufgrund Divertikulitis, Darmverschluss, Mesenterialinfarkt, perforierende Darmverletzung, Eileiterentzündung, Peritonealkarzinose
	Registrierung	Akzeptieren nach vollständiger Genesung, sofern Grunderkrankung eine Spende erlaubt
	CT / VT	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung und 4 Wochen nach Behandlungsabschluss, sofern Grunderkrankung eine Spende erlaubt Ausschluss bei malignem Prozess
	MC	Wie CT / VT
Peritonsillitis	Gehe zu	Tonsillitis akut
Petit Mal	Gehe zu	Epilepsie
Pfeifferisches Drüsenfieber	Gehe zu	Mononukleose, infektiöse
Pharyngitis	Definition	Rachenentzündung
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 2 Wochen nach Absetzen der Antibiotikabehandlung und bis zur vollständigen Genesung
	MC	Wie CT / VT Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
Phlebitis	Gehe zu	Thrombophlebitis / Phlebitis



Phlebothrombose	Definition	Tiefe Venenthrombose
	Zu beachten	G-CSF-Verabreichung ist ein zusätzlicher Risikofaktor. Emboliegefahr bei Thrombusbildung.
	Registrierung	Rückweisung für 12 Monate nach abgeschlossener Behandlung und vollständiger Genesung, wenn <ul style="list-style-type: none"> • einmalige, provozierte Thrombose • keine auslösende Grundkrankheit • keine familiäre Disposition
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung

Pilzinfektion	Gehe zu	Mykose
----------------------	---------	--------

Pityriasis rosea Gilbert	Definition	Nicht ansteckendes, transientes Exanthem. Synonyme: Röschenflechte, Schuppenröschen.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren, wenn vollständig abgeheilt
	MC	Wie CT / VT

Pityriasis versicolor	Definition	Häufig vorkommende, harmlose Pilzinfektion der Epidermis.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren, sofern Punktionsstelle nicht betroffen
	MC	Wie CT / VT



Pleuritis	Definition	Entzündung der Pleura (Brustfell / Rippenfell) mit typischerweise starken atemabhängigen thorakalen Schmerzen. Meist infolge einer primären oder sekundären Lungenerkrankung (lokal inflammatorisch, ischämisch, infektiös, maligne, autoimmun).
	Registrierung	Akzeptieren, sofern Grunderkrankung dies erlaubt Rückweisung von 4 Wochen nach vollständiger Genesung und Behandlungsabschluss (im Falle TBC-Pleuritis länger) Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung

Pneumonie	Definition	Lungenentzündung
	Registrierung	Akzeptieren nach vollständiger Genesung (keine residuellen Atembeschwerden) und sofern die Grunderkrankung dies erlaubt
	CT / VT	Rückweisung bis 4 Wochen nach vollständiger Genesung (kein residuellen Atembeschwerden) und Behandlungsabschluss und sofern Grunderkrankung dies erlaubt
	MC	Wie CT / VT



Pneumothorax	Definition	Meist akuter Eintritt von Luft in den Pleuraspalt -> Ausdehnung des Lungenflügels behindert -> teilweiser oder vollständiger Kollaps des betroffenen Lungenflügels. Kann lebensbedrohlich sein. <ul style="list-style-type: none"> • Spontanpneumothorax: keine erkennbare Ursache, (betrifft oft junge, schlanke Männer) • Traumatischer Pneumothorax: durch direkte oder indirekte Verletzung des Brustkorbs und seiner Organe
	Registrierung	Akzeptieren bei Spontan- oder traumatischem Pneumothorax nach Abschluss der Behandlung und vollständiger Genesung
	CT / VT	Wie Registrierung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Operation / Eingriff_2_klein Operation / Eingriff_3_mittel

Poliomyelitis	Definition	Vom Poliovirus hervorgerufene Infektionskrankheit, die Motoneurone befällt und zu bleibenden Lähmungen führt, jedoch in >90% asymptomatisch verläuft. Der Befall der Atemmuskulatur ist tödlich.
	Registrierung	Akzeptieren, wenn komplett asymptomatisch
	CT / VT	Wie Registrierung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Körperliche Einschränkung

Polyarthrit	Gehe zu	Arthritis, nicht infektiös
--------------------	---------	----------------------------



Polypektomie, intestinal	Definition	Endoskopische Entfernung von Polypen aus dem Dickdarm.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 1 Monat nach Eingriff oder länger je nach Schweregrad und allfälliger Komplikationen Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin in Abhängigkeit vom histologischen Befund
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Endoskopie Operation / Eingriff_2_klein Operation / Eingriff_3_mittel Polyposis familiaris
Polyposis familiaris	Definition	Familiäre adenomatöse Polyposis (FAP). Autosomal-dominant vererbte Erkrankung mit Bildung multipler, adenomatöser Polypen im Bereich des Dickdarms. Entartungsrisiko 70-100%
	Registrierung	Nicht akzeptieren bei etablierter Diagnose
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
	Siehe auch	Polypektomie, intestinal
Polyposis intestinalis	Definition	Ansammlung von Polypen in der Darmschleimhaut. In 95% gutartige Wucherungen der Schleimhaut, malige Entartung möglich.
	Registrierung	Akzeptieren, wenn keine familiäre Form (z.B. juvenile Polyposis), sonst Ausschluss
	CT / VT	Wie Registrierung und Rückweisung bei Symptomen
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Endoskopie Polyposis familiaris



Polytrauma	Definition	Mehrere gleichzeitig erlittene Verletzungen verschiedener Körperregionen, wobei mindestens eine Verletzung oder die Kombination mehrerer Verletzungen lebensbedrohlich ist.
	Registrierung	Nicht akzeptieren, solange unter Behandlung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin.
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Bluttransfusion Operation / Eingriff_3_mittel Operation / Eingriff_4_gross
Polyzystisches Ovarial- syndrom, PCOS	Definition	PCOD: polycystic ovarian disease, Sonderform der Ovarialzyste. Störung des hormonalen Gleichgewichts führt zu einer Dysfunktion der Ovarien mit Oligo- Amenorrhoe, Adipositas und Hyperandrogenismus. Wichtig: Ausschluss eines Tumors bei Hypertestosteronämie oder Hyperprolaktinämie (Prolaktinom).
	Registrierung	Akzeptieren, wenn keine Komplikationen, auch wenn unter Medikation (Metformin).
	CT / VT	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung bei Komplikationen
	MC	Wie CT / VT Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	Siehe auch	Ovarialzyste
Polyzythämia vera	Definition	Seltene myeloproliferative Erkrankung mit Vermehrung aller drei Blutzellreihen aufgrund Mutation einer myeloischen Stammzelle.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
	Siehe auch	Blutkrankheit, maligne



Porphyrien	Definition	Eine Gruppe von Stoffwechselerkrankungen, die mit einer Störung der Hämoglobin-Synthese einhergehen. Ursache: meistens genetisch bedingt, selten sekundär z.B. infolge Störung der Leberfunktion, Bleivergiftung, Hämochromatose, Hämolytische Anämie, Leukämie.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung

Portale Hypertonie	Definition	Erhöhter Druck in der Pfortader (Lebervene).
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss

Post-Polio-Syndrom	Definition	Folgeerscheinung einer Poliomyelitis-Erkrankung mit zunehmender Müdigkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen sowie Muskelschwächen, welche mehrere Jahrzehnte nach der Infektion auftritt.
	Siehe auch	Körperliche Einschränkung

Posturales Tachykardiesyndrom (POTS)	Definition	Auftreten eines inadäquaten Herzfrequenzanstieges beim Aufstehen bei kaum verändertem Blutdruck. Dies kann zu starkem Schwindel und Ohnmacht führen. Betroffen sind v.a. Frauen.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss



Präkanzerose	Definition	Krebsvorstufe
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
	Siehe auch	Barrett-Oesophagus Basaliom Zervixkarzinom in situ
Primär sklerosierende Cholangitis	Definition	Seltene, chronische Entzündung der Gallenwege innerhalb und/oder ausserhalb der Leber. Hohes Risiko für ein cholangiozelluläres Karzinom.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Proktitis	Definition	Schmerzhafte Entzündung der Rektumschleimhaut, häufig Mitbeteiligung des Anus. Infektiöse Proktitis kommt v.a. im Rahmen von Geschlechtskrankheiten vor, häufige Ursache ungeschützter rezeptiver Analverkehr. Kann auch bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen auftreten.
	Registrierung	Akzeptieren , wenn: <ul style="list-style-type: none"> • Abgeklärt • Allfällige Grunderkrankung dies erlaubt
	CT / VT	Wie Registrierung und Rückweisung bis zum Abklingen der Entzündung
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Autoimmunerkrankung Risikoverhalten, sexuell Sexuell übertragbare Krankheit



Prolaktinom	Definition	Gutartiger Tumor (Adenom) des Hypophysenvorderlappens, der Prolaktin produziert, führt zu Hyperprolaktinämie.
	Registrierung	Nicht akzeptieren auch wenn behandelt / operiert
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
Propecia	Gehe zu	Teratogene Medikamente
Proscar	Gehe zu	Teratogene Medikamente
Prostatahyperplasie, benigne (BPH)	Definition	Gutartige Vergrößerung der Prostata (Vorsteherdrüse) durch Vermehrung ansonsten unauffälliger Zellen.
	Registrierung	Akzeptieren, ausser wenn unter Behandlung mit teratogenen Medikamenten wie Proscar®, Finasterid, Avodart®, Duodart® Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Teratogene Medikamente
Prostatakarzinom	Gehe zu	Krebs
Prostatektomie	Siehe auch	Operation / Eingriff_3_mittel Operation / Eingriff_4_gross
Prostitution	Definition	Sexuelle Kontakte gegen Bezahlung (Annahme von Geld, Drogen oder Medikamenten)
	Zu beachten	Siehe 1413_DOK_Classification_Risk_Behaviour_D
	Siehe auch	Risikoverhalten, sexuell



Proteus-Syndrom	Definition	Sehr seltene, genetisch bedingte Krankheit, die sich anfangs mit regionalem Riesenwuchs (Schädel, Extremitäten, Fusssohlen) und im weiteren Verlauf durch die Ausbildung multipler Tumoren kennzeichnet. Ausserdem Gefässmalformationen und folglich Lungenembolien und tiefe Venenthrombosen. Komplikation: erhöhtes Thromboserisiko
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Pseudoxanthoma elasticum (PXE)	Definition	Grönblad-Strandberg Syndrom. Autosomal-dominant oder rezessiv vererbte Erkrankung, bei welcher die elastischen Fasern des Bindegewebes durch Calcium-Einlagerung verändert werden. Fasern werden brüchig und zerfallen in kurze Bruchstücke. Betroffen sind Auge, Haut, Herz-Kreislauf-System, Magen-Darm-Trakt. Komplikation: erhöhtes Blutungsrisiko
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
	Siehe auch	Angioid streaks
Psoriasis	Definition	Chronisch entzündliche Erkrankung der Haut und teilweise auch anderer Organe, v.a. der Gelenke (Psoriasis-Arthritis). Veranlagung meist erblich bedingt, Autoimmunerkrankung. Kann durch G-CSF verschlimmert / ausgelöst werden
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren, wenn milde Form (nur topische Behandlung) und Punktionsstellen nicht betroffen Nur BM Spende, Info an TZ Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT, risk acceptance durch TZ
	Siehe auch	Autoimmunerkrankung



Psychiatrische Erkrankung

Siehe auch
 Bipolare affektive Störung
 Borderline
 Depression
 Essstörung
 Lithiumbehandlung
 Neurose
 Psychose
 Schizophrenie

Psychose

Definition Schwere akute psychische Störung, mit einem vorübergehenden, unterschiedlich ausgeprägten Verlust des Realitätsbezugs.

Registrierung Akzeptieren, 5 Jahre nach Abschluss der medikamentösen Behandlung bei einem einmaligen Ereignis
 Nicht akzeptieren, wenn zwei oder mehr Ereignisse.

CT / VT Wie Registrierung
 Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin

MC Wie CT / VT

Siehe auch Lithiumbehandlung
 Neurose
 Schizophrenie

Pulmonale arterielle Hypertonie

Definition Erhöhung des Gefäßwiderstandes und damit des Blutdruckes im Lungenkreislauf.

Registrierung Nicht akzeptieren

CT / VT Ausschluss

MC Ausschluss



Pyelonephritis	Definition	Meist einseitige Entzündung des Nierenbeckens mit Beteiligung des Nierenparenchyms, die meist durch eine bakterielle Infektion verursacht wird.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung von 4 Wochen nach vollständiger Genesung und Absetzen der Antibiotika-Therapie
	MC	Wie CT / VT
Q-Fieber	Definition	Zoonose verursacht durch das Bakterium <i>Coxiella burnetii</i> mit dem klinischen Bild einer Pneumonie.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Querschnittslähmung	Gehe zu	Paraplegie / Tetraplegie
Raynaud-Krankheit	Definition	Raynaud Syndrom. Morbus Raynaud. Minderdurchblutung der Finger oder Zehen aufgrund von Gefässverengungen (weisse Finger / Zehen). Auftreten primär / idiopathisch (ohne erkennbare Ursache), sekundär in Zusammenhang mit Autoimmunerkrankungen (z.B. Kälteagglutinin-Krankheit, Lupus erythematodes, Sklerodermie etc), Gefässerkrankungen, Trauma, Medikamente. Auslösung durch endogene (Hormone) oder exogene Faktoren (Kälte, Stress).
	Registrierung	Akzeptieren, ausser wenn in Zusammenhang mit einer systemischen Autoimmunerkrankung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
Recklinghausen-Krankheit	Gehe zu	Neurofibromatose (NF)
Refluxoesophagitis	Gehe zu	Oesophagitis



Refsum-Syndrom	Definition	Refsum-Kahlke-Krankheit, Refsum-Thiébaud-Krankheit, Heredopathia atactica polyneuritiformis. Eine autosomal-rezessiv vererbte Stoffwechselkrankheit - Phytansäurespeicherkrankheit - die zu den hereditären motorisch-sensiblen Neuropathien gerechnet wird. Hauptmerkmale: Retinopathia pigmentosa mit Nachtblindheit (oft erstes Symptom), periphere Polyneuropathia, zerebelläre Ataxie, Taubheit.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
	Siehe auch	Retinopathia pigmentosa
Reiter-Syndrom	Definition	Reaktive entzündliche Gelenkerkrankung, die durch eine bakterielle Infektion ausgelöst wird und sich typischerweise als Reitersche Trias aus Arthritis, Konjunktivitis / Uveitis und Urethritis darstellt.
	Siehe auch	Autoimmunerkrankung
Reizdarm-Syndrom	Definition	Auch Colon irritabile, irritables Darmsyndrom (IDS). Funktionelle Darmerkrankungen, tritt häufig auf, ohne erkennbare organische Ursache (Ausschluss!).
	Registrierung	Akzeptieren, wenn Beschwerden kontrollierbar sind
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt



Restless Legs Syndrom	Definition	Misempfindung in den Beinen mit Bewegungsdrang, oft mit unwillkürlichen Bewegungen. Gehört zu den extrapyramidalen Hyperkinesien. Neurologische Erkrankung, familiäre Veranlagung, sekundär bei diversen Grunderkrankungen oder Stoffwechselveränderungen (z.B. Eisenmangel, Schwangerschaft, Niereninsuffizienz, Hypo- oder Hyperthyreose)
	Registrierung	Schweregrad eruieren, Einschränkungen im Alltag nachfragen. Akzeptieren, wenn leichte Form ohne Einschränkung, mit oder ohne Medikament
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung

Retinopathia pigmentosa	Definition	Auch Retinitis pigmentosa. Netzhautdegeneration mit fortschreitender Zerstörung der Photorezeptoren. Vererbt oder entsteht durch spontane Mutation.
	Registrierung	Akzeptieren, sofern nicht in Zusammenhang mit einem anderen Syndrom (z.B. Refsum-Syndrom)
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Körperliche Einschränkung Refsum-Syndrom

Rheumatisches Fieber	Definition	Reaktive Erkrankung nach einer Infektion mit Streptokokken der Gruppe A (Lancefield-Klassifikation). Eine bis drei Wochen nach einer Infektion kommt es zur abakteriellen Entzündung verschiedener Organsysteme.
	Registrierung	Akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • vollständige Genesung • einmaliges Ereignis • keine bleibende Herzerkrankung • keine bleibende Nierenerkrankung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung



Rheumatoide Arthritis	Gehe zu	Arthritis, nicht infektiös
Rhinitis	Siehe auch	Allergie Sinusitis (Rhinosinusitis), akut Sinusitis (Rhinosinusitis), chronisch
Ringelröteln	Definition	Ansteckende Infektionskrankheit, die durch ein Parvovirus verursacht wird und häufig asymptomatisch verläuft, nur ein Teil der Infizierten zeigt den charakteristischen Hautausschlag.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 1 Monat nach Genesung
	MC	Wie CT / VT
Risikosituation	Definition	Situation, bei der ein erhöhtes Risiko für die Erwerbung einer durch Blut übertragbaren Erkrankung besteht (z.B. HBV, HCV, HIV)
	Siehe auch	Endoskopie Nadelstichverletzung Risikoverhalten, sexuell und sonstiges
Risikotätigkeiten	Definition	Spitalpersonal, Laboranten, Ärzte, MPA Betreuung von Patienten mit übertragbaren Krankheiten
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren, wenn kein Kontakt mit Fremdblut (Nadelstichverletzung, Haut oder Schleimhaut)
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Kontakt mit Fremdblut Nadelstichverletzung



Risikoverhalten, sonstiges, C6	Definition	Sexueller Kontakt mit Partner, der in den letzten 10 Jahren intravenös Drogen konsumiert hat, in den letzten 12 Monaten.
	Zu beachten	Zuerst Risikogruppe des Spenders ermitteln: siehe 1413_DOK_Classification_Risk_Behaviour_D
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 12 Monate nach letztem sexuellen Kontakt
	MC	Wie CT / VT

Risikoverhalten, sexuell und sonstiges	Definition	Verhalten, wodurch der Spender dem Risiko ausgesetzt wird, eine übertragbare Infektionskrankheit zu erwerben, die dann durch die Transplantation / das Stammzellprodukt dem Empfänger übertragen werden könnte > Einteilung in Risikogruppen: A = Standard risk B = Low Risk C = Intermediate Risk D = High Risk
	Zu beachten	Zuerst Risikogruppe des Spenders ermitteln: siehe 1413 DOK_Classification_Risk_Behaviour

Risikoverhalten, sexuell, A	Definition	Geschützte oder ungeschützte sexuelle Kontakte in monogamer, hetero- oder homosexueller Beziehung seit > 4 Monaten: <ul style="list-style-type: none"> • kein neuer Sexualpartner • nur 1 Sexualpartner
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren
	MC	Akzeptieren



Risikoverhalten, sexuell, B1	Definition	Sexuelle Kontakte mit einem neuen / maximal 2 verschiedenen Sexualpartnern in den letzten 4 Monaten
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 1 Monat nach dem ersten sexuellen Kontakt mit dem letzten / neuen Partner
	MC	Rückweisung für 2 Monate nach dem ersten sexuellen Kontakt mit dem letzten / neuen Partner
Risikoverhalten, sexuell, B2	Definition	Bezahlter Sex (SpenderIn bezahlt oder wird bezahlt, sexuelle Dienste gegen Geld, Drogen oder Medikamente) vor > 12 Monaten
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren
	MC	Akzeptieren
Risikoverhalten, sexuell, B3	Definition	Sexueller Kontakt mit PartnerIn mit Intermediate oder High Risk Verhalten vor > 12 Monaten
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren
	MC	Akzeptieren
Risikoverhalten, sexuell, B4	Definition	Sexueller Kontakt mit PartnerIn mit einer sexuell übertragbaren Krankheit (z.B. HIV, HCV, HBV) vor > 12 Monaten
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren
	MC	Akzeptieren



Risikoverhalten, sexuell, C1	Definition	Sexuelle Kontakte mit maximal 3 verschiedenen Sexualpartnern in den letzten 4 Monaten
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 3 Monate nach dem ersten sexuellen Kontakt mit dem letzten neuen Partner
	MC	Rückweisung für 4 Monate nach dem ersten sexuellen Kontakt mit dem letzten neuen Partner

Risikoverhalten, sexuell, C2	Definition	Bezahlter Sex (SpenderIn bezahlt oder wird bezahlt, sexuelle Dienste gegen Geld, Drogen oder Medikamente) <u>einmalig</u> in den letzten 12 Monaten
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 12 Monate nach letztem bezahlten sexuellen Kontakt
	MC	Wie CT / VT

Risikoverhalten, sexuell, C3	Definition	Sexueller Kontakt mit PartnerIn mit Intermediate oder High Risk Verhalten in den letzten 12 Monaten
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 12 Monate nach letztem sexuellen Kontakt
	MC	Wie CT / VT

Risikoverhalten, sexuell, C4	Definition	Sexueller Kontakt mit PartnerIn mit einer sexuell übertragbaren Krankheit (z.B. HIV, HCV, HBV) in den letzten 12 Monaten
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 12 Monate nach letztem sexuellen Kontakt
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Hepatitis B, Sexualpartner



Risikoverhalten, sexuell, D1	Definition	Sexuelle Kontakte mit mehr als 3 verschiedenen Sexualpartnern in den letzten 4 Monaten
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 12 Monate nach dem ersten sexuellen Kontakt mit dem letzten neuen Partner oder Ausschluss wegen High Risk Verhalten
	MC	Wie CT / VT
Risikoverhalten, sexuell, D2	Definition	Bezahlter sexueller Kontakt (SpenderIn bezahlt oder wird bezahlt, sexuelle Dienste gegen Geld, Drogen oder Medikamente) ≥ 2 mal in den letzten 12 Monaten
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Risikoverhalten, sexuell, D3	Definition	Sexueller Kontakt mit PartnerIn mit High Risk Verhalten, aktuell
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 12 Monate nach letztem sexuellen Kontakt (oder Ausschluss)
	MC	Wie CT / VT
Risikoverhalten, sexuell, D4	Definition	Sexueller Kontakt mit PartnerIn mit sexuell übertragbarer Erkrankung (z.B. HIV, HCV, HBV), aktuell
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 12 Monate nach letztem sexuellen Kontakt (oder Ausschluss)
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Hepatitis B, Sexualpartner
Risikoverhalten, sonstiges	Definition	Birgt das Risiko, mit einer übertragbaren Krankheit/Infektion infiziert zu werden



Risikoverhalten, sonstiges, B5	Definition	Intravenöser Drogengebrauch vor > 10 Jahren
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren
	MC	Akzeptieren
Risikoverhalten, sonstiges, B6	Definition	Sexueller Kontakt mit Partner, der in den letzten 10 Jahren intravenös Drogen konsumiert hat, vor > 12 Monaten .
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren
	MC	Akzeptieren
Risikoverhalten, sonstiges, B7	Definition	Aufenthalt > 6 Monate in Ländern mit erhöhter AIDS-Rate vor > 12 Monaten mit potentieller HIV-Exposition (z.B. sexuelle Kontakte, medizinische / paramedizinische Intervention wie Tätowierung, Piercing) (siehe Anhang Art. 7, Travelcheck)
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren
	MC	Akzeptieren
Risikoverhalten, sonstiges, C5	Gehe zu	Risikoverhalten, sonstiges, B5
Risikoverhalten, sonstiges, C7	Definition	Aufenthalt > 6 Monate in Ländern mit erhöhter AIDS-Rate in den letzten 12 Monaten (siehe Anhang Art. 7, Travelcheck) mit potentieller HIV-Exposition (z.B. sexuelle Kontakte, medizinische / paramedizinische Intervention wie Tätowierung, Piercing)
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren, wenn keine Exposition, sonst Rückweisung für 12 Monate nach Rückkehr
	MC	Wie CT / VT



Risikoverhalten, sonstiges, C8	Definition	Sexueller Kontakt in den letzten 12 Monaten mit einem Partner, der in den letzten 12 Monaten in einem AIDS-Risikoland eine Bluttransfusion erhalten hat oder dort einem anderen HIV-Risiko ausgesetzt war (z.B. sexuelle Kontakte, medizinische / paramedizinische Intervention wie Tätowierung, Piercing)
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 12 Monate nach Transfusion, potentieller HIV-Exposition des Partners oder letztem sexuellen Kontakt mit diesem Partner
	MC	Wie CT / VT

Risikoverhalten, sonstiges, D5	Definition	Intravenöser Drogengebrauch in den letzten 10 Jahren
	Registrierung	Rückweisung 10 Jahre nach letztem Konsum
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss

Risikoverhalten, sonstiges, D6	Definition	Sexueller Kontakt mit aktuellem Partner, der in den letzten 10 Jahren intravenöse Drogen konsumiert hat
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss

Risikoverhalten, sonstiges, D8	Definition	Aktuelle sexuelle Kontakte mit Partner der in den letzten 12 Monaten in einem AIDS-Risikoland eine Bluttransfusion erhalten hat oder dort einem anderen HIV-Risiko ausgesetzt war (z.B. sexuelle Kontakte, medizinische / paramedizinische Intervention wie Tätowierung, Piercing)
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 12 Monate nach Transfusion / potentieller HIV-Exposition des Partners
	MC	Wie CT / VT

Roaccutan	Gehe zu	Teratogene Medikamente
------------------	---------	------------------------



Rosazea	Definition	Häufige, chronische entzündliche Hauterkrankung mit Hautrötungen, Papeln und Pusteln im Gesicht. In schweren Fällen wird das Krankheitsbild durch Bindegewebs- und Talgdrüsen-hyperplasien (Phymbildungen) kompliziert. Ursache multifaktoriell: u.a. neurogene Entzündung, Regulationsstörung der Gefäss-versorgung, Störung des Immunsystems. Diverse Auslösefaktoren.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Rotavirus	Gehe zu	Durchfallerkrankung
Röteln	Definition	Hochansteckende Infektionskrankheit, die durch das Rötelnvirus ausgelöst wird und eine lebenslange Immunität hinterlässt, weshalb sie zu den Kinderkrankheiten zählt.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 1 Monat nach vollständiger Genesung und Abschluss der Behandlung
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Kinderkrankheiten, Kontakt
Rückfallfieber	Definition	Von Rückfallfieber-Borrelien verursachte bakterielle Infektionskrankheiten, die durch mehrmalige Fieberschübe, sogenanntes rekurrentes Fieber, charakterisiert sind.
	Registrierung	Akzeptieren 2 Jahre nach vollständiger Genesung ohne Residuen
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
Salmonella Typhi und Paratyphi	Gehe zu	Typhus/Paratyphus
Salmonellose, Kontakt	Gehe zu	Durchfallerkrankung, Kontakt



Salpingitis	Definition	Entzündung eines oder beider Eileiter.
	Registrierung	Rückweisung für 2 Wochen nach vollständiger Genesung und Behandlungsabschluss
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung

Sarkoidose	Definition	Granulomatöse Entzündung, kann jedes Organ befallen, klinisch auffallend am ehesten Lungenbefall.
	Siehe auch	Autoimmunerkrankung

Scharlach	Definition	Akute bakterielle Infektionskrankheit, die vor allem im Kindesalter von vier bis sieben Jahren auftritt. Mögliche Komplikationen: Rheumatisches Fieber, Glomerulonephritis, Endokarditis.
	Registrierung	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung
	CT / VT	Rückweisung für 2 Monate nach vollständiger Genesung
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Endokarditis Glomerulonephritis Rheumatisches Fieber

Scharlach, Kontakt	Registrierung	Akzeptieren nach Kontakt
	CT / VT	Rückweisung für 2 Wochen nach Kontakt
	MC	Wie CT / VT

Schaufensterkrankheit	Gehe zu	Vaskuläre Erkrankung, arteriell
------------------------------	---------	---------------------------------

Schilddrüsenentzündung	Gehe zu	Schilddrüsenerkrankung
-------------------------------	---------	------------------------



Schilddrüsenerkrankung	Definition	Erkrankung der Schilddrüse mit oder ohne Hormonstoffwechselstörung (Hyper- / Hypothyreose).
	Registrierung	<p>Akzeptieren, wenn Schilddrüsenhormon normwertig (euthyreot) mit / ohne Substitutionstherapie, ausser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jegliche Schilddrüsenerkrankung in Abklärung • Malignome (Schilddrüsenkarzinom) • M. Basedow = Grave's Disease <p>Akzeptieren, wenn Ätiologie unbekannt und zur Zeit kein Hinweis auf Autoimmunerkrankung (auch bei St. n. Thyreoidektomie)</p>
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Hashimoto Thyreoiditis
Schilddrüsenüberfunktion	Gehe zu	Schilddrüsenerkrankung
Schilddrüsenunterfunktion	Gehe zu	Schilddrüsenerkrankung
Schistosomiasis	Gehe zu	Bilharziose
Schizophrenie	Definition	Eine Gruppe schwerer psychischer Krankheitsbilder mit ähnlichem Symptommuster, welche Wahrnehmung, Denken, Ich-funktionen, Willen, Gefühls- und Gemütsleben, Antrieb und Psychomotorik betreffen können.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Schlafkrankheit	Siehe auch	<p>Enzephalitis</p> <p>Narkolepsie</p> <p>Trypanosomiasis, afrikanische</p>



Schlaganfall	Gehe zu	Zerebrovaskuläre Erkrankung
Schmerzen, chronisch	Definition	Uneinheitliche Definitionen; gelegentlich als kontinuierliche oder rezidivierende Schmerzen über 6 Monate definiert, häufig assoziiert mit psychischer Belastungssituation.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Schrumpfniere	Gehe zu	Nephrozirrhose
Schuppenflechte	Gehe zu	Psoriasis
Schwangerschaft	Registrierung	Rückweisung während der Schwangerschaft und bis 12 Monate nach der Entbindung.
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Abort
Schwangerschafts-abbruch	Gehe zu	Abort
Schwierige Venenverhältnisse	Zu beachten	Beim Vorliegen von schwierigen Venenverhältnissen müssen die Spenderinnen und Spender ausführlich über die Möglichkeit eines zentralen Venenkatheters aufgeklärt werden.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Beurteilung der Venenverhältnisse durch Blutentnahmeteam Der endgültige Entscheid über die Art der Entnahme liegt im Entnahmezentrums.
	MC	Wie CT / VT



Schwindel	Definition	Symptom illusorischer Bewegung mit diversen möglichen Ursachen.
	Registrierung	Rückweisung solange unter Abklärung, ansonsten Entscheidung gemäss Schwindel-Ursache Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Akustikusneurinom Menière-Krankheit Migräne Zerebrovaskuläre Erkrankung

Sehbehinderung	Gehe zu	Körperliche Einschränkung
-----------------------	---------	---------------------------

Sehfehlerkorrektur, operativ	Definition	Korrektur von Kurz- oder Weitsichtigkeit, oder Hornhautverkrümmung (Astigmatismus)
	Registrierung	Akzeptieren auch wenn mittels Laserverfahren (LASIK / PRK / LASEK)
	CT / VT	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Operation / Eingriff_1_allgemein

Sexualpartner, wechselnde	Gehe zu	Risikoverhalten, sexuell und sonstiges
----------------------------------	---------	--



Sexuell übertragbare Krankheit	Siehe auch	Chlamydien, Infektion Genitalwarzen Gonorrhoe Hepatitis B, akut Hepatitis B, chronisch Hepatitis C Herpes genitalis HIV-Infektion HTLV I/II, Infektion Humane Papilloma Viren (HPV) Lymphogranuloma venereum Risikoverhalten, sexuell Syphilis Ulcus molle	
	Shigellose	Definition	Bakterielle Durchfallerkrankung, durch Shigellen hervorgerufen.
		Registrierung	Rückweisung für 6 Monate nach vollständiger Genesung.
		CT / VT	Wie Registrierung
		MC	Wie Registrierung
		Siehe auch	Durchfallerkrankung
	Shigellose, Kontakt	Gehe zu	Durchfallerkrankung, Kontakt
	Sicca-Syndrom	Gehe zu	Autoimmunerkrankung
	Sichelzellanämie	Definition	Erbliche Erkrankung mit Bildung von abnormen Hämoglobin (HbS), führt zu korpuskulärer hämolytischer Anämie. Autosomal rezessiv vererbt.
		Registrierung	Nicht akzeptieren
CT / VT		Ausschluss	
MC		Ausschluss	



Sichelzellanämie, Träger	Definition	Träger für Sichelzellanämie
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Sinusitis (Rhinosinuitis), akut	Definition	Entzündliche Schleimhautveränderung der Nasennebenhöhlen (Sinusitis) und der nasalen Atemwege (Rhinitis) mit einer Dauer von weniger als 12 Wochen.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung bis 2 Wochen nach vollständiger Genesung und Abschluss einer antibiotischen Therapie
	MC	Wie CT / VT
Sinusitis (Rhinosinuitis), chronisch	Definition	Entzündliche Schleimhautveränderung der Nasennebenhöhlen (Sinusitis) und der nasalen Atemwege (Rhinitis) mit einer Dauer von über 12 Wochen.
	Registrierung	Rückweisung bis 3 Monate nach vollständiger Genesung
	CT / VT	Wie Registrierung Nicht akzeptieren, wenn chronisch rezidivierend und / oder antibiotische Behandlung nötig
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Operation / Eingriff_2_klein Operation / Eingriff_3_mittel
Sinusvenenthrombose	Definition	Blutgerinnsel in den grossen venösen Zusammenflüssen des Gehirns in der harten Hirnhaut.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss



Sjögren-Syndrom	Definition	Chronische Autoimmunerkrankung, die zu einer Entzündung der Speicheldrüsen bzw. serösen Drüsen des Kopf- und Halsbereiches führt.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
	Siehe auch	Autoimmunerkrankung

Soor	Definition	Candidiasis, Candidose, Candidamykose. Infektion der Haut und Schleimhäute durch Pilze der Gattung Candida. (90% Candida albicans).
	Registrierung	Akzeptieren bei einfacher Candidamykose und lokaler Behandlung, wenn keine Grunderkrankung vorliegt
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Mykose

Sphärozytose, hereditäre	Definition	Kugelzellenanämie. Genetisch bedingte hämolytische Anämie aufgrund Strukturdefekt der Erythrozyten.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
	Siehe auch	Anämie, hämolytische



Spina bifida	Definition	Embryonaler Schliessdefekt im Bereich der Wirbelsäule. Die Symptome variieren je nach Ausmass der Verschlussstörung. In einigen Fällen bestehen nur leichte oder gar keine Symptome, in anderen kommen schwere neurologische Ausfälle unterhalb der Läsion vor. Man unterscheidet eine Spina bifida occulta und eine Spina bifida aperta.
	Registrierung	Akzeptieren : Spina bifida occulta, ohne: <ul style="list-style-type: none"> • dauerhaftem Shunt • Katheterisierung der Harnblase • Dekubitus Nicht akzeptieren : Spina bifida aperta Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, Risiko 3_Operation an Gehirn oder Rückenmark
	<hr/>	
Spinozerebelläre Ataxie	Definition	Spinocerebellar ataxia (SCA). Autosomal-dominant vererbte neurodegenerative Erkrankung des mittleren Lebensalters, typischerweise mit Bewegungsstörungen und zunehmender Demenz
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
<hr/>		
Spitalpersonal	Gehe zu	Risikotätigkeiten



Splenektomie	Definition	Operative Entfernung der Milz.
	Registrierung	Rückweisung für 6 Monate nach der Operation und bis zur vollständigen Genesung, falls traumatisch oder die Ursache kein Ausschlusskriterium darstellt
	CT / VT	Wie Registrierung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Operation / Eingriff_4_gross

Spondylitis ankylosans	Definition	M. Bechterew. Chronisch entzündliche rheumatische seronegative Systemerkrankung mit Schmerzen und Versteifen von Gelenken. Befall v.a. Wirbelgelenke der distalen Wirbelsäule und Ileosakralgelenke. Häufig HLA B-27 assoziiert. Autoimmunerkrankung.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
	Siehe auch	Autoimmunerkrankung

Spondylodese, Operation	Gehe zu	Operation / Eingriff_4_gross
--------------------------------	---------	------------------------------

Sterilisation	Siehe auch	Operation / Eingriff_2_klein
		Operation / Eingriff_3_mittel



Sterilität	Definition	Infertilität, Unfruchtbarkeit. Immer Ursache eruieren.
	Registrierung	Nicht akzeptieren , wenn <ul style="list-style-type: none"> • in Abklärung • unter medikamentöser Behandlung mit Tamoxifen • Übertragung von Eizellen oder Embryo von Fremdspender • Behandlung mit Hormonen menschlichen Ursprungs vor 1986 • Ursache eine Kontraindikation für die Spende bedeutet Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Clomid®

Stevens-Johnson-Syndrom	Definition	SJS. Eine Form des Erythema exsudativum multiforme. Seltene, immunologische (allergische) T-Zell-vermittelte Reaktion der Haut, die zu einer Ablösung der Haut führt, ausgelöst durch Medikamente (ca. 50%), Infektionen (Mycoplasmen, Bakterien, Viren) oder maligne Prozesse. Es kommt zur Nekrose der Keratinozyten. Immer (obligat) Mitbeteiligung der Schleimhäute. Letalität ca 6%. Unterschiedliche Schweregrade: <ul style="list-style-type: none"> • Bis 10% Körperoberfläche beteiligt: SJS • 10-30% beteiligt: Übergangsform SJS – TEN • > 30% beteiligt: TEN (TEN = toxische epidermale Nekrolyse, Lyell-syndrom)
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Lyell-Syndrom



Stoma	Definition	Operativ angelegte Verbindung zwischen einem Hohlorgan und der äußeren Haut (z.B. Ileostoma, Tracheostoma).
	Registrierung	Nicht akzeptieren, ausser nach vorübergehender Stoma-Anlage und wenn Grundkrankheit kein Ausschlusskriterium darstellt
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Operation / Eingriff_3_mittel Operation / Eingriff_4_gross

Struma	Gehe zu	Schilddrüsenerkrankung
---------------	---------	------------------------

Suchtverhalten	Gehe zu	Drogengebrauch
-----------------------	---------	----------------

Synkope	Gehe zu	Bewusstlosigkeit
----------------	---------	------------------

Syphilis	Definition	Lues. Infektion mit Treponema pallidum, Übertragung durch direkte sexuelle Kontakte
	Registrierung	Akzeptieren, wenn vollständig und erfolgreich behandelt
	CT / VT	Akzeptieren, wenn vollständig behandelt und mit laborbestätigtem Ausschluss einer aktuellen Infektion Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt
	MC	Wie CT / VT Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt
	Siehe auch	Risikoverhalten, sexuell

Syphilis, sexuelle Kontakte	Registrierung	Rückweisung für 12 Monate nach letztem Kontakt mit infiziertem Partner
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung



Syringomyelie	Definition	Flüssigkeitsgefüllte Höhlenbildung in der grauen Substanz des Rückenmarkes, v.a. Zervikal- / Brustmark, angeboren (oft weitere Anomalien) oder erworben (durch Tumoren, nach Trauma).
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Systemischer Lupus Erythematodes (SLE)	Gehe zu	Autoimmunerkrankung
Tätowierung , Piercing, (Semi-) Permanentes Make-Up, elektrische Epilierung, Mikroblading	Definition	Verletzung mit potentiell kontaminierter Punktions- oder Injektionsnadel
	Zu beachten	Immer auf sterile Arbeitstechnik mit Einwegnadeln achten, Vorsicht bei Tätowierung / Piercing in Land mit erhöhtem Infektionsrisiko (nachfragen! -> Information an TZ)
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren nur wenn kein Hinweis auf (bakteriellen) Infekt und keine Komplikationen vorliegen Rückweisung für 1 Monat nach Ereignis
	MC	Akzeptieren nur wenn kein Hinweis auf (bakteriellen) Infekt und keine Komplikationen vorliegen Rückweisung für 2 Monate nach Ereignis
	Siehe auch	Akupunktur Nadelstichverletzung
Temporalarteriitis	Definition	Riesenzellarteriitis, Arteriitis temporalis, M.Horton. Systemische Gefässentzündung der mittelgrossen Arterien des Kopfes.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
	Siehe auch	Autoimmunerkrankung



Teratogene Medikamente	Definition	Medikamente, die Fehlbildungen beim Embryo hervorrufen können. Heute eher «reproduktionstoxisch» genannt – das heisst solche Medikamente: a) sind Medikamente mit Wirkung auf den männlichen Hormonstoffwechsel / Fortpflanzungsfähigkeit und (rel.) kurzer Halbwertszeit: b) können die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen und das Kind im Mutterleib schädigen (fruchtschädigend)
	Zu beachten	TZ über Einnahme informieren
	Registrierung	Akzeptieren, wenn Medikament im Rahmen einer Spende gemäss den Rückweisungsfristen abgesetzt werden kann.
	CT / VT	Die Rückweisungsfristen richten sich nach dem Grad der Reproduktionstoxizität und der Halbwertszeit der Medikamente. Halbwertszeit = Zeit, in welcher die Konzentration eines Arzneimittels im Blut auf ihren halben Wert (50%) absinkt. Rückweisungsfristen: a) Medikamente mit Wirkung auf den männlichen Hormonstoffwechsel / Fortpflanzungsfähigkeit und (rel.) kurzer Halbwertszeit: <ul style="list-style-type: none"> • Keine Rückweisung bei: Alocapil®, Finacapil®, Finasterax®, Andropecia Biorga®, Propecia® oder Proscar® (Wirkstoff: Finasterid) • 6 Monate: Avodart®, Duodart® (Wirkstoff: Dutasterid) b) Medikamente mit schwerer Reproduktionstoxizität: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Jahr: Acicutan®, Neotigason (Wirkstoff: Acitretin) • 2 Jahre: Erivedge® (Wirkstoff: Vismodegib) Eine allfällige Verkürzung der Rückweisungsfrist der oben genannten Medikamente unterliegt im Einzelfall dem Ermessen Arzt Bei anderen teratogenen Medikamenten: Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt



MC

Rückweisungsfristen:

a) Medikamente mit Wirkung auf den männlichen Hormonstoffwechsel / Fortpflanzungsfähigkeit und (rel.) kurzer Halbwertszeit:

- 1 Monat: Alocapil®, Finacapil®, Finasterax®, Andropecia Biorga®, Propecia® oder Proscar® (Wirkstoff: Finasterid)
- 6 Monate: Avodart®, Duodart® (Wirkstoff: Dutasterid)

b) Medikamente mit schwerer Reproduktionstoxizität:

- 1 Jahr: Acicutan®, Neotigason (Wirkstoff: Acitretin)
- 2 Jahre: Erivedge® (Wirkstoff: Vismodegib)

Eine allfällige Verkürzung der Rückweisungsfrist der oben genannten Medikamente unterliegt im Einzelfall dem Ermessen Arzt

Bei anderen teratogenen Medikamenten Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt

Thalassämie Alpha	Definition	Mittelmeeraanämie. Genetisch bedingte gestörte Hämoglobulinbildung.
	Zu beachten	Information an TZ
	Registrierung	Akzeptieren <ul style="list-style-type: none"> • Träger • Thalassämia minor, wenn Spender bei guter Gesundheit und Hb im erlaubten Bereich liegt Nicht akzeptieren: <ul style="list-style-type: none"> • Thalassämia major und intermedia
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung



Thalassämie Beta	Definition	Mittelmeeranämie. Genetisch bedingte gestörte Hämoglobulinbildung.
	Zu beachten	Information an TZ
	Registrierung	Akzeptieren <ul style="list-style-type: none">• Träger• Thalassämia minor, wenn Spender bei guter Gesundheit und Hb im erlaubten Bereich liegt Nicht akzeptieren: <ul style="list-style-type: none">• Thalassämia major und intermedia
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung



Thrombophilie	Definition	<p>Thromboseneigung. Genetisch bedingte oder erworbene Neigung zur Bildung von Blutgerinnseln innerhalb von Blutgefässen (infolge veränderter Eigenschaften von Blutzellen, Blutplasma, Blutströmung oder Gefässwänden).</p> <p>Bis zu 50% erbliche Veranlagung, Faktoren der Blutgerinnung sind durch Genmutationen verändert.</p> <p>(Zusätzliche) Risikofaktoren: Rauchen, Übergewicht, Bewegungsmangel, Medikamente (v.a. oestrogenhaltige Kontrazeptiva), Schwangerschaft, Immobilisierung</p> <p>Die häufigsten sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • APC-Resistenz (Faktor-V-Leiden-Mutation) • Protein-C-Mangel • Protein-S-Mangel • Prothrombinmutation 20210 Mutation • Antithrombin-Mangel • Antiphospholipid-Antikörper / Lupus-Antikoagulans • Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ II <p>Andere Formen nach Rücksprache mit Arzt.</p>
	Registrierung	<p>Akzeptieren bei milder Thrombophilie (heterozygote Faktor-V-Leiden-Mutation, heterozygote Prothrombin 20210 Mutation), wenn</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anamnese bland bezüglich thromboembolischen Ereignissen • Keine weiteren Risikofaktoren für Thrombosen bekannt sind <p>Nicht akzeptieren aller anderer Thrombophilien</p>
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung



Thrombophlebitis / Phlebitis	Definition	Oberflächliche Venenentzündung mit / ohne Bildung eines Blutgerinnsels. Immer Grundkrankheit und Risikofaktoren abklären!
	Zu beachten	G-CSF-verabreichung ist ein zusätzlicher Risikofaktor. Emboliegefahr bei Thrombusbildung.
	Registrierung	Akzeptieren nach einmaligem, provoziertem Ereignis mit abgeschlossener Therapie und vollständiger Genesung und ohne familiäre Disposition Nicht akzeptieren bei wiederholten Ereignissen Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	CT / VT	Rückweisung nach abgeschlossener Therapie 1-6 Monate je nach Ausmass Wie Registrierung
	MC	Wie CT / VT
Thrombose, Arterie	Gehe zu	Vaskuläre Erkrankung, arteriell
Thrombose, Venen oberflächlich	Gehe zu	Thrombophlebitis / Phlebitis
Thrombose, Venen tief	Gehe zu	Phlebothrombose
Thrombotisch-Thrombozytopenische Purpura	Definition	Akute, fulminant verlaufende Erkrankung mit Thrombozytopenie und mikroangiopathischer hämolytischer Anämie.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung



Thrombozythämie primäre / essentielle	Definition	Thrombozytose. Gehört zum Formenkreis der myeloproliferativen Neoplasien. Anhaltende starke Vermehrung der Thrombozyten im Blut.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss

Thrombozytopathie	Definition	Auch Thrombopathie. Funktionsstörung der Thrombozyten, die zu einer erhöhten Blutungsbereitschaft führt.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss

Thyreoiditis	Gehe zu	Schilddrüsenerkrankung
---------------------	---------	------------------------



Tinnitus	Definition	Auch als «Ohrensausen» bezeichnet. Auditive Wahrnehmungen, denen keine äusseren Schallquellen zugeordnet werden können. Einteilung nach Schweregrad (Biesinger et al.): Grad 1: Tinnitus ist gut kompensiert, kein Leidensdruck Grad 2: Tinnitus tritt hauptsächlich bei Stille auf und wirkt störend bei Stress und Belastungen Grad 3: Tinnitus führt zu einer dauernden Beeinträchtigung im privaten und beruflichen Bereich. Es treten Störungen im emotionalen, kognitiven und körperlichen Bereich auf. Grad 4: Tinnitus führt zur völligen Dekompensation im privaten Bereich, Berufsunfähigkeit. Pulsierender Tinnitus: pulssynchron, meist einseitig, beruht oft auf einer intrazerebralen blutgefässbedingten Ursache.
	Registrierung	Akzeptieren, wenn <ul style="list-style-type: none"> • Grad 1 - 2 (keine schwere Beeinträchtigung im Alltag) und • Keine somatische Ursache bekannt Nicht akzeptieren, bei <ul style="list-style-type: none"> • Tinnitus ab Grad III (dauernde Beeinträchtigung im Alltag, Gefahr Dekompensation) • bei pulsierendem Tinnitus • Regelmässige medikamentöse Behandlung Sonst Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt
	CT / VT	Wie Registrierung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie Registrierung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin

Toctino	Gehe zu	Teratogene Medikamente
----------------	---------	------------------------

Tonsillektomie	Gehe zu	Operation / Eingriff_3_mittel
-----------------------	---------	-------------------------------

Tonsillitis akut	Definition	Angina tonsillaris, akute Entzündung der Gaumenmandeln.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung von 2 Wochen nach Absetzen der Antibiotika- behandlung und bis zur vollständigen Genesung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT



Tonsillitis, chronisch / rezidivierend	Definition	Gaumenmandel-Entzündung mit einer Dauer von > 12 Wochen oder chronisch rezidivierend.
	Registrierung	Rückweisung für 3 Monate nach vollständiger Genesung
	CT / VT	Wie Registrierung Nicht akzeptieren, wenn chronisch rezidivierend und / oder antibiotische Behandlung nötig
	MC	Wie CT / VT
Toxische epidermale Nekrolyse (TEN)	Gehe zu	Lyell-Syndrom
Toxoplasmose	Definition	Infektionskrankheit mit <i>Toxoplasma gondii</i> , Zoonose, primär Befall von Katzen, Mensch ist fakultativer Zwischenwirt. Infektion bei immunkompetenten Personen meist asymptomatisch, Infektion in der Schwangerschaft kann zu embryonalen Missbildungen führen.
	Zu beachten	Bei positivem Befund immer TZ informieren
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 6 Monate bei nachgewiesener, aktueller Infektion
	MC	Wie CT / VT
Tracheitis	Definition	Luftröhrenentzündung. Ursachen infektiös, allergisch, chemische oder mechanische Reize. Akute Tracheitis. Häufig Folge einer Virusinfektion der Atemwege oder kombiniert (z.B. Rhinotracheitis, Tracheobronchitis).
	Registrierung	Akzeptieren ausser wenn chronische Erkrankung mit starker Einschränkung der Atmung
	CT / VT	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung bei akuter Symptomatik Ausschluss bei chronischer Erkrankung mit starker Einschränkung der Atmung
	MC	Wie CT / VT



Transitorische ischämische Attacke (TIA)	Gehe zu	Zerebrovaskuläre Erkrankung
Transmenschen / Transgender	Definition	Transient, Bezeichnung für Menschen deren soziales Geschlecht von ihrem biologischen Geschlecht abweicht. Sie fühlen sich nicht dem Geschlecht zugehörig, dem sie bei Geburt zugeordnet wurden. Kein Zusammenhang mit der sexuellen Orientierung.
	Registrierung	Registrierung in der internationalen Datenbank muss mit dem biologischem Geschlecht geschehen Anrede unter dem Namen, mit welchem sich der Spender identifiziert Allfällige Hormonbehandlungen oder medizinische / operative Geschlechtsanpassungen berücksichtigen
	CT / VT	Akzeptieren, wenn allfällige Hormonbehandlungen oder medizinische / operative Anpassungen keine Kontraindikation darstellen <ul style="list-style-type: none"> • Meldung über Transgender Status an Transplantations- und Entnahmezentrum • bei Transmännern (f → m): Schwangerschaftsanamnese • bei Transfrauen (m → f) global höhere Prävalenz für HIV Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT, zusätzlich: <ul style="list-style-type: none"> • bei Spende physiologische Parameter berücksichtigen (z.B. Hb, Ferritin, Blutvolumen) • bei Transmännern eventuell Schwangerschaftstest
	Siehe auch	Risikoverhalten, sexuell
Transplantation, allogenen	Gehe zu	Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, Risiko 1_Übertragung von menschlichem Gewebe



Transplantation, auto-log	Definition	Übertragung von Gewebe einer Person auf eine andere Stelle des eigenen Körpers.
	Registrierung	<p>Akzeptieren wenn Transplantation von Haut, Gefässen, Haaren, Knochen, Sehnen oder Knorpel</p> <p>Nicht akzeptieren : autologe Transplantation von Blutstammzellen</p> <p>Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin in Abhängigkeit der Grundkrankheit</p>
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
Transplantation, Xeno	Gehe zu	Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, Risiko 4_Übertragung von tierischem Gewebe
Tretinac	Gehe zu	Teratogene Medikamente
Trigeminusneuralgie	Definition	Intensiver Gesichtsschmerz im Bereich des Nervus Trigeminus, meist einseitig, plötzlich auftretend, kurzdauernd. Idiopathisch oder symptomatisch z.B. als Folge eines Entzündungsprozesses oder Tumors.
	Registrierung	Akzeptieren, wenn einmaliges, abgeschlossenes Ereignis
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
Trippler	Gehe zu	Gonorrhoe
Trypanosomiasis, afrikanische	Definition	Durch Protozoen verursachte und durch die Tsetse-Fliege übertragene, potenziell tödliche Tropenkrankheit, welche schliesslich durch einen schläfrigen Dämmerzustand gekennzeichnet ist.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss



Trypanosoma Cruzi	Siehe auch	Chagas, Infektion Chagas, Risiko
Tuberkulose	Definition	Bakterielle Infektionskrankheit, die durch verschiedene Arten von Mykobakterien verursacht wird und beim Menschen am häufigsten die Lungen befällt. Übertragungsweg fast immer Tröpfcheninfektion, viel seltener via Blut, Organtransplantation oder andere Körpersekrete.
	Registrierung	Akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> keine akute Infektion nachweisbar mind. 2 Jahre nach Abschluss der Behandlung kein Rückfall
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Tuberkulose, latent
Tuberkulose, Kontakt	Definition	Kontakt mit einer an Tuberkulose erkrankten Person. Das Infektionsrisiko ist abhängig von Häufigkeit, Dauer und Enge des Kontaktes, Virulenz des Erregers und Immunabwehrlage des Wirtes.
	Registrierung	Akzeptieren ausser regelmässiger und enger Kontakt mit Personen mit offener Tuberkulose
	CT / VT	Rückweisung für 2 Monate nach letztem Kontakt, dann Screening-Test
	MC	Wie CT / VT
Tuberkulose, latent	Definition	Serologischer Nachweis (z.B. Quantiferon®) oder Mantoux-Probe einer M. tuberculosis-Infektion ohne Anzeichen für eine aktive Tuberkulose bzw. nach deren Ausschluss.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt; Information TZ
	MC	Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt; Risk Acceptance durch TZ



Turner-Syndrom	Definition	Gonosomale Monosomie, Karyotyp 45,X
	Registrierung	Akzeptieren, wenn kein Herz- oder Nierenfehler oder Funktionsstörung vorhanden ist und Informed Consent möglich
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Körperliche Einschränkung

Typhus/Paratyphus	Definition	Typhus/Paratyphus ist eine meldepflichtige systemische Infektionskrankheit, die durch das Bakterium Salmonella typhi bzw. Salmonella Paratyphi hervorgerufen wird.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 1 Woche nach Abschluss der Behandlung und der vollständigen Genesung
	MC	Wie CT / VT

Ulcus molle	Definition	Ulcus molle (auch Weicher Schanker) ist eine in Europa sehr seltene sexuell übertragbare Krankheit, die vor allem in tropischen Ländern auftritt.
	Registrierung	Rückweisung für 12 Monate nach abgeschlossener Behandlung (Spender und Sexualpartner)
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Risikoverhalten, sexuell Sexuell übertragbare Krankheit



Ulcus ventriculi / Ulcus duodeni	Definition	Geschwür des Magens oder des Zwölffingerdarms.
	Zu beachten	Ausschluss Magenkarzinom
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung : <ul style="list-style-type: none"> • bei akuten Symptomen • für 1 Monat nach Endoskopie und je nach Befund • bei <i>Helicobacter pylori</i>-positivem Befund bis zur erfolgreichen <i>H. pylori</i>-Eradikation Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Rückweisung : <ul style="list-style-type: none"> • bei akuten Symptomen • für 2 Monate nach Endoskopie und je nach Befund • bei <i>Helicobacter pylori</i>-positivem Befund bis zur erfolgreichen <i>H. pylori</i>-Eradikation Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	Siehe auch	Endoskopie

Unterbindung	Gehe zu	Operation / Eingriff_3_mittel
---------------------	---------	-------------------------------

Urethritis	Definition	Entzündung der Harnröhre
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung bis zur vollständigen Genesung und bis 2 Wochen nach Absetzen der Antibiotikabehandlung, falls akut Ausschluss, falls chronisch
	MC	Wie CT / VT



Urtikaria	Definition	Quaddelbildung unterschiedlicher Ursache (z.B. Allergie, Kälte, UV-Strahlung).
	Registrierung	Akzeptieren, wenn <ul style="list-style-type: none"> • Auslöser bekannt ist und keine Kontraindikation darstellt • einmaliges Ereignis, auch wenn Auslöser unbekannt Frequenz und Intensität berücksichtigen !
	CT / VT	Wie Registrierung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Allergie
Urtikaria factitia	Definition	Eine physikalische Urtikaria, ausgelöst durch mechanische Reize wie Kratzen, Reiben, Scheuern der Haut oder Druck auf die Haut.
	Registrierung	Nicht akzeptieren, wenn „physikalischer Druck auf die Haut „ der Auslöser ist
	CT / VT	Wie Registrierung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin
	MC	Wie CT / VT
Vaquez-Osler-Krankheit	Gehe zu	Polyzythämia vera
Varizellen	Gehe zu	Herpes Zoster



Varizen, Beine	Definition	Krampfadern
	Registrierung	Akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> keine entzündlichen oder thrombotischen Komplikationen Varizenstadium ≤ C2 nach CEAP-Klassifikation, d.h. kein/e Ödem oder Hautveränderungen
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Phlebothrombose Portale Hypertonie Venenablationstherapie
Vasektomie	Gehe zu	Sterilisation
Vaskuläre Erkrankung, arteriell	Definition	Meist Verschlusskrankheiten durch Ablagerungen an Gefässwänden (Arteriosklerose) und / oder entzündlichen Prozessen mit folglich verminderter oder ganz unterbrochener Sauerstoffversorgung des nachgeschalteten Organs oder Gewebes. Dazu gehören: <ul style="list-style-type: none"> periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK) akuter Gefässverschluss arterielles Aneurysma Vaskulitis Thrombangiitis obliterans (TAO) Arteriosklerose Koronare Herzkrankheit
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
	Siehe auch	Kardiovaskuläre Erkrankung Zerebrovaskuläre Erkrankung



Vaskuläre Erkrankung, venös

Definition Krampfaderleiden oder Thrombose

Siehe auch Chronisch venöse Insuffizienz (CVI)
 Hämorrhoiden
 Phlebothrombose
 Portale Hypertonie
 Sinusvenenthrombose
 Thrombophlebitis / Phlebitis
 Varizen, Beine

Venenablationstherapie

Definition Es bestehen verschiedene Methoden zur Ablatio von Venen bei einer chronisch venösen Insuffizienz (u.a. Varizen): chemisch, thermal, mechanisch. Dazu gehören u.a.:

- Sklerotherapie
- Ablation mit Laser / Licht / Radiofrequenz
- Venen- / Perforans-Ligatur
- Venen-Stripping
- Crossektomie

Siehe auch Operation / Eingriff_2_klein
 Operation / Eingriff_3_mittel
 Operation / Eingriff_4_gross

Vismodegib

Gehe zu Teratogene Medikamente

Vitiligo

Definition Eine durch fleckenartigen Pigmentverlust gekennzeichnete, häufige und kosmetisch bedeutsame Dermatose, deren Ursache die Zerstörung von Melanozyten in der Epidermis ist.

Registrierung Nicht akzeptieren

CT / VT Akzeptieren
 Nur BM Spende, Info an TZ
 Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin

MC Wie CT / VT, risk acceptance durch TZ



Von-Willebrand-Jürgens-Syndrom	Definition	Häufigste autosomal-dominant vererbte Gerinnungsstörung. Strukturdefekt oder Mangel an von Willebrand Faktor (vWF). vWF ist Trägerprotein des Faktors VIII.
	Registrierung	Nicht akzeptieren, ausser Typ 3 Trägerstatus
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung

Wachstumshormon	Definition	Wird als Arzneistoff verwendet bei Wachstumshormonmangel infolge Insuffizienz der Hypophyse.
	Siehe auch	Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, Risiko 5_Wachstumshormonbehandlung vor 1.1.1986

Warzen	Definition	Häufige, unter Umständen ansteckende, kleine, scharf begrenzte, durch das humane Papilloma-Virus verursachte Epithel-Geschwulste der oberen Hautschicht.
	Registrierung	Akzeptieren, wenn Hautwarzen nur lokal behandelt werden und Haut intakt ist
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Genitalwarzen

Weicher Schanker	Gehe zu	Ulcus molle
-------------------------	---------	-------------



West Nile Virus, durchgemacht	Definition	<p>Infektionskrankheit, die hauptsächlich bei Vögeln auftritt und durch Mücken auf den Menschen übertragen werden kann. Verläuft in ca. 80% asymptomatisch, sonst mit grippeähnlichen Symptomen.</p> <p>Nachgewiesene Erkrankung (positiver NAT-Test)</p>
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	<p>Rückweisung für 4 Monate nach Diagnose oder Beginn Symptome (Patientenrisiko)</p> <p>TZ über positiven NAT Befund / Erkrankung informieren. In dringenden Fällen kann TZ entscheiden, die Rückweisungsfrist unter Akzeptanz des Risikos zu verkürzen, wenn Spender asymptomatisch -> siehe "West Nile Virus, Risiko"</p>
	MC	Wie CT / VT



West Nile Virus, Risiko	Definition	Aufenthalt in einem Risikogebiet (siehe Anhang Art. 7, Travelcheck). Generelles Testen während der Saison.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückkehr vor > 1 Monat mit oder ohne Symptome: <ul style="list-style-type: none"> • Akzeptieren • Keine Rückweisungsfrist • Kein Test Rückkehr vor < 1 Monat , ohne Symptome: <ul style="list-style-type: none"> • Akzeptieren • Keine Rückweisungsfrist • Kein Test (Test wird beim MC durchgeführt) Rückkehr vor < 1 Monat , mit Symptomen: <ul style="list-style-type: none"> • Akzeptieren für CT • NAT-Test durchführen - frühestens 5 Tage nach Rückkehr
MC	<p><i>MC Termin während Juli – Dezember:</i></p> <p>NAT Test in jedem Fall durchführen. Im Falle einer Reise, frühestens 5 Tage nach Rückkehr aus Risikogebiet.</p> <p><i>MC Termin während Januar - Juni:</i></p> Rückkehr vor > 1 Monat , mit oder ohne Symptome: <ul style="list-style-type: none"> • Akzeptieren • Keine Rückweisungsfrist • Kein Test Rückkehr vor < 1 Monat , mit oder ohne Symptome: <ul style="list-style-type: none"> • Akzeptieren • NAT Test durchführen - frühestens 5 Tage nach Rückkehr 	
Windpocken	Gehe zu	Herpes Zoster



Wurmerkrankung	Definition	Auch Helminthiasis, durch parasitische Würmer verursachte Erkrankung.
	Registrierung	Nicht akzeptieren Ausnahmen: Rückweisung bis zur vollständigen Genesung und Absetzen der Behandlung bei unkomplizierter Infektion mit: <ul style="list-style-type: none">• Spulwürmern (Ascariasis)• Madenwürmern (Enterobius vermicularis)• Rinderbandwurm (Taenia saginata)• Schweinebandwurm (Taenia solium)
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Echinokokkose
Yersiniosis enterocolitica	Gehe zu	Durchfallerkrankung
Zahnabszess	Gehe zu	Abszess
Zahnextraktion	Gehe zu	Operation / Eingriff_2_klein
Zahnimplantat	Gehe zu	Knochen- und Sehnenimplantate
Zahnoperation	Gehe zu	Operation / Eingriff_3_mittel



Zeckenbiss / -stich	Definition	Biss / Stich durch eine Zecke. Es werden verschiedene Krankheiten von Zecken übertragen (z.B. Borreliose, Frühsommer Meningoenzephalitis FSME, Babesiose).
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none">• Ereignis vor mind. 1 Monat oder erfolgte Borreliose-Sekundärprophylaxe• keine Symptome
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Babesiose Borreliose Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)

Zentralvenenthrombose	Definition	Augenvenenthrombose. Verstopfung / Verschluss der zur Netzhaut führenden Vene.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss

Zerebralshunt	Definition	VA-/VP-Shunt. Verbindung (Katheter / Drainage) zwischen dem Ventrikelsystem des Gehirns und der Bauchhöhle (Peritonealraum, VP) bzw. dem rechten Herzvorhof (Atrium, VA) zur permanenten Ableitung des Liquors bei Hydrocephalus bzw. erhöhtem intrakraniell Druck (primär oder sekundär).
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss



Zerebrovaskuläre Erkrankung	Definition	Gruppe von Erkrankungen, welche die Blutgefässe des Gehirns, d.h. die Hirnarterien oder Hirnvenen betreffen, darunter zusammengefasst sind: <ul style="list-style-type: none"> • Gefässmalformation • Hirnblutung • Hirndurchblutungsstörung • Hirnschlag / Stroke / Schlaganfall • Transitorische ischämische Attacke (TIA) • Zentralvenenthrombose
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
	Siehe auch	Hirnblutung, unfallbedingt
Zervixdysplasie	Definition	Vorstufe des Zervixkarzinoms in situ
	Registrierung	Akzeptieren, sofern unter regelmässiger Kontrolle
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Zervixkarzinom in situ
Zervixkarzinom	Definition	Gebärmutterhalskrebs
	Siehe auch	Krebs Zervixkarzinom in situ
Zervixkarzinom in situ	Definition	Auch Cervicale intraepitheliale Neoplasie (CIN), nicht invasive, potenziell bösartige Schleimhautveränderungen des Gebärmutterhalses.
	Registrierung	Akzeptieren : <ul style="list-style-type: none"> • nach Konisation und • ohne Chemo- oder Radiotherapie
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung



Zervixkonisation	Gehe zu	Zervixkarzinom in situ
-------------------------	---------	------------------------

Zika-Virus, durchgemacht	Definition	Eine von Mücken übertragene Virusinfektion mit grippe-artigen Symptomen, wobei in ca.80% asymptomatisch. Bei Schwangeren schwere Schädigungen des Fötus möglich. Nachgewiesene Erkrankung (positiver NAT-Test)
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückweisung für 4 Monate nach Diagnose oder Beginn Symptome (Patientenrisiko) TZ über positiven NAT-Befund / Erkrankung informieren. In dringenden Fällen kann TZ entscheiden, die Rückweisungsfrist unter Akzeptanz des Risikos zu verkürzen, wenn Spender asymptomatisch
	MC	Wie CT / VT



Zika-Virus, Risiko	Definition	Aufenthalt in einem Zika-Virus-Risikogebiet (siehe Risikoländerliste) bzw CDC-Karten.
	Zu beachten	Aktuelle Ausbreitung ersichtlich auf CDC (Centre for Disease Control and Prevention, USA): https://www.cdc.gov/zika/areasatrisk.html
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Rückkehr vor > 1 Monat mit oder ohne Symptome: <ul style="list-style-type: none"> • Akzeptieren • Keine Rückweisungsfrist • Kein Test Rückkehr vor < 1 Monat ohne Symptome: <ul style="list-style-type: none"> • Akzeptieren • Keine Rückweisungsfrist • Kein Test Rückkehr vor < 1 Monat mit Symptomen: <ul style="list-style-type: none"> • Akzeptieren für CT / VT • NAT Test durchführen - frühestens 5 Tage nach Rückkehr
	MC	Rückkehr vor > 1 Monat mit oder ohne Symptome: <ul style="list-style-type: none"> • Akzeptieren • Keine Rückweisungsfrist • Kein Test Rückkehr vor < 1 Monat mit oder ohne Symptome: <ul style="list-style-type: none"> • Akzeptieren • NAT Test, frühestens 5 Tage nach Rückkehr
Zirrhose	Definition	Bindegewebsvermehrung infolge einer chronischen Entzündung, welche zu Verhärtung und narbiger Schrumpfung eines Organs und zum Untergang von Funktionsgewebe führt, z.B. <ul style="list-style-type: none"> • Leberzirrhose • Nierenzirrhose (Schrumpfniere)
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss



Zöliakie	Definition	Glutenunverträglichkeit (Klebereiweiss von Weizen), Mischform einer Allergie und einer Autoimmunerkrankung.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren, bei gut kontrollierter Erkrankung mit minimalen Symptomen Nur Knochenmark-Spende erlaubt; Information an das TZ
	MC	Wie CT / VT Risk acceptance durch TZ
	Siehe auch	Autoimmunerkrankung
Zuckerkrankheit	Gehe zu	Diabetes mellitus
Zwölffingerdarmgeschwür	Gehe zu	Ulcus ventriculi / Ulcus duodeni
Zystenniere	Definition	Eine Gruppe meist erblich bedingter Erkrankungen der Nieren, die durch die Bildung einer Vielzahl von flüssigkeitsgefüllten Kammern (Zysten) charakterisiert sind und dadurch mit dem progredienten Funktionsverlust der Niere einher gehen.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
Zystische Fibrose	Gehe zu	Mukoviszidose
Zystitis	Gehe zu	Harnwegsinfekt (HWI)



Zytomegalievirus	Definition	Auch Cytomegalievirus (CMV), DNA-Virus der Familie Herpesviridae, auch als Humanes Herpes Virus 5 (HHV5) bezeichnet. Weltweit verbreitet, hohe Durchseuchung. Übertragung durch Tröpfchen- oder Schmierinfektion via Speichel, Blut, Urin, Samenflüssigkeit, Zervixsekret. Erstinfektion bei Immunkompetenten in über 75% inapparent oder mild, für immun-supprimierte Personen ist eine CMV Infektion gefährlich und kann tödlich enden.
	Zu beachten	Der Serostatus wird aufgrund des IgG Wertes festgelegt. Wenn nur der IgM Wert positiv ist, wird der Spender als seronegativ betrachtet, da der IgM Test sehr oft falsch positiv ist und in fast allen Fällen keine IgG-Serokonversion nachfolgt.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Bei klinischem Verdacht auf CMV (Erst-)Infektion: Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin Bei CT immer Serologie durchführen. Bei positivem IgM wird ein NAT-Test durchgeführt. Bei positivem NAT, Rückweisung für <ul style="list-style-type: none"> • 1 Monat bei positivem IgG • 3 Monate bei negativem IgG
	MC	Bei klinischem Verdacht auf CMV (Erst-)Infektion: Ermessen der Spendetauglichkeit durch Ärztin Bei MC immer Serologie (IgM und IgG) durchführen. Bei positivem IgM wird ein NAT-Test durchgeführt. Bei positivem NAT, Rückweisung für <ul style="list-style-type: none"> • 1 Monat bei positivem IgG • 3 Monate bei negativem IgG <p>Die Rückweisung kann verkürzt werden bei Unterzeichnung einer Risk Acceptance durch das TZ.</p> <p>TZ sofort informieren, wenn zwischen CT / VT und MC eine Änderung der Serologie auftritt (IgG-Resultat wird positiv).</p>