



Critères d'aptitude – Don de cellules souches du sang

Documentation et principes fondamentaux

Les critères d'aptitude au don de cellules souches du sang sont la base de la sécurité du donneur comme de celle du receveur et sont contraignants. Ils sont applicables tout au long du processus de don de cellules souches du sang, y compris du don de lymphocytes (DLI) (enregistrement, groupage de contrôle, check-up médical).

Ces critères sont rédigés conformément à la législation, aux standards et directives nationaux et internationaux applicables et sont régulièrement actualisés par le groupe de spécialistes responsable. La directrice médicale SBSC en annonce les modifications et les met en vigueur.

La liste des critères d'aptitude au don est organisée par ordre alphabétique. Le fichier est accessible par le site web de Transfusion CRS Suisse / portail d'information de SBSC. La forme électronique du portail d'information correspond toujours à la version actuelle. Ce fichier est complété par d'autres documents des Prescriptions de Transfusion CRS Suisse et SBSC tels que

- [Online Travelcheck](#) ou Annexe Art. 7, Travelcheck : Pays ou zones à risques de maladies infectieuses
- [Online Check vaccination](#) ou Annexe Art. 7, Vaccine Check : Check vaccination
- Annexe Art. 7, Mediliste : CIT pendant / après prise de médicaments
- 1414_DOK_Classification_Risk_Behaviour
- 1408_DOK_Procedure_Malaria_CT_MC

En outre, il faut intégrer dans l'évaluation du risque d'infections transmissibles **les décisions actuelles** de SBSC ou BSD (à disposition sur Dokuman: Décisions SBSC, Décisions BSD).

L'aptitude au don est déterminée par du personnel formé sous la responsabilité d'un médecin (SBSC, SRTS, centre de prélèvement). Si l'on décèle lors du questionnaire/de l'examen des symptômes ou des résultats d'analyse remettant en cause l'aptitude au don, ces informations doivent être interprétées et jugées à l'aide des critères. En cas de contre-indication temporaire ou définitive, le donneur doit recevoir une explication détaillée de la raison de la suspension.

S'il existe un doute quant à l'aptitude au don ou une suspicion de risque sanitaire ou un risque sanitaire avéré pour le donneur ou le receveur non décrit ou insuffisamment décrit dans les critères, la décision revient au médecin responsable. En cas de doutes, il est possible de consulter le service médical de SBSC.

Protection du donneur / Protection du patient

La responsabilité incombe à SBSC de protéger les donneurs de risques liés à un don de cellules souches du sang. Pour cette raison, les critères d'aptitude au don doivent être suivis strictement en cas **d'un risque pour le donneur**.

Dans les situations où le donneur est en fait apte au don, mais il existe **un risque pour le receveur** (p. ex. séjour du donneur dans une région à risque pour la malaria), il peut être possible d'appliquer une certaine latitude en ce qui concerne l'interprétation des critères d'aptitude, c'est-à-dire, des mesures exceptionnelles sont possibles (p. ex. une réduction de la durée du CIT après un séjour à l'étranger). L'évaluation doit être faite au cas par cas, chaque exception doit être discutée avec le service médical de SBSC.

Le registre / le centre de transplantation concerné est informé du risque dans un tel cas et impliqué dans la décision sur la conduite à tenir. La responsabilité d'accepter ou de refuser un risque pour le patient incombe au transplantateur (2097_FOR_Declaration_Risk_Risk_Acceptance).

Nr: 1411	Name: DOK_Donor_Eligibility_Criteria-Blood_Stem_Cell_Donation_F	Version: 9.0	Gültig ab: 11.08.2025
			Seite: 1 von 195



Terminologie employée dans le présent document

Contre-indication définitive, CID	Mesure illimitée dans le temps. Le donneur est retiré du registre et doit en être informé de manière compréhensible pour lui
Contre-indication temporaire, CIT	Mesure limitée dans le temps. Le donneur doit savoir quand et comment il sera à nouveau éligible
Accepter	Le donneur est autorisé à être enregistré comme donneur de cellules souches du sang, à subir le groupage de contrôle ou le check-up médical
Se référer à	Doit être consulté: On trouvera à cet endroit la procédure recherchée pour ce critère (même procédure)
Voir aussi	Peut être consulté en cas de besoin
À noter	Notification particulière devant être respectée pour le critère correspondant
Complément	Aide à la décision
CT / VT	Groupage de contrôle (Confirmatory Typing / Verification Typing)
MC	Check-up médical (Medical CheckUp)

Le terme «donneur» est employé indifféremment pour désigner donneuses et donneurs.



Abcès	Définition	Toute forme d'abcès, p. ex. abcès cutané, dentaire_
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 1 semaine après la fin de l'antibiothérapie systémique et jusqu'au rétablissement complet
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Opération grande_4 Opération moyenne_3 Opération petite_2
Abcès dentaire	Se référer à	Abcès
Accès veineux difficile	À noter	En cas d'accès veineux difficile, la donneuse ou le donneur doit être informé-e avec précision de la pose possible d'un cathéter veineux central.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Evaluation de l'accès veineux par l'équipe responsable de la prise de sang. La décision définitive quant aux modalités du prélèvement incombe au centre de prélèvement.
	MC	Comme CT / VT
Accident d'exposition au sang	Se référer à	Contact avec du sang étranger
Accident ischémique transitoire (AIT)	Se référer à	Maladie cérébrovasculaire
Accident vasculaire cérébrale (AVC)	Se référer à	Maladie cérébrovasculaire
Acicutan	Se référer à	Médicaments tératogènes



Acné	Définition	Maladie des glandes sébacées et des follicules pileux qui se traduit par la formation tout d'abord de comédons non enflammés et qui évolue vers des efflorescences enflammées, telles que papules, pustules ou nodosités. Traitement local ou systémique selon gravité de l'affection
	À noter	Transmettre l'information au centre de transplantation
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter si le donneur est disposé à / en mesure de suspendre son traitement médical avant le don
	MC	Comme CT / VT Arrêt de la médication semaines avant le prélèvement si prise orale d'isotrétinoïne (Curakne®, Roaccutan®, Tretinac®), de trétinoïne (Vesanoid®), ou d'alitrétinoïne (Toc-tino®) Arrêt de la médication semaines avant le prélèvement si prise de rétinoïdes topiques (Roaccutan® gel, Differin®) et/ou d'antibiotiques oraux
Acromégalie	Définition	Maladie endocrinienne. Croissance exagérée du visage et des extrémités due à une sécrétion excessive de l'hormone de croissance somatotropine. La cause en est souvent une tumeur bénigne de l'adénohypophyse.
	Enregistrement	Accepter si la tumeur est définitivement retirée et qu'aucun traitement médicamenteux ne s'impose
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
Activités à risque	Définition	Personnel hospitalier, laborantins, médecins, assistantes médicales, soignants de patients souffrants de maladies transmissibles
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter si pas de contact avec du sang étranger (par blessure par piqûre d'aiguille, de la peau ou des muqueuses)
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Blessure par piqûre d'aiguille Contact avec du sang étranger



Acupuncture	Définition	Méthode de traitement de la médecine traditionnelle chinoise (MTC) consistant en une stimulation de zones déterminées du corps par la pose d'aiguilles stériles
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter <ul style="list-style-type: none"> • Si l'acupuncture a été pratiquée en Suisse • S'il ne fait aucun doute que les méthodes de travail respectent toutes les consignes de stérilité et que les aiguilles utilisées sont à usage unique • S'il n'existe aucun signe d'infection (bactérienne) <p>CIT de 1 mois si l'acupuncture a été pratiquée dans un pays affichant un risque accru d'infection</p>
	MC	Accepter 48 heures après le traitement <ul style="list-style-type: none"> • Si l'acupuncture a été pratiquée en Suisse • S'il ne fait aucun doute que les méthodes de travail respectent toutes les consignes de stérilité et que les aiguilles utilisées sont à usage unique • S'il n'existe aucun signe d'infection (bactérienne) <p>CIT de 2 mois après le traitement si l'acupuncture a été pratiquée dans un pays affichant un risque accru d'infection</p>
Adénofibrome du sein, ablation	Se référer à	Opération moyenne_3
Agonistes des récepteurs du GLP-1	Définition	Antidiabétiques du groupe des agonistes des récepteurs du GLP-1. Sont administrés en cas de diabète sucré de type 2 et pour la perte pondérale en cas d'obésité. <ul style="list-style-type: none"> • Sémaglutide: p. ex. Ozempic®, Wegovy®, Rybelsus® • Liraglutide: p. ex. Saxenda®
	À noter	Informier le centre de transplantation
	Enregistrement	Accepter si le surpoids/la maladie de base ne constituent pas des facteurs d'exclusion
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement



Alcool	À noter	La capacité de discernement peut être réduite sous l'effet de l'alcool (déclaration de consentement)
	Enregistrement	Ne pas accepter si : <ul style="list-style-type: none">• Le donneur est régulièrement/en permanence sous l'effet de l'alcool• Le donneur se qualifie lui-même d'alcoolique• Consommation > 40 unités/semaine• Le donneur participe à un programme de sevrage (antabus) Une unité d'alcool correspond à : <ul style="list-style-type: none">• 1 verre de bière à 5% (2.5 dl)• 1 verre de vin ou de champagne à 12% (1 dl)• 1 verre d'apéritif à 20% (6 cl)• 1 verre de Vodka ou de Whisky à 40% (3 cl)• 1 verre de alcopop/prémix à 5% (2.5 dl)
	CT / VT	Comme enregistrement Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Drogue, usage de

Alitrétinoïne	Se référer à	Médicaments tératogènes
----------------------	--------------	-------------------------



Allergie	Définition	Réaction immunologique à un allergène (p. ex. médicament, aliment, piqûre d'abeille/de guêpe, etc.) <u>Classification des stades pour ce qui est des réactions aiguës :</u> Stade 1 : démangeaisons, rougeurs, urticaire, enflure Stade 2 : stade 1, enrouement, essoufflement, nausées, vomissements, élévation de la fréquence cardiaque, chute de pression, arythmie Stade 3 : stade 1, vomissements, enflure des voies respiratoires, bronchospasme, choc Stade 4 : stade 1, vomissements, arrêt respiratoire, arrêt circulatoire
	À noter	Toujours informer le centre de prélèvement et le centre de transplantation de toute allergie Prendre garde en particulier aux réactions graves aux médicaments, tels les anesthésiques!!
	Enregistrement	Accepter en cas de stade 1 avec / sans traitement: <ul style="list-style-type: none">• seul traitement local / seul en cas de crise / seul thérapie par inhalation Ne pas accepter si <ul style="list-style-type: none">• réactions de stade 2 - 4• traitement peroral requis régulièrement• réaction anaphylactique connue
	CT / VT	Accepter en cas de stade 2 s'il s'agit d'un événement unique avec des allergènes connus qui ne pose pas de problème critique pour la mobilisation/le prélèvement Ne pas accepter si : <ul style="list-style-type: none">• Stade 3 - 4 Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT Aptitude à déterminer par le médecin
	Voir aussi	Allergie alimentaire Asthme bronchique Désensibilisation Eczéma Rhume des foins Traitement médicamenteux Urticaire



Allergie alimentaire	Définition	Hypersensibilité spécifique à certaines substances présentes dans l'alimentation.
	À noter	Informez le centre de prélèvement et le centre de transplantation de toute allergie !
	Enregistrement	Accepter si symptômes légers Ne pas accepter si anamnèse de choc anaphylactique
	CT / VT	CI en cas de symptômes présents de cause indéterminée Ne pas accepter si anamnèse de choc anaphylactique
	MC	CIT jusqu'au rétablissement complet (en cas des symptômes actuels) Ne pas accepter si anamnèse de choc anaphylactique
	Voir aussi	Allergie Urticaire

Allergie médicamenteuse	Se référer à	Allergie
--------------------------------	--------------	----------

Allo-anticorps anti-erythrocytaires	À noter	Informez le centre de transplantation de la présence d'allo-anticorps anti-erythrocytaires
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter
	MC	Accepter

Alocapil	Se référer à	Médicaments tératogènes
-----------------	--------------	-------------------------



Alopécie	Définition	Chute de cheveux pathologique, alopécie, peut être congénitale ou acquise, diffuse, focale ou totale. Formes: <u>Alopécie diffuse</u> : Chute de cheveux progressive sur toute la tête, symptôme de différents troubles de l'ensemble de l'organisme (p ex. maladie générale grave, variations hormonales, maladie de la thyroïde, carence en vitamines/fer, maladies infectieuses, médicaments, stress) <u>Alopécie androgénétique</u> : Chute de cheveux androgénétique de nature héréditaire/hormonale. Hypersensibilité des follicules pileux aux androgènes qui concerne env. 80% des hommes. Traitement au finastéride (pour les hommes) <u>Alopécie en aires</u> : Chute de cheveux par plaques rondes. Perte de cheveux pathologique inflammatoire circonscrite localement: Maladie vraisemblablement auto-immune
	Enregistrement	Accepter <ul style="list-style-type: none"> • si l'état général du donneur le permet en cas d'<u>alopécie diffuse</u> • s'il est possible d'interrompre le traitement médical pendant la durée du prélèvement en cas d'<u>alopécie androgénétique</u> <p>Ne pas accepter en cas d'alopecie en aires</p>
	CT / VT	Ne pas accepter en cas de thérapie immunosuppressive systémique En cas de prise de médicaments tératogènes, voir critère Médicaments tératogènes (p. ex. Alocapil®, Finacapil®, ou Propecia®) Alopécie en aires : seul prélèvement de moelle osseuse possible, en informer le centre de transplantation Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT En cas d'alopecie en aires : L'acceptation du risque revient au centre de transplantation
	Voir aussi	Maladie auto-immune



Amibiase	Définition	Dysenterie amibienne. Infection de l'intestin par des amibes de type <i>Entamoeba histolytica</i> . Traitement par antibiotiques (métronidazole, tétracyclines) et par la chloroquine.
	Enregistrement	CIT de 6 mois après la fin du traitement si viscéral CIT jusqu'au rétablissement complet et jusqu'à la fin du traitement si intestinal
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement

Amygdalectomie	Se référer à	Opération moyenne_3
-----------------------	--------------	---------------------

Amygdalite aiguë	Définition	Angine tonsillaire, inflammation aiguë des amygdales.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CI de 2 semaines après arrêt de l'antibiothérapie et rétablissement complet Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT

Amygdalite chronique / récidivante	Définition	Inflammation des amygdales d'une durée > 12 semaines ou chronique-récidivante.
	Enregistrement	CIT de 3 mois après rétablissement complet
	CT / VT	Comme enregistrement Ne pas accepter si chronique-récidivante et/ou antibiothérapie nécessaire
	MC	Comme CT / VT

Anaphylaxie	Se référer à	Allergie
--------------------	--------------	----------



Anémie	Définition	Baisse du taux d'hémoglobine dans le sang sous le seuil normal pour l'âge et le sexe concernés. Classification en aiguë/chronique, congénitale ou acquise selon morphologie des erythrocytes.
	À noter	Toujours déterminer la cause de l'anémie. Pas de don dans un état anémique. Aptitude au don à déterminer par le médecin.
	Voir aussi	Anémie aplasique Anémie falciforme Anémie hémolytique Anémie, carence en fer Anémie, carence en vit. B12 ou en acide folique Sphérocytose héréditaire Thalassémie
Anémie aplasique	Définition	Forme d'anémie particulière. Trouble de la fonction de la moelle osseuse avec pancytopenie due à une aplasie congénitale ou acquise de la moelle osseuse. <ul style="list-style-type: none"> • congénitale : anémie de Fanconi, syndrome de Diamond-Blackfan • acquise : idiopathique, médicamenteuse, toxines, radiation ionisante, virus
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
Anémie falciforme	Définition	Drépanocytose. Maladie génétique à transmission autosomique récessive se caractérisant par l'altération de la formation de l'hémoglobine (HbS), conduit à l'anémie hémolytique corpusculaire.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID



Anémie falciforme/ drépanocytose, porteur sain	Définition	Porteur sain de l'anémie falciforme/la drépanocytose
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
Anémie hémolytique	Définition	Destruction prématurée des érythrocytes par un processus (auto)immun ou de nature mécanique ou dû à une maladie héréditaire.
	Enregistrement	Ne pas accepter.
	CT / VT	CID
	MC	CID
Anémie, carence en fer	Définition	Baisse du taux d'hémoglobine due à une réduction du taux physiologique de fer. Forme d'anémie la plus fréquente, env. 80% des intéressés sont des femmes (menstruations, grossesse, lactation). Cause la plus fréquente : perte de fer due à des hémorragies (chroniques). Apport insuffisant par l'alimentation, Réduction/trouble de l'absorption de fer. Exclure des hémorragies chroniques et une maladie tumorale!
	À noter	Pas de don en état anémique. Privilégier le don de cellules souches du sang périphérique.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter si le donneur reçoit une substitution martiale et que son taux d'hémoglobine est dans la norme Déterminer la cause et traiter si nécessaire Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Hémoglobine



Anémie, carence en vit. B12 ou en acide folique	Définition	Carence en vitamine B12 généralement due à un apport ou une absorption insuffisante pendant des années. Conséquence possible : anémie mégaloblastique. <ul style="list-style-type: none"> • Apport insuffisant : par l'alimentation • Absorption insuffisante : modifications de l'estomac (déficit en facteur intrinsèque dû p. ex. à une gastrite chronique, opération gastrique, infection par l'hélicobacter), maladie intestinale inflammatoire, • Besoin accru : p. ex. grossesse
	À noter	Pas de don en état anémique. Privilégier le don de cellules souches du sang périphérique.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter si le donneur reçoit une substitution de vitamine B12 et que son taux d'hémoglobine est dans la norme Déterminer la cause et traiter si nécessaire Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT
Anesthésie	Se référer à	Opération_généralités_1
Angine	Se référer à	Amygdalite aiguë
Angine de poitrine	Se référer à	Maladie cardiovasculaire
Anorexie	Se référer à	Trouble du comportement alimentaire
Anosmie / Parosmie / Ageusie au cours d'une infection au COVID-19	Se référer à	Infection des voies respiratoires supérieures
Antabus	Se référer à	Alcool



Anticoagulation	Définition	Inhibition médicamenteuse de la coagulation
	À noter	Toujours déterminer la cause de la médication
	Enregistrement	Ne pas accepter pendant la médication. Selon la maladie de base, évent. enregistrement après l'arrêt du traitement.
	CT / VT	Ne pas accepter pendant la médication. Accepter selon maladie de base si arrêt de la médication possible jusqu'au prélèvement.
	MC	Comme CT / VT
Voir aussi	Liste des médicaments Maladie cardiaque Maladie cardiovasculaire Maladie vasculaire artérielle Phlébothrombose	

Apoplexie	Se référer à	Maladie cérébrovasculaire
------------------	--------------	---------------------------

Appendicectomie	Se référer à	Opération moyenne_3
------------------------	--------------	---------------------

Artériosclérose	Voir aussi	Maladie cardiovasculaire Maladie cérébrovasculaire
------------------------	------------	---

Artérite temporale	Définition	Artérite giganto-cellulaire, Maladie de Horton. Inflammation systémique des artères cérébrales moyennes.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Voir aussi	Maladie auto-immune



Arthrite infectieuse	Définition	Infection directe (post-traumatique, iatrogène lors d'opérations ou d'injections) ou hémotogène de l'articulation
	Enregistrement	CIT jusqu'au rétablissement complet après fin des traitements nécessaires
	CT / VT	Comme enregistrement Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT
Arthrite non infectieuse	Définition	Maladie articulaire inflammatoire de type rhumatismal, maladie auto-immune. Exemples : <ul style="list-style-type: none"> • Arthrite rhumatoïde • Arthrite psoriasique • Polyarthrite (juvénile)
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
Arthrite rhumatoïde	Se référer à	Arthrite non infectieuse
Arthroscopie	Enregistrement	Accepter.
	CT / VT	CIT de 1 mois ou selon résultats
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Opération moyenne_3 Opération petite_2



Arthrose	Définition	Maladie articulaire dégénérative
	Enregistrement	Accepter si aucune limitation fonctionnelle importante dans la vie quotidienne
	CT / VT	Accepter si : <ul style="list-style-type: none"> • Aucune phase aiguë • Aucune limitation importante dans la vie quotidienne
	MC	Accepter si : <ul style="list-style-type: none"> • Aucune phase aiguë • Localisation de l'arthrose compatible avec la technique de prélèvement • Don physiquement possible Aptitude à déterminer par le médecin
Arythmie	Définition	Anomalie de la fréquence cardiaque normale causée par des troubles/irrégularités du départ et de la conduction de l'excitation dans le muscle cardiaque. Classification selon l'emplacement (oreillette, ventricule, création et conduction de l'excitation) : Supraventriculaire : extrasystoles, tachycardie supraventriculaire, fibrillation auriculaire, flutter auriculaire, bloc sino-atrial Ventriculaire : extrasystoles, tachycardie ventriculaire, flutter ventriculaire, fibrillation ventriculaire Départ et conduction de l'excitation : syndrome du nœud sinusal, bloc atrio-ventriculaire, syndrome de Wolff-Parkinson-White
	À noter	Demander au sujet s'il souffre d'une maladie (cardiaque) de base
	Enregistrement	Accepter si : <ul style="list-style-type: none"> • extrasystoles sporadiques • l'arythmie dépend de la respiration • après traitement ablatif réussi, stable et sans médicament
	CT / VT	Comme enregistrement Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme enregistrement Aptitude à déterminer par le médecin



Aspirine®, Aspirine Cardio®	Définition	Acide acétylsalicylique
	Enregistrement	Accepter si prise sporadique ou préventive (sans maladie coronarienne manifeste) Vérifier motif de la médication Aptitude à déterminer par le médecin
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Liste des médicaments Maladie cardiovasculaire
Asthme bronchique	Définition	Maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires caractérisée par différents troubles récurrents, une obstruction bronchique réversible et des bronchospasmes. Déclenchement par une multitude d'agents irritants (allergiques / non allergiques, infectieux)
	À noter	Les asthmatiques courent un risque accru lors du don, en particulier à cause de l'anesthésie.
	Enregistrement	Accepter si : <ul style="list-style-type: none"> • Traitement par inhalateur seul suffisant (aussi en combinaison, y c. corticostéroïdes) • Inhalateur à titre préventif Ne pas accepter si : <ul style="list-style-type: none"> • Crises d'asthme fréquentes • Thérapie per os requise régulièrement (théophylline, corticostéroïdes oraux, antagonistes des leucotriènes) • Traitement stationnaire répété • Le donneur a déjà dû être traité aux soins intensifs pour une crise d'asthme
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement



Ataxie spino-cérébelleuse	Définition	Maladie neurodégénérative génétique à transmission autosomique dominante, survenant entre la trentaine et la cinquantaine, se caractérisant par des troubles des mouvements et une démence progressive
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
Attaque cérébrale (ictus)	Se référer à	Maladie cérébrovasculaire
Autisme	Se référer à	Syndrome d'Asperger
Avodart	Se référer à	Médicaments tératogènes
Avortement	Définition	Interruption de grossesse, fausse couche
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CI à partir de la date de l'interruption, pour le nombre de mois de grossesse (grossesse avant la fin de la 28e semaine) CIT de 12 mois si interruption de grossesse intervenant au 3 ^e trimestre (> 28 semaines)
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Opération_généralités_1



Babésiose	Définition	Maladie infectieuse causée par des babésies, petits parasites intracellulaires, et transmise par une piqûre de tiques. Les symptômes s'apparentent à ceux du paludisme. Survient aussi chez les animaux (p. ex. chiens, bovins, ovins, caprins, cervidés). Les parasites s'attaquent aux érythrocytes -> hémolyse plus ou moins étendue. Transmission congénitale possible .
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
Basaliome	Définition	Cancer de la peau semi-malin (destructif localement, sans métastase)
	Enregistrement	Ne pas accepter si traitement par vismodegib (Erivedge®). CIT de 2 ans après l'arrêt du traitement.
	CT / VT	CIT jusqu'au rétablissement complet. après excision Ne pas accepter si traitement par vismodegib (Erivedge®). CIT de 2 ans après l'arrêt du traitement.
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Médicaments tératogènes Opération_généralités_1
Bêtabloquant	Définition	Médicament hypotenseur, administré en cas d'hypertension, de déficience cardiaque, d'angine de poitrine, de troubles du rythme cardiaque, etc.
	À noter	Déterminer la cause de la prise
	Enregistrement	Accepter si la cause de la prise le permet
	CT / VT	Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Hypertension artérielle Maladie cardiaque Maladie cardiovasculaire



Bilharziose	Définition	Maladie tropicale, nommée aussi schistosomiase. Agent : schistosomes, de la famille des trématodes. Chez l'être humain, cinq genres pathogènes sont décrits (S.mansoni,- haematobium,-japonicum,-intercalatum,-mekongi). Helminthiase de deux formes : bilharziose urogénitale (attaque la vessie et les voies urinaires), bilharziose intestinale (vers parasites dans les eaux douces souillées)
	Enregistrement	CIT de 12 mois après la fin du traitement (praziquantel)
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
Biopsie	Se référer à	Opération petite_2
Blennorragie	Se référer à	Gonorrhée
Blépharite	Définition	Inflammation de la paupière. Souvent dans le cadre d'une affection dermatologique, d'origine microbienne ou allergique.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 2 semaines après l'arrêt de l'antibiothérapie et jusqu'au rétablissement complet
	MC	Comme CT / VT
Blessure à la tête	Définition	Blessure du crâne due à une violence traumatique externe, avec ou sans lésion cérébrale.
	À noter	Une blessure à la tête paraissant anodine de l'extérieur peut avoir des conséquences graves si son étendue réelle n'est pas déterminée. Faire attention à tout symptôme neurologique comme des céphalées, des vertiges, des nausées, une amnésie, une perte de connaissance.



Blessure à la tête, grave	Définition	Blessure à la tête avec traumatisme crânien/fracture du crâne/traumatisme cranio-cérébral. Tissu cérébral lésé ou limité dans sa fonction : <ul style="list-style-type: none"> • Commotion cérébrale • Contusion cérébrale • Compression cérébrale Complications : perte de connaissance, pression intracrânienne, hémorragie épidurale ou sous-durale. Conséquences neurologiques tardives, par. ex épilepsie.
	Enregistrement	CIT jusqu'au rétablissement complet Ne pas accepter si conséquences neurologiques tardives Aptitude à déterminer par le médecin
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Epilepsie Hémorragie cérébrale liée à un accident

Blessure à la tête, légère	Définition	Blessure à la tête avec lacération/plaie par rupture ou tuméfaction.
	Enregistrement	CIT jusqu'au rétablissement complet
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement



Blessure par piqûre d'aiguille	Définition	Blessure par piqûre d'une aiguille de ponction ou d'injection potentiellement contaminée, surtout dans un contexte médical.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter seulement si aucun signe d'infection (bactérienne) et en absence de complications CIT de 1 mois après l'évènement CIT de 12 mois, si administration d'immunoglobulines anti-hépatite B après une piqûre d'aiguille
	MC	Accepter seulement si aucun signe d'infection (bactérienne) et en absence de complications CIT de 2 mois après l'évènement CIT de 12 mois si application d'Immunoglobulines anti-hépatite-B après une piqûre d'aiguille
	Voir aussi	Acupuncture Tatouage , piercing, maquillage (semi-)permanent, épilation électrique, microblading

Borderline	Définition	Trouble de la personnalité se caractérisant par de l'impulsivité et de l'instabilité dans les relations humaines, l'humeur et l'image de soi. Haute comorbidité avec les dépressions et le TDAH (Trouble Déficit de l'Attention/Hyperactivité).
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID



Borrélie	Définition	Infection bactérienne par des bactéries nommées Borrelia, transmission par les tiques. Nommée aussi maladie de Lyme / borrélie de Lyme.
	Enregistrement	Accepter après traitement réussi sans complications Ne pas accepter si infection chronique
	CT / VT	CIT de 2 semaines après l'arrêt de l'antibiothérapie et jusqu'au rétablissement complet (aucun symptôme résiduel) CID en cas d'infection chronique, si déjà enregistré
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Piqûre de tique

Boulimie	Se référer à	Trouble du comportement alimentaire
-----------------	--------------	-------------------------------------

BPCO	Définition	Bronchopneumopathie chronique obstructive
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID

Bradycardie	Définition	Fréquence cardiaque < 60/min Causes possibles : maladies du nœud sinusal (p. ex. syndrome du nœud sinusal, bloc sino-atrial (BSA), bloc atrio-ventriculaire (BAV), fibrillation auriculaire lente. Egalement maladie coronarienne, médicaments (bêtabloquants) Toujours exclure une cause cardiaque
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CID si cause cardiaque Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT



Bronchite aiguë	Définition	Inflammation aiguë des bronches, maladie infectieuse contagieuse si causée par des bactéries ou des virus
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 2 semaines après arrêt de l'antibiothérapie et jusqu'au rétablissement complet
	MC	Comme CT / VT

Bronchite chronique	Définition	Episodes chroniques de toux et d'expectorations sur une période d'au moins trois mois pendant deux années consécutives. Evolue souvent vers une BPCO.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID

Brucellose	Définition	Infection par des bactéries du genre brucella : Anthropozoonose, transmission à l'être humain par des animaux infectés avec lesquels l'être humain entre en contact (bovins, caprins, ovins, porcs, chevaux et chiens). Entrée de l'agent par les muqueuses (système digestif ou voies respiratoires par le biais des excréments, de l'urine, du lait non pasteurisé ou du fromage produit avec celui-ci).
	Enregistrement	Ne pas accepter si infection confirmée lors de l'anamnèse
	CT / VT	CIT de 3 mois après ingestion d'aliments suspects CID si infection avérée
	MC	Comme CT / VT



Bypass gastrique	Enregistrement	Accepter un an après l'opération si : <ul style="list-style-type: none">• La maladie de base ne constitue pas un critère d'exclusion• L'évolution est dépourvue de complication• IMC < 40• Bon état général• Le dernier examen médical n'a révélé aucun problème Sinon aptitude au don à déterminer par le médecin
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Opération grande_4

Calculs biliaires	Se référer à	Cholélithiase
--------------------------	--------------	---------------

Calculs rénaux	Définition	Dépôts de cristaux dans le système pyélocaliciel. Les calculs rénaux qui se déplacent dans les voies urinaires peuvent rester bloqués dans des passages étroits et provoquer un blocage aigu de l'urine (colique rénale). Danger d'infection (pyélonéphrite). Traitement médicamenteux / non chirurgical (lithotripsie extracorporelle par ondes de choc répétées) / chirurgical
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CI en cas de symptômes aigus
	MC	Comme CT / VT
Voir aussi	Colique rénale Néphrite	

Calculs rénaux, opération	Se référer à	Opération moyenne_3
----------------------------------	--------------	---------------------



Cancer	Définition	Maladie maligne
	Enregistrement	Ne pas accepter sauf si : <ul style="list-style-type: none">• Basaliome• Cancer du col de l'utérus in situ sans chimio- ni radiothérapie
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
Cancer de la peau	Définition	Modification maligne de la peau, p. ex. mélanome malin, mycosis fongoïde, fibrosarcome, angiosarcome
	Enregistrement	Ne pas accepter. Exception : basaliome
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Voir aussi	Basaliome
Cancer de la prostate	Se référer à	Cancer
Cancer du col de l'utérus	Voir aussi	Cancer Carcinome du col utérin in situ
Cancer du rein	Se référer à	Cancer
Candidose	Définition	Candidiase, muguet. Infection fongique de la peau et des muqueuses par des levures du genre Candida (90% Candida albicans).
	Enregistrement	Accepter en cas d'infection fongique aux Candida, si traitement local et en l'absence d'une maladie de base
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Mycose



Cannabidiol, CBD	Se référer à	Drogue, usage de
Cannabis	Se référer à	Drogue, usage de
Carcinome cervical	Définition	Cancer du col de l'utérus
	Voir aussi	Cancer Carcinome du col utérin in situ
Carcinome du col utérin in situ	Définition	Néoplasie cervicale intraépithéliale (CIN) ; modifications de la muqueuse du col de l'utérus non invasives et potentiellement malignes
	Enregistrement	Accepter : <ul style="list-style-type: none"> • après conisation et • en l'absence de chimio- et radiothérapie
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
Cardiomyopathie	Définition	Maladie du myocarde / du muscle cardiaque : groupe très hétérogène de maladies du muscle cardiaque avec troubles fonctionnels mécaniques et/ou électriques. Répartition en : <ul style="list-style-type: none"> • primaire : génétique / mixte génétique-acquis / acquis • secondaire : le cœur est touché dans le cadre de maladies systémiques : p. ex. maladies de surcharge, inflammations, infections, maladie auto-immune, causes toxiques ou endocrinologiques
	Enregistrement	Ne pas accepter sauf si : Statut après myocardite secondaire d'une maladie virale et rétablissement complet sans thérapie
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement Check-up médical avec examen cardiologique



Cardiopathie congénitale	Définition	Malformation congénitale ou acquise du cœur ou des vaisseaux afférents et efférents avec restrictions fonctionnelles du système cardiovasculaire ou du système cardiopulmonaire, p. ex. : <ul style="list-style-type: none"> • canal atrioventriculaire (CAV) • communication interauriculaire (CIA) / foramen ovale persistant (FOP) • malformation des vaisseaux et des valves
	Enregistrement	Ne pas accepter sauf si foramen ovale opéré sans séquelle ni thérapie
	CT / VT	Comme enregistrement Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme enregistrement Aptitude à déterminer par le médecin
Cataracte	Définition	Opacité du cristallin. Thérapie chirurgicale, implantation d'une lentille artificielle à la place du cristallin opaque
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 1 mois après l'intervention
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Opération petite_2
Céphalée en grappe	Définition	Nommée également névralgie de Bing-Horton ou algie vasculaire de la face. Céphalée primaire caractérisée par de violentes douleurs localisées sur un côté de la tête, au niveau de la tempe et de l'œil, survenant par poussée. Alternance d'épisodes très fréquents (« grappe ») et de longues périodes sans crise. Liée au rythme circadien. Cause peu claire, ne doit pas être associée, comme pour la migraine, à des troubles circulatoires.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter si le sujet est dans une période sans crise Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Migraine



Céphalées	À noter	Toujours demander la durée, la fréquence, les causes ou déclencheurs possibles !
	Enregistrement	Accepter si céphalées uniquement occasionnelles et si le donneur se sent en bonne santé par ailleurs Aptitude à déterminer par le médecin si céphalées fréquentes et/ou régulières
	CT / VT	Comme enregistrement Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Céphalée en grappe Migraine

Chagas, infection	Définition	Infection par le parasite Trypanosoma cruzi. Présent dans l'Amérique centrale et du Sud. Transmission par des réduves, sorte de punaises hématophages de la sous-famille des Triatominae. Infection déclarée ou confirmée par un test de laboratoire anti-T.cruzi positif, actuelle ou passée
	À noter	En cas de doute, toujours faire le test. Accepter seulement si test négatif
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Voir aussi	Liste des pays



Chagas, risque de	Définition	Le donneur est né, a grandi ou vécu pendant > 6 mois dans un pays à risque élevé de Chagas, ou sa mère est originaire d'un pays endémique pour la maladie de Chagas (voir Annexe Art. 7, Travelcheck). La maladie est transmise à l'homme par des punaises dans les régions rurales et apparaît très rarement chez les personnes effectuant un voyage touristique.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 2 mois au retour d'un séjour de longue durée, ensuite CT avec test de Chagas (test de laboratoire anti-T.cruzi). Le test n'est pas nécessaire, si un résultat négatif est déjà disponible/connu et il n'y a pas eu d'exposition depuis lors CID en cas de résultat positif d'un test de laboratoire pour la maladie de Chagas
	MC	Comme CT / VT

Chancre mou	Définition	Le chancre mou, causé par l' <i>Haemophilus ducreyi</i> , est une maladie sexuellement transmissible très rare en Europe qui survient principalement dans les pays tropicaux.
	Enregistrement	CIT de 12 mois après fin du traitement (donneur et partenaire sexuel)
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Comportement à risque, sexuel Maladie sexuellement transmissible

Changement de partenaire	Se référer à	Comportement à risque, sexuel
---------------------------------	--------------	-------------------------------



Chikungunya, histoire de	Définition	Maladie déclarée ou confirmée (Test NAT positive)
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 4 mois après le diagnostic ou le début de symptômes Informer le centre de transplantation du résultat positif de la NAT / de la maladie. Lors d'un cas très urgent, le centre de transplantation peut décider de raccourcir la durée du CIT, en acceptant le risque, si le donneur est asymptomatique - > voir " Chikungunya, risque de "
	MC	Comme CT / VT



Chikungunya, risque de	Définition	Séjour dans une zone endémique (voir Annexe Art. 7, Travelcheck)
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	<p>Si de retour depuis > 4 mois, avec ou sans symptômes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Accepter• Sans CIT• Sans test <p>Si de retour depuis < 4 mois, sans symptômes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Accepter• Sans CIT• Sans test <p>Si de retour depuis < 4 mois, avec symptômes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Accepter• Tester avec NAT - au plus tôt 10 jour après le retour! <p>Si NAT négative et donneur asymptomatique: accepter. Si symptômes résiduels : aptitude à déterminer par le médecin.</p> <p>Si NAT positive: CIT de 4 mois après le retour ou début de symptômes (risque pour le patient).</p> <p>Informez le centre de transplantation d'un résultat positif. Le transplantateur peut décider de raccourcir la durée du CIT en acceptant le risque. Dans ce cas:</p> <ul style="list-style-type: none">• CIT de 3 semaines (au minimum), puis répéter la NAT• Si NAT négative : Accepter• Si NAT positive: CIT d'encore 3 semaines et répéter la NAT



MC

Si de retour depuis **> 4 mois**, avec ou sans symptômes

- accepter
- sans CIT
- sans test

Si de retour depuis **< 4 mois**, avec ou sans symptômes:

- accepter
- tester avec NAT, **au plus tôt 10 jour après le retour, sans exceptions !**
- les IgG et IgM peuvent être analysés sur demande

Si NAT **négative et donneur asymptomatique**: accepter

Si NAT **positive**: CIT de 4 mois après le retour ou début de symptômes (risque pour le patient).

Informez le centre de transplantation d'un résultat positif de la NAT. Le transplantateur peut décider de raccourcir la durée du CIT en acceptant le risque. Dans ce cas:

- CIT de 3 semaines (au minimum), puis répéter la NAT
- Si NAT **négative** : répéter de nouveau la NAT après une semaine et **accepter si NAT 2 fois négative**
- Si NAT **positive**: CIT d'encore 3 semaines et répéter la NAT

Chlamydie

Définition

Infection par l'agent infectieux du genre Chlamydia trachomatis (plusieurs sérotypes). Infection génitale, qui est une des plus fréquentes maladies sexuellement transmissibles. L'infection est fréquente chez les jeunes actifs sexuellement, le plus souvent silencieux

Enregistrement

Accepter

CT / VT

CIT de 2 semaines après la fin du traitement, absence d'autres maladies sexuellement transmissibles à l'anamnèse et relation sexuelle stable.

MC

Comme CT / VT



Cholangite sclérosante primitive	Définition	Inflammation chronique rare des voies biliaires au sein et/ou en dehors du foie. Risque élevé de cholangiocarcinome.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
Cholécystectomie	Se référer à	Opération moyenne_3
Cholécystite	Définition	Inflammation de la vésicule biliaire
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 2 semaines après arrêt de l'antibiothérapie et jusqu'au rétablissement complet
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Cholélithiase
Cholélithiase	Définition	Calculs biliaires. Formation de petites pierres faites de bile solidifiée. Peuvent provoquer des inflammations de la vésicule ou des voies biliaires.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter en l'absence de symptômes CIT jusqu'au rétablissement complet. si symptomatique et médication nécessaire
	MC	Comme CT / VT Aptitude à déterminer par le médecin
	Voir aussi	Cholécystite



Choléra	Définition	Infection sévère de l'intestin (avant tout de l'intestin grêle) par la bactérie <i>Vibrio cholerae</i> . Hautement contagieux. Infection transmise généralement par de l'eau potable souillée ou des aliments infectés (mauvaises conditions sanitaires !) Exsiccose et perte d'électrolytes sévères dues aux diarrhées et vomissements extrêmes Période d'incubation : 1-3 jours
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 3 mois après le rétablissement complet
	MC	Comme CT / VT

Choléra, contact	Définition	Contact avec une personne malade, séjour dans une zone endémique
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 1 semaine après contact avec une personne infectée ou retour d'une zone endémique
	MC	Comme CT / VT

Chorée de Huntington	Définition	Appelée aussi maladie de Huntington. Maladie neuro-dégénérative héréditaire incurable du cerveau accompagnée de troubles locomoteurs et psychiques. Evolution toujours progressive, à l'issue fatale au bout de 15 ans en moyenne.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID

Chute de cheveux	Se référer à	Alopécie
-------------------------	--------------	----------



Cirrhose	Définition	Prolifération du tissu conjonctif suite à une inflammation chronique qui conduit à un durcissement et à une contraction du tissu cicatriciel d'un organe ainsi qu'à la mort du tissu fonctionnel. Exemples : <ul style="list-style-type: none">• Cirrhose hépatique• Cirrhose rénale
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
Cirrhose néphrotique	Définition	Stade terminal de nombre de maladies du parenchyme rénal avec fibrose croissante et généralement perte fonctionnelle quasi totale.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
Claudication intermittente	Se référer à	Maladie vasculaire artérielle
CMV	Se référer à	Cytomégalovirus
Cocaïne	Se référer à	Drogue, usage de
Colique rénale	Définition	Crampes douloureuses dans la région lombaire ou le ventre, douleur forte à insupportable. Cause : trouble aigu du passage de l'urine dans les voies urinaires dû à un calcul rénal.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CI en cas de symptômes aigus
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Calculs rénaux



Colite	Définition	Inflammation aiguë ou chronique du gros intestin (infectieux / non infectieux / chronique / auto-immun)
	À noter	Toujours déterminer la cause
	Enregistrement	Ne pas accepter si inflammation chronique ou origine auto-immune
	CT / VT	CIT de 2 semaines après l'arrêt du traitement et jusqu'au rétablissement complet si la cause le permet Ne pas accepter si inflammation chronique ou origine auto-immune
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Maladie diarrhéique
Colite ulcéreuse	Définition	Maladie intestinale inflammatoire chronique, maladie auto-immune
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Voir aussi	Maladie auto-immune
Collapsus circulatoire	Se référer à	Perte de connaissance
Commotion cérébrale	Se référer à	Blessure à la tête, grave
Communication inter-auriculaire (CIA)	Se référer à	Maladie cardiaque
Comportement à risque, autre, B5	Définition	Consommation de drogues par voie intraveineuse il y a > 10 années
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter
	MC	Accepter



Comportement à risque, autre, B6	Définition	Rapports sexuels il y a > 12 mois avec un partenaire qui a consommé des drogues par voie intraveineuse au cours des dernières 10 années.
	À noter	Au moment du CT ou Medical CheckUp il faut informer le centre de transplantation en cas de MSM. La question sur MSM se pose au CT / MC
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter
	MC	Accepter
Comportement à risque, autre, B7	Définition	Séjour de > 6 mois dans des pays avec un risque élevé de SIDA / VIH il y a > 12 mois avec exposition potentiel au VIH (p.ex. rapports sexuels, intervention médicale / paramédicale comme tatouage, piercing) (voir Annexe Art. 7, Travelcheck)
	À noter	Au moment du CT ou Medical CheckUp il faut informer le centre de transplantation en cas de MSM. La question sur MSM se pose au CT / MC
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter
	MC	Accepter
Comportement à risque, autre, C5	Se référer à	Comportement à risque, autre, B5
Comportement à risque, autre, C6	Définition	Rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec un partenaire qui a consommé des drogues par voie intraveineuse au cours des dernières 10 années.
	À noter	Au moment du CT ou Medical CheckUp il faut informer le centre de transplantations en cas de MSM. La question sur MSM se pose au CT / MC
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 12 mois après le dernier rapport sexuel
	MC	Comme CT / VT



Comportement à risque, autre, C7	Définition	Séjour de > 6 mois dans des pays avec un risque élevé de SIDA / VIH au cours des derniers 12 mois (voir Annexe Art. 7, Travelcheck), avec exposition potentielle au virus VIH (p.ex. rapports sexuels, intervention médicale / paramédicale comme tatouage, piercing)
	À noter	Au moment du CT ou Medical CheckUp il faut informer le centre de transplantation en cas de MSM. La question sur MSM se pose au CT / MC
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter, si aucune exposition, autrement CIT de 12 mois après le retour
	MC	Comme CT / VT

Comportement à risque, autre, C8	Définition	Rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec un partenaire qui - au cours des 12 derniers mois - a reçu une transfusion sanguine dans un pays avec un risque élevé de SIDA / VIH, ou qui s'est exposé autrement au virus VIH (p.ex par contact sexuel, intervention médicale / paramédicale comme tatouage, piercing)
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 12 mois après transfusion / exposition VIH potentielle du partenaire ou le dernier contact sexuel avec ce partenaire
MC	Comme CT / VT	

Comportement à risque, autre, D5	Définition	Consommation de drogues par voie intraveineuse au cours des 10 dernières années
	Enregistrement	CIT de 10 ans après la dernière consommation
	CT / VT	CID
	MC	CID



Comportement à risque, autre, D6	Définition	Rapports sexuels avec un partenaire actuel qui a consommé des drogues par voie intraveineuse au cours des dernières 10 années
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
Comportement à risque, autre, D8	Définition	Rapports sexuels actuels avec partenaire qui - au cours des 12 derniers mois - a reçu une transfusion sanguine dans un pays avec un risque élevé de SIDA / VIH, ou qui s'est exposé autrement au virus VIH (p.ex. par contact sexuel, intervention médicale / paramédicale comme tatouage, piercing)
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CIT de 12 mois après la transfusion / l'exposition VIH potentielle du partenaire
	MC	Comme CT / VT
Comportement à risque, sexuel	Définition	Le risque de s'infecter avec une maladie transmissible par rapport sexuel peut augmenter selon le comportement sexuel
	À noter	Cette répartition en groupes à risque vaut tant pour les personnes en relations hétérosexuelles que en relations homosexuelles



Comportement à risque, sexuel et autre	Définition	Comportement avec lequel le donneur court le risque d'acquiescer une infection transmissible, qui pourrait être transmise au receveur par voie de la transplantation / du produit de cellules souches du sang > répartition en groupes à risque: A = risque standard B = Low Risk C = Intermediate Risk D = High Risk
	À noter	Tout d'abord il faut déterminer le groupe à risque du donneur: Voir DOK_269_Classification_Risk_Behaviour
Comportement à risque, sexuel, A	Définition	Rapports sexuels protégés ou non protégés dans une relation monogame, hétérosexuelle ou homosexuelle qui dure depuis > 4 mois : <ul style="list-style-type: none"> • pas de nouveau partenaire sexuel • 1 seul partenaire sexuel
	À noter	Au moment du CT ou Medical CheckUp il faut informer le centre de transplantation en cas de MSM. La question sur MSM se pose au CT / MC
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter
	MC	Accepter



Comportement à risque, sexuel, B1	Définition	Rapports sexuels avec un nouveau partenaire / au maximum 2 partenaires sexuels différents au cours des 4 derniers mois
	À noter	Au moment du CT ou Medical CheckUp il faut informer le centre de transplantation en cas de MSM. La question sur MSM se pose au CT / MC
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 1 mois après le premier contact sexuel avec le dernier / nouveau partenaire
	MC	CIT de 2 mois après le premier contact sexuel avec le dernier / nouveau partenaire

Comportement à risque, sexuel, B2	Définition	Rapports sexuels rémunérés (donneur paie ou est payé, services sexuels en échange d'argent, de drogues ou de médicaments) il y a > 12 mois
	À noter	Au moment du CT ou Medical CheckUp il faut informer le centre de transplantation en cas de MSM. La question sur MSM se pose au CT / MC
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter
	MC	Accepter

Comportement à risque, sexuel, B3	Définition	Rapports sexuels avec partenaire avec un comportement sexuel à risque Intermediate ou High, dernier contact il y a > 12 mois
	À noter	Au moment du CT ou Medical CheckUp il faut informer le centre de transplantation en cas de MSM. La question sur MSM se pose au CT / MC
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter
	MC	Accepter



Comportement à risque, sexuel, B4	Définition	Rapports sexuels avec partenaire ayant une maladie sexuellement transmissible (par ex. VIH, VHC, VHB), dernier contact il y a > 12 mois
	À noter	Au moment du CT ou Medical CheckUp il faut informer le centre de transplantation en cas de MSM. La question sur MSM se pose au CT / MC
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter
	MC	Accepter

Comportement à risque, sexuel, C1	Définition	Rapports sexuels avec au maximum 3 partenaires sexuels différents au cours des 4 derniers mois
	À noter	Au moment du CT ou Medical CheckUp il faut informer le centre de transplantation en cas de MSM. La question sur MSM se pose au CT / MC
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 3 mois après le premier contact sexuel avec le dernier nouveau partenaire
	MC	CIT de 4 mois après le premier contact sexuel avec le dernier nouveau partenaire

Comportement à risque, sexuel, C2	Définition	Rapports sexuels rémunérés (donneur paie ou est payé, services sexuels en échange d'argent, de drogues ou de médicaments) <u>une seule fois</u> au cours des derniers 12 mois
	À noter	Au moment du CT ou Medical CheckUp il faut informer le centre de transplantation en cas de MSM. La question sur MSM se pose au CT / MC
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 12 mois après le dernier contact sexuel rémunéré
	MC	Comme CT / VT



Comportement à risque, sexuel, C3

Définition	Rapports sexuels avec partenaire avec un comportement sexuel à risque Intermediale ou High, dernier contact au cours des derniers 12 mois
À noter	Au moment du CT ou Medical CheckUp il faut informer le centre de transplantation en cas de MSM. La question sur MSM se pose au CT / MC
Enregistrement	Accepter
CT / VT	CIT de 12 mois après le dernier contact sexuel
MC	Comme CT / VT

Comportement à risque, sexuel, C4

Définition	Rapports sexuels avec partenaire ayant une maladie sexuellement transmissible (par ex. VIH, VHC, VHB) au cours des 12 derniers mois
À noter	Au moment du CT ou Medical CheckUp il faut informer le centre de transplantation en cas de MSM. La question sur MSM se pose au CT / MC
Enregistrement	Accepter
CT / VT	CIT de 12 mois après le dernier contact sexuel
MC	Comme CT / VT
Voir aussi	Hépatite B, partenaire sexuel

Comportement à risque, sexuel, D1

Définition	Rapports sexuels avec plus de 3 partenaires sexuels différents au cours des 4 derniers mois
À noter	Au moment du CT ou Medical CheckUp il faut informer le centre de transplantation en cas de MSM. La question sur MSM se pose au CT / MC
Enregistrement	Accepter
CT / VT	CIT de 12 mois après le premier contact sexuel avec le dernier nouveau partenaire ou CID à cause de comportement sexuel à haut risque
MC	Comme CT / VT



Comportement à risque, sexuel, D2	Définition	Rapports sexuels rémunérés (donneur paie ou est payé, services sexuels en échange d'argent, de drogues ou de médicaments) ≥ 2 fois au cours des derniers 12 mois
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID

Comportement à risque, sexuel, D3	Définition	Rapports sexuels avec partenaire avec un comportement à risque High, actuellement
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CIT de 12 mois après le dernier contact sexuel (ou CID)
	MC	Comme CT / VT

Comportement à risque, sexuel, D4	Définition	Rapports sexuels avec partenaire ayant une maladie sexuellement transmissible (par ex. VIH, VHC, VHB), actuellement
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CIT de 12 mois après le dernier contact sexuel (ou CID)
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Hépatite B, partenaire sexuel



Concentrés de facteurs de la coagulation	Définition	Produits sanguins stables destinés à traiter les troubles de la coagulation : <ul style="list-style-type: none"> • Facteurs de coagulation issus du plasma • Facteurs de coagulation recombinants (fabriqués par génie génétique)
	Enregistrement	Accepter si la maladie de base le permet
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Hémophilie A et B Transfusion sanguine Trouble de la coagulation
Condylomata acuminata	Se référer à	Verrues génitales
Conisation cervicale	Se référer à	Carcinome du col utérin in situ
Conjonctivite	Définition	Inflammation de la conjonctive de l'œil
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 1 mois après rétablissement complet et de 2 semaines après arrêt de toute antibiothérapie systémique
	MC	Comme CT / VT
Contact avec du sang étranger	Définition	Contact avec du sang étranger par la peau, les muqueuses ou une blessure par piqûre d'aiguille
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 1 mois après l'évènement
	MC	CIT de 2 mois après l'évènement
	Voir aussi	Activités à risque Hépatite Situation à risque



Contraception hormonale	Définition	Contraception par des préparations à base d'œstrogènes et/ou de progestatifs.
	Enregistrement	Accepter sauf si statut après épisode thromboembolique ou autre risque thrombotique constitutionnel
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Thrombophilie

Contusion cérébrale	Se référer à	Blessure à la tête, grave
----------------------------	--------------	---------------------------

Convulsion	Définition	Contractions involontaires se manifestant par des mouvements convulsifs ou des spasmes musculaires
	Enregistrement	Ne pas accepter tant que la cause n'est pas établie Aptitude à déterminer par le médecin
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Alcool Crises psychogènes Epilepsie Hypoglycémie Tumeur cérébrale

Coqueluche	Définition	Infection causée par la bactérie Bordetella pertussis. Haute-ment contagieux. L'infection est plutôt connue comme maladie infantile, mais elle affecte également les adultes.
	Enregistrement	CIT de 1 mois après le rétablissement complet
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement

Coqueluche, contact	Se référer à	Maladie infantile, contact
----------------------------	--------------	----------------------------



Correction de la vision, opération	Définition	Correction de la myopie, de l'hypermétropie ou de l'astigmatisme
	Enregistrement	Accepter aussi en cas d'intervention au laser (LASIK / PRK / LASEK)
	CT / VT	CIT jusqu'au rétablissement complet.
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Opération_généralités_1
COVID-19	Se référer à	Infection des voies respiratoires supérieures
Craniopharyngiome	Définition	Tumeur dysontogénétique bénigne formée à partir de tissu résiduel dans l'hypophyse. Aussi tumeur de Erdheim.
	Enregistrement	Ne pas accepter même après ablation chirurgicale
	CT / VT	CID
	MC	CID
Creutzfeld-Jakob, maladie de, risque 7_séjour en Grande-Bretagne	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter
	MC	Accepter
Creutzfeldt-Jakob, maladie de, prouvée	Définition	Maladie déclarée ou suspicion d'atteinte
	Enregistrement	Ne pas accepter si: <ul style="list-style-type: none"> • Le donneur lui-même est affecté • Une personne apparentée au 1er degré est affectée
	CT / VT	CID si: <ul style="list-style-type: none"> • Le donneur lui-même est affecté • Une personne apparentée au 1er degré est affectée • ≥ 2 personnes dans la parenté étendue sont affectées
	MC	Comme CT / VT



Creutzfeldt-Jakob, maladie de, risque	Définition	Risque de transmission de prions / vCJD (variant Creutzfeld-Jacob Disease)
	À noter	Toujours poser question additionnelle: si oui, quoi et pour quelle raison ?
Creutzfeldt-Jakob, maladie de, risque 1_Greffe de tissu humain	Enregistrement	Ne pas accepter si: <ul style="list-style-type: none"> • greffe de la dure-mère • greffe à cause d'une maladie maligne, une hépatite virale ou une maladie auto-immune • le donneur a subi un traitement immunosuppresseur • le donneur a reçu une transplantation d'organes (maladie de base) Prendre en considération la raison pour la greffe!
	CT / VT	Comme enregistrement ; poser en sus la question s'il y a eu greffe de cornée, de sclère et d'un autre tissu oculaire → information à transmettre au centre de transplantation
	MC	Comme CT / VT, en sus → formulaire Risk acceptance à signer par le centre de transplantation
	Voir aussi	Transfusion sanguine
Creutzfeldt-Jakob, maladie de, risque 2_Transfusion sanguine	Se référer à	Transfusion sanguine
Creutzfeldt-Jakob, maladie de, risque 3_Opération du cerveau ou de la moelle épinière	Enregistrement	Ne pas accepter si la maladie de base nécessite un CIT Ne pas accepter si greffe de la dure-mère Trépanation de la calotte crânienne et opération d'une hernie discale sont acceptables
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Hernie discale/HD-opération



Creutzfeldt-Jakob, maladie de, risque 4_Greffe de tissu animal	Enregistrement	Ne pas accepter Seule exception: préparations d'origine bovine comme Bio-Oss®, Bio-Gide®, Cerabone®), en l'absence de maladie chronique ou d'infection récidivante
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Immunobiothérapie Implant osseux et tendineux
Creutzfeldt-Jakob, maladie de, risque 5_Traitement par des hormones de croissance avant le 1.1.1986	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
Creutzfeldt-Jakob, maladie de, risque 6_injections hormonales en raison de stérilité avant le 1.1.1986	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
Crises psychogènes	Définition	Modifications du comportement survenant brusquement
	Enregistrement	Déterminer la cause et la stabilité psychique
	CT / VT	Déterminer la cause et la stabilité psychique Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT
Curakne	Se référer à	Médicaments tératogènes



Curetage utérin	Définition	Curetage de la muqueuse utérine.
	Enregistrement	Accepter en l'absence de maladie maligne
	CT / VT	CID si maladie maligne Déterminer la durée de CIT en fonction du motif de l'intervention
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Avortement

Cystite	Se référer à	Infection urinaire
----------------	--------------	--------------------



Cytomégalovirus	Définition	Virus DNA de la famille des herpesvirus, aussi nommé cytomégalovirus humain (CMV), Human herpesvirus 5 (HHV5). Répartition mondiale, haute prévalence. Transmission par toutes les sécrétions corporelles: salive, sang, sperme, larmes, lait maternel, sécrétions du vagin et du col de l'utérus. L'infection se passe le plus souvent inaperçue chez les personnes immunocompétentes, pour les personnes sous immunosuppresseurs, une infection à CMV est dangereuse et peut avoir une issue fatale.
	À noter	Pour ce qui est de la marche à suivre avec le tableau ci-dessous, les résultats IgM limites sont à considérer comme négatifs au moment du CT / VT et comme positifs au moment du MC.
	Enregistrement	Accepter



CT / VT

Les résultats de la sérologie et la symptomatologie sont déterminants pour l'aptitude.

Donneur asymptomatique:

IgM	IgG	Interpretazione	Procedere
neg	neg	Aucune infection aiguë ou ancienne; aucune immunité	Accepter
neg	pos	Infection ancienne	Accepter
pos	pos	Infection aiguë / réactivation / IgM persistantes	Accepter Tests IgG, IgM et NAT à faire lors du MC
pos	neg	Infection très précoce et aiguë / IgM faussement positives	Accepter Tests IgG, IgM et NAT à faire lors du MC

Donneur symptomatique:

IgM	IgG	Interpretazione	Procedere
neg	neg	Diagnostic trop tôt / autre cause / immuno-incompétence	Accepter après exclusion d'autres causes pertinentes et rétablissement complet
neg	pos	Infection ancienne, ev. autre cause pour les symptômes actuels	
pos	pos	Infection aiguë / réactivation / IgM persistantes	CIT de 1 mois Tests IgG, IgM et NAT à faire lors du MC
pos	neg	Infection très précoce et aiguë / IgM faussement positives	Après exclusion d'autres causes déterminantes, CIT de 3 mois Tests IgG, IgM et NAT à faire lors du MC

MC

Comme CT / VT

Informez immédiatement le centre de transplantation, s'il y a un changement de la sérologie entre CT / VT et MC (sérologie devient positive).

En cas de résultat négatif au test NAT, la CIT peut être raccourcie d'accord avec le centre de transplantation.



Décollement de la rétine	Définition	Décollement partiel ou total de la rétine de l'épithélium, qui assure l'approvisionnement de la rétine en oxygène et nutriments
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID

Déficit en alpha-1-antitrypsine (A1AT)	Définition	<p>Maladie héréditaire autosomale récessive. Maladie métabolique caractérisée par une sécrétion réduite d'alpha-1-antitrypsine (inhibiteur de la protéase, inhibe différentes enzymes libérées lors de processus inflammatoires -> protéolyse incontrôlée).</p> <p>Effets surtout sur le foie et les poumons.</p> <p>Foie : sécrétion d'alpha-1-antitrypsine diminuée, accumulation dans les cellules hépatiques -> dommages aux cellules -> cirrhose (jusqu'à 40%) et défaillance hépatique (env. 15%)</p> <p>Poumons : Destruction de l'interstice pulmonaire par élastase leucocytaire incontrôlée -> emphysème pulmonaire progressif</p>
	Enregistrement	<p>Accepter si</p> <ul style="list-style-type: none"> Absence de symptôme dans le foie et les poumons Statut de porteur asymptomatique
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement



Déficit en biotidase	Définition	Maladie métabolique génétique rare à transmission autosomique récessive, due à un défaut de la biotidase menant à une carence en biotine. Peut se traiter avec une thérapie de substitution à vie à base de biotine pour autant que le diagnostic soit posé précocement (screening du nouveau-né).
	Enregistrement	Accepter <ul style="list-style-type: none"> • si le diagnostic a été posé • que le donneur reçoit une thérapie de substitution à la biotine et • qu'il ne présente aucune séquelle d'un traitement inadapté
	CT / VT	Comme enregistrement Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT

Déficit en facteur V, congénital	Définition	Parahémophilie, Syndrome d'Owren. Maladie de la coagulation extrêmement rare, à transmission autosomique récessive, conduisant à l'hémophilie (à ne pas confondre avec la mutation du facteur V Leiden)
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID

Déficit en glucose-6-phosphate-déshydrogénase (G6PD)	Définition	Déficit d'origine génétique de l'enzyme glucose-6-phosphate déshydrogénase -> tendance accrue à la destruction des érythrocytes -> anémie hémolytique de gravité variable.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID



Déficit en IgA	Définition	Déficit immunitaire primitif le plus répandu. Bien que la plupart des sujets déficients en IgA soient asymptomatiques, certains d'entre eux ont une prévalence plus élevée d'infections respiratoires récurrentes et de maladies auto-immunes. Les taux d'IgG et d'IgM sont normaux. Déficit partiel en IgA: taux d'IgA inférieur au taux normal pour l'âge concerné Déficit complet en IgA: IgA < 0.05 g/l
	Enregistrement	Ne pas accepter. Sinon, le receveur se verrait transmettre un système immunitaire potentiellement pathologique.
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Déficit en immunoglobulines

Déficit en immunoglobulines	Définition	Concentration réduite d'une classe d'immunoglobulines dans le sang. La classe la plus fréquemment concernée est celle des IgA.
	Enregistrement	Ne pas accepter, car le receveur se verrait sinon transmettre un système immunitaire potentiellement malade.
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Déficit en IgA Immunodéficience commune variable, IDCV



Dengue, infection	Définition	Maladie déclarée ou confirmée (Test NAT positif)
	À noter	Demander si forme hémorragique de la fièvre Dengue !
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 4 mois après le diagnostique ou le début de symptômes (risque pour le patient) Informer le centre de transplantation du résultat positif de la NAT / de la maladie. Lors d'un cas très urgent, le centre de transplantation peut décider de raccourcir la durée du CIT, en acceptant le risque, si le donneur est asymptomatique - > voir "Dengue, risque de"
	MC	Comme CT / VT
Voir aussi	Fièvre hémorragique virale (FHV)	



Dengue, risque de	Définition	Séjour dans une région endémique de la dengue (voir Annexe Art. 7, Travelcheck)
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	<p>Si de retour depuis > 4 mois, avec ou sans symptômes</p> <ul style="list-style-type: none">• accepter• sans CIT• sans test <p>Si de retour depuis < 4 mois, sans symptômes</p> <ul style="list-style-type: none">• accepter• sans CIT• sans test <p>Si de retour depuis < 4 mois, avec symptômes:</p> <ul style="list-style-type: none">• accepter pour CT / VT• tester avec NAT, au plus tôt 5 jours après le retour ! <p>Si NAT négative et donneur asymptomatique: accepter. Si symptômes résiduels : aptitude à déterminer par le médecin</p> <p>Si NAT positive: CIT de 4 mois après le retour ou début de symptômes (risque pour le patient).</p> <p>Informez le centre de transplantation d'un résultat positif de la NAT. Le transplantateur peut décider de raccourcir la durée du CIT en acceptant le risque ? dans ce cas:</p> <ul style="list-style-type: none">• CIT de 3 semaines (au minimum), puis répéter la NAT• Si NAT négative: Accepter• Si NAT positive: CIT d' encore 3 semaines et répéter la NAT



MC

Si de retour depuis **> 4 mois**, avec ou sans symptômes
 • accepter
 • sans CIT
 • sans test

Si de retour depuis **< 4 mois**, avec ou sans symptômes:
 • tester avec PCR, **au plus tôt 5 jour après le retour, sans exceptions !**
 • les IgG et IgM peuvent être analysés sur demande

Si PCR **négatif et donneur asymptomatique**: accepter
 Si PCR **positif**: CIT de 4 mois après le retour ou début de symptômes
 (risque pour le patient).

Informez le centre de transplantation d'un résultat positif, le transplantateur peut décider de raccourcir la durée du CIT en acceptant le risque. Dans ce cas:
 • CIT de 3 semaines (au minimum)
 • puis répéter le PCR
 • si PCR **négatif** -> répéter de nouveau le PCR après une semaine et **accepter si PCR 2 fois négatif**
 • si PCR **positif**: CIT d' encore 3 semaines et répéter le PCR

Voir aussi

Fièvre hémorragique virale, contact
 Liste des pays

Dépression

À noter

Toujours déterminer l'état et la résistance psychiques

Enregistrement

Accepter si :

- Pas plus de 2 médicaments
- Pas de thérapie au lithium et
- Stabilité psychique

CT / VT

Aptitude à déterminer par le médecin

MC

Aptitude à déterminer par le médecin



Dérivation ventriculo-péritonéale (DVP)	Définition	Dérivation VC / VP. Dérivation (par cathéter / drain) permanente du liquide cérébro-spinal des ventricules du cerveau vers le péritoine abdominal (DVP) ou vers l'oreillette cardiaque droite (atrium, DVC) en cas d'hydrocéphalie ou d'hypertension intracrânienne (primaire ou secondaire).
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID

Dermatite	Définition	Inflammation de la peau. Déterminer la cause (infection, allergie, eczéma, etc.).
	Enregistrement	Accepter si le sujet ne prend pas de traitement systémique
	CT / VT	Accepter si le sujet ne prend pas de traitement systémique et n'est pas touché aux points de ponction
	MC	Comme CT / VT

Désensibilisation	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Immunobiothérapie

Désir d'enfant	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	La donneuse doit être informée qu'il est déconseillé aux femmes de tomber enceintes au moins pendant les deux premiers mois suivant un don de cellules souches du sang. Pour le bien des patients (solicitation éventuelle de dons subséquents), il serait souhaitable de prolonger cette période d'attente (4-6 mois).
	MC	Comme CT / VT



Diabète insipide	Définition	Carence hormonale congénitale ou acquise (déficit ou action insuffisante de l'hormone antidiurétique ADH).
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
Diabète sucré	Définition	Distinction entre diabète de type 1 / diabète de type 2 / diabète gestationnel.
	Enregistrement	Accepter si le sujet est sous traitement diététique avec ou sans antidiabétiques oraux, bien suivi et en bonne santé par ailleurs Accepter si diabète gestationnel et si la femme n'est plus insulino dépendante après l'accouchement Ne pas accepter en cas de diabète de type 1 Ne pas accepter si traitement insulinique
	CT / VT	Comme enregistrement Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT
Diathèse hémorragique, troubles acquis	Définition	En font partie : <ul style="list-style-type: none"> • Déficit en vitamine K (fonctionnel en cas de thérapie avec des antagonistes de la vitamine K, trouble de la synthèse en cas d'insuffisance hépatique, mauvaise absorption, cholestase) • Immunocoagulopathie (hémophilies acquises, auto-anticorps contre les facteurs de coagulation) • Coagulopathie intravasculaire disséminée (CID) • Hyperfibrinolyse systémique (p. ex. lors de malignomes, d'opérations des poumons et de la prostate, de thrombolyse)
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID



Diathèse hémorragique, troubles congénitaux	Définition	Troubles congénitaux se caractérisant par un déficit en facteurs de coagulation. Voici les plus fréquents : <ul style="list-style-type: none">• Hémophilie A : déficit en facteur VIII• Hémophilie B : déficit en facteur XI• Syndrome de von Willebrand-Jürgens : déficit ou défaut de structure du facteur de von Willebrand (fvW)
	Voir aussi	Hémophilie A et B Syndrome de von Willebrand
Diphthérie	Définition	Maladie infectieuse aiguë contagieuse ; infection des voies respiratoires supérieures par le <i>Corynebacterium diphtheriae</i> .
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 1 mois après le rétablissement complet
	MC	Comme CT / VT
Diverticulite	Définition	Apparition accrue de diverticules dans le côlon, avant tout le côlon sigmoïde.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 3 mois après l'arrêt du traitement
	MC	Comme CT / VT
Diverticulose	Définition	Apparition accrue de diverticules dans le côlon, avant tout le côlon sigmoïde. Généralement asymptomatique, les symptômes ne survenant qu'avec la diverticulite.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CI en cas de symptômes
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Diverticulite



Don de sang, en général	À noter	<p>Il faut renoncer à un don de sang avant un don de cellules souches du sang (en particulier don de moelle osseuse).</p> <p>Après un don de cellules souches du sang, il faut attendre un an avant de redonner son sang.</p>
Douleurs chroniques	Définition	Définitions hétérogènes; définies à l'occasion comme des douleurs continues ou récidivantes pendant plus de six mois, souvent associées à des situations de surcharge psychique
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
Drépanocytose	Se référer à	Anémie falciforme
Drogue, usage de	Définition	<p>Drogue = substance / composé chimique, biochimique ou naturel, ayant un effet sur le système nerveux central (perception, sentiments, émotions, motricité) et capable d'altérer la conscience. En font partie l'alcool, le cannabis (marihuana), la cocaïne, l'héroïne, des médicaments, Ecstasy, les amphétamines, certaines substances inhalées, des hallucinogènes.</p> <p>Le cannabidiol (CBD), un des principaux cannabinoïdes, est autorisé en Suisse et peut être acquis sans prescription. La cause et la régularité de la consommation sont toujours à vérifier.</p>
Drogues, consommation par voie intra-veineuse	Définition	Consommation de drogues par voie intra-veineuse sans prescription médicale.
	Enregistrement	Accepter si: <ul style="list-style-type: none"> consommation il y a > 10 ans
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Comportement à risque, sexuel et autre



Drogues, consommation par voie orale ou par inhalation	À noter	Ne pas accepter en cas de dépendance, c'est-à-dire si l'on doute de l'aptitude du donneur à suspendre la prise des substances pendant au moins deux semaines.
	Enregistrement	Accepter s'il s'agit de produits à base de cannabis et que rien ne laisse supposer que le donneur ne suivra pas les consignes fixées Ne pas accepter si consommation régulière de drogues (plusieurs fois par semaine)
	CT / VT	Ne pas accepter si: <ul style="list-style-type: none">• consommation actuelle régulière (plusieurs fois par semaine) exception : accepter s'il s'agit de produits à base de cannabis et que rien ne laisse supposer que le donneur ne suivra pas les consignes fixées• la responsabilité du donneur est diminuée/discutable à cause de la consommation (consentement informé)• le donneur est dans un procès de sevrage (p.ex. Antabus) Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Traitement de substitution aux opiacés



Dry needling	Définition	Appelé aussi «trigger point dry needling», complément de la thérapie manuelle des points de contracture. Destiné à des personnes souffrant de douleurs myofasciales chroniques ou aiguës. Le traitement est administré par un médecin, un naturopathe ou un physiothérapeute ayant suivi la formation appropriée (en Suisse).
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter <ul style="list-style-type: none">• Si le Dry Needling a été pratiqué en Suisse• S'il ne fait aucun doute que les méthodes de travail respectent toutes les consignes de stérilité et que les aiguilles utilisées sont à usage unique• S'il n'existe aucun signe d'infection (bactérienne) CIT de 1 mois si le Dry Needling a été pratiqué dans un pays affichant un risque accru d'infection
	MC	Accepter 48 heures après le traitement <ul style="list-style-type: none">• Si le Dry Needling a été pratiqué en Suisse• S'il ne fait aucun doute que les méthodes de travail respectent toutes les consignes de stérilité et que les aiguilles utilisées sont à usage unique• S'il n'existe aucun signe d'infection (bactérienne) CIT de 2 mois après le traitement si le Dry Needling a été pratiqué dans un pays affichant un risque accru d'infection
Duodart	Se référer à	Médicaments tératogènes
Dure-mère	Se référer à	Creutzfeldt-Jakob, maladie de, risque 1_Greffe de tissu humain
Dutastéride	Se référer à	Médicaments tératogènes



Dysplasie cervicale	Définition	Stade antérieur du carcinome du col utérin in situ
	Enregistrement	Accepter si donneuse sous contrôle régulier
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Carcinome du col utérin in situ

Dysplasie fibromusculaire	Définition	Prolifération non inflammatoire du tissu conjonctif et de la musculature lisse dans la paroi des artères. Apparaît généralement chez les femmes jeunes avec tous les symptômes d'une sténose des artères. Souvent touchées : artère rénale > hypertension, artère carotide interne > symptômes neurologiques.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID

Dystrophie musculaire	Définition	Groupe de maladies musculaires génétiques causées par des protéines défectueuses ou manquantes dans la musculature (p. ex. la dystrophine). Cela provoque une faiblesse musculaire et une atrophie musculaire.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Voir aussi	Handicap physique

Ebola	Se référer à	Fièvre hémorragique virale (FHV)
--------------	--------------	----------------------------------



Echinococcose	Définition	Infection par un ténia de la famille des échinocoques (parasite intestinal, p. ex. ténia du renard ou ténia du chien). L'être humain est alors un hôte intermédiaire accidentel. Voie de transmission de l'infection : absorption orale d'œufs par contact avec des renards, des chiens, des chats ou ingestion de fruits ou légumes contaminés par des excréments.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID

Eczéma	Définition	Maladie dermatologique inflammatoire / réaction inflammatoire non infectieuse de la peau. Différents agents déclencheurs. Principaux groupes : <ul style="list-style-type: none">• Eczéma atopique• Eczéma allergique de contact• Eczéma de contact toxique
	Enregistrement	Accepter si <ul style="list-style-type: none">• Les sites de ponction sont dépourvus de lésions• Le traitement local est suffisant
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Allergie Dermatite

Embolie pulmonaire	Définition	Obstruction d'un vaisseau sanguin du poumon. Déclenchée dans 80% des cas par un thrombus dans une veine profonde de la jambe ou du bassin.
	À noter	Risque de thrombose accru par les G-CSF
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID



Emphysème	Se référer à	Emphysème pulmonaire
Emphysème pulmonaire	Définition	Surdistension irréversible des alvéoles pulmonaires. Conséquence de différentes maladies pulmonaires chroniques.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Voir aussi	BPCO
Encéphalite	Définition	Inflammation de l'encéphale. Généralement d'origine infectieuse due presque toujours à des virus, plus rarement à des bactéries, des protozoaires ou des mycoses.
	À noter	Toujours demander si présence de complications tardives comme des convulsions ou l'épilepsie, des céphalées chroniques ou d'autres symptômes !
	Enregistrement	Accepter si <ul style="list-style-type: none"> • Aucune séquelle • L'agent pathogène ne constitue pas un motif d'exclusion CIT de 12 mois après rétablissement complet Aptitude à déterminer par le médecin
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Méningite



Endocardite	Définition	Inflammation de l'endocarde (paroi interne du cœur), affectant souvent les valves cardiaques. Non infectieux ou infectieux (bactérien : aigu / subaigu / viral / fongique).
	Enregistrement	Accepter si <ul style="list-style-type: none">• évolution sans complication• guérison complète• aucun trouble cardiaque fonctionnel• aucune prophylaxie de l'endocardite requise
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement

Endométriose	Définition	Maladie bénigne fréquente caractérisée par la présence de tissu utérin hors de l'utérus (généralement dans le péritoine ; les ovaires sont souvent touchés).
	À noter	Demander la localisation et les symptômes
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CI si symptômes Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT

Endoscopie	Définition	Gastro- ou colonoscopie par moyen d'un endoscope souple. Risque de transmission de VHB ou VHC.
	Enregistrement	Accepter si sans pathologie
	CT / VT	Accepter s'il n'y a pas eu de complications ou de résultat pathologique. Autrement CIT appropriée CIT de 1 mois après l'intervention
	MC	Accepter s'il n'y a pas eu de complications ou de résultat pathologique. Autrement CIT appropriée CIT de 2 mois après l'intervention



Epilepsie	Définition	Affection neurologique avec des épisodes de convulsions, déclenchés par une soudaine décharge électrique anormale dans certaines zones cérébrales. Il existe des formes idiopathiques (aucune cause décelée) ou secondaires/symptomatologiques (cause identifiable, p.ex. traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral, tumeur). Grand mal: crise tonico-clonique Petit mal: absence épileptique, altération et/ou atténuation de la conscience de courte durée.
	Enregistrement	Accepter si: <ul style="list-style-type: none"> le traitement d'antiépileptiques est arrêté depuis au moins 3 ans et aucune crise ne s'est manifestée depuis l'arrêt du traitement Ne pas accepter si traitement d'anti-épileptiques en cours
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
Erivedge	Se référer à	Médicaments tératogènes
Erysipèle	Définition	Infection bactérienne des couches supérieures de la peau et des voies lymphatiques, appelé aussi érysipèle. Forte rougeur très limitée. Causé généralement par des streptocoques β -hémolytants du groupe A, plus rarement par d'autres agents comme le Staphylococcus aureus ou le Klebsiella pneumoniae. La porte d'entrée est souvent une petite lésion de la peau.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 1 mois après arrêt de l'antibiothérapie et rétablissement complet
	MC	Comme CT / VT
Erythème infectieux aigu	Définition	Maladie infectieuse contagieuse causée par un parvovirus et à l'évolution souvent asymptomatique. Seule une partie des personnes infectées présentent l'éruption cutanée caractéristique.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 1 mois après rétablissement
	MC	Comme CT / VT



Essais cliniques	Définition	Participation à un essai clinique visant à trouver une réponse à une question médico-scientifique et à améliorer le traitement médical.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Aptitude à déterminer par le médecin
Évanouissement	Se référer à	Perte de connaissance
Exsudat cotonneux	Définition	Modifications blanchâtres de forme cotonneuse de la rétine liées à des maladies oculaires (p. ex. occlusion de la veine centrale de la rétine) ou des maladies générales (p. ex. diabète sucré, hypertension, collagénose, VIH). Cause : obstruction capillaire de la rétine, signes d'infarctus des fibres nerveuses.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
Extraction dentaire	Se référer à	Opération petite_2
Fausse couche	Se référer à	Avortement
Fibromyalgie (syndrome)	Définition	Maladie douloureuse chronique non inflammatoire de l'appareil locomoteur d'étiologie inconnue. Incertitude quant à l'origine auto-immune.
	Enregistrement	Ne pas accepter (problèmes psychiques dus à la persistance des troubles / aux douleurs chroniques)
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Voir aussi	Maladie auto-immune
Fibrose kystique	Se référer à	Mucoviscidose



Fièvre de Pfeiffer	Se référer à	Mononucléose infectieuse
Fièvre des trois jours, contact	Se référer à	Maladie infantile, contact
Fièvre hémorragique virale (FHV)	Définition	Fièvres infectieuses accompagnées d'hémorragies. Dues généralement à des infections virales, souvent hautement infectieuses, généralement sévères à fatales. Soumises à l'obligation d'annoncer. Surviennent avant tout en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. Les fièvres virales hémorragiques à l'issue fatale surviennent très rarement en Europe centrale et en Amérique du Nord. En font notamment partie la fièvre de Lassa, la fièvre hémorragique de Crimée-Congo (CCHF), la maladie à virus Ebola, la fièvre de Marburg, la fièvre Dengue (forme hémorragique).
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
Fièvre hémorragique virale, contact	Définition	Durée d'incubation de 2-21 jours, généralement 7-10 jours
	Enregistrement	CIT de 6 mois après retour d'une zone endémique / contact avec une personne malade et après réalisation des éventuels examens requis
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Liste des pays



Fièvre jaune	Définition	Maladie infectieuse causée par le virus de la fièvre jaune (virus RNA de la famille des flavavirus). Présence dans les zones tropicales et subtropicales d'Amérique du Sud et d'Afrique, transmission par les moustiques. Durée d'incubation : 3-6 jours. Dans les cas graves, issue fatale possible. Vaccination efficace.
	Enregistrement	CIT de 3 mois après rétablissement complet
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement

Fièvre jaune, contact	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 1 mois après contact
	MC	Comme CT / VT

Fièvre méditerranéenne familiale	Définition	Polysérosite familiale récurrente. Maladie génétique se manifestant par des poussées de fièvre récurrentes, accompagnés d'une inflammation très douloureuse des séreuses (péritonite, pleurésie, synovite). Les patients touchés sont souvent originaires de la Méditerranée orientale
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement

Fièvre Q	Définition	Zoonose causée par la bactérie <i>Coxiella burnetii</i> présentant le tableau clinique d'une pneumonie.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID



Fièvre récurrente	Définition	Maladie infectieuse bactérienne causée par les <i>Borrelia</i> de la fièvre récurrente et qui se caractérise par des poussées de fièvre répétées, d'où le nom de fièvre récurrente.
	Enregistrement	Accepter 2 ans après rétablissement complet sans séquelle
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement

Fièvre rhumatismale	Définition	Maladie réactionnelle après une infection aux streptocoques du groupe A (classification de Lancefield). Entre une et trois semaines après une infection, différents organes présentent une inflammation abactérienne.
	Enregistrement	Accepter si : <ul style="list-style-type: none">• Rétablissement complet• Episode unique• Aucune maladie cardiaque résiduelle• Aucune maladie rénale résiduelle Aptitude à déterminer par le médecin
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement

Fièvre typhoïde/paratyphoïde	Définition	La fièvre typhoïde / paratyphoïde est une maladie infectieuse systémique soumise à l'obligation d'annoncer, causée par la bactérie <i>Salmonella typhi</i> ou paratyphi.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 1 semaine après la fin du traitement et le rétablissement complet
	MC	Comme CT / VT



Filariose	Définition	Infection par les nématodes filaires (vers parasites en forme de fils). Se manifeste selon leur type dans le système lymphatique ou dans les tissus conjonctifs superficiels ou profonds. Transmission des larves des vers filaires par des insectes hématophages avant tout dans les pays tropicaux.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
Finacopil	Se référer à	Médicaments tératogènes
Finastéride	Se référer à	Médicaments tératogènes
Fissure anale	Définition	Déchirure douloureuse de la peau ou de la muqueuse de l'anus, peut être aiguë ou chronique.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CI en cas d'inflammation floride
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Opération petite_2 Proctite
Folliculite	Définition	Inflammation des follicules pileux. On distingue les formes infectieuses des formes non infectieuses. La folliculite infectieuse est généralement d'origine bactérienne mais peut aussi être provoquée par d'autres agents (virus, champignons ou parasites).
	Enregistrement	Accepter en cas de symptômes légers si: <ul style="list-style-type: none">inflammation circonscrite localementseul un traitement local est nécessaire Ne pas accepter en cas d'immunodéficience ou d'alopécie cicatricielle chronique
	CT / VT	Comme enregistrement Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT



Foramen ovale	Se référer à	Maladie cardiaque
Fracture osseuse	Définition	Fracture
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CI à évaluer selon la situation après traitement chirurgical CIT de 1 mois après l'ablation du plâtre En cas de fracture du fémur, du bassin, du sacrum ou de vertèbres : évent. seul don de cellules souches périphériques possible, aptitude au don à déterminer par le médecin Aptitude à déterminer par le médecin en cas de traitement préventif avec des anticoagulants
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Opération grande_4 Opération moyenne_3 Opération petite_2
Furoncle	Se référer à	Abcès
Gammopathie monoclonale de signification indéterminée (GMSI)	Définition	Quantité anormale d'une immunoglobuline monoclonale (paraprotéine) dans le sang. Peut être la phase préliminaire d'un syndrome lymphoprolifératif malin, p. ex. d'un myélome multiple, de la maladie de Waldenström ou d'une amylose. Progression probable d'env. 1-1,5% par année
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
Gastrectomie	Se référer à	Opération grande_4



Gastrite	Définition	Inflammation de l'estomac. Aiguë/chronique, divers types Type A : maladie auto-immune avec anticorps contre les cellules pariétales. Peut provoquer une carence en vitamine B12 par la destruction des cellules pariétales ->facteur intrinsèque diminué -> résorption réduite de la vitamine B12 -> anémie pernicieuse Type B : infection bactérienne, agent : Helicobacter pylori Type C : cause chimique (bile, médicaments comme les anti-rhumatismaux non stéroïdiens, le diclofénac, l'ibuprofène), antibiotiques Thérapie : antiacides (inhibiteurs de l'acide gastrique)
	Enregistrement	Accepter si douleurs épigastriques légères pouvant être soulagés par les antiacides Ne pas accepter : <ul style="list-style-type: none"> • Type A avec ou sans carence en vitamine B12 • Si les antiacides ne soulagent pas la gastrite
	CT / VT	Accepter en l'absence de symptômes sous antiacides CIT de 2 semaines après arrêt de l'antibiothérapie et jusqu'au rétablissement complet en cas de gastrite aiguë CID en cas de type A
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Ulcère gastrique / Ulcère duodénal
	<hr/>	
Gastroentérite	Se référer à	Maladie diarrhéique
<hr/>		
Gastroentérite, contact	Se référer à	Maladie diarrhéique, contact
<hr/>		
Glaucome	Définition	Maladie ophtalmologique pouvant conduire à une perte de fibres nerveuses et, dans les cas extrêmes, à la cécité. Causes multiples, souvent lié à une pression intraoculaire élevée.
	Enregistrement	Ne pas accepter même après opération
	CT / VT	CID
	MC	CID



Glomérulonéphrite	Définition	Inflammation des deux reins qui touche en premier lieu les glomérules. Causes multiples, notamment processus auto-immuns, infections, maladies métaboliques, médicaments. Peut conduire à une insuffisance rénale sévère.
	À noter	Toujours déterminer la cause
	Enregistrement	CIT de 5 ans après rétablissement complet si la cause déclenchante le permet et en l'absence de dysfonctionnement rénal Ne pas accepter si : <ul style="list-style-type: none">• associé à une maladie auto-immune• glomérulonéphrite chronique ou secondaire
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement

Goitre	Se référer à	Maladie thyroïdienne
---------------	--------------	----------------------

Gonorrhée	Définition	Blenorragie. Infection bactérienne des organes génito-urinaires, due au gonocoque (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>). Maladie cosmopolite, survenant uniquement chez l'homme, transmissible par voie sexuelle.
	Enregistrement	CIT de 12 mois après la fin du traitement du patient et de son partenaire sexuel
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement



Goutte	Définition	Troubles du métabolisme des purines, évolution par poussée. Le dépôt de cristaux d'acide urique dans les articulations (et tissus) périphériques provoque de l'arthrite (urique). Concerne souvent l'articulation du gros orteil = podagre. Aigu (crise de goutte) / chronique Insuffisance rénale possible suite à une lésion des reins de longue durée.
	À noter	La crise de goutte pourrait être déclenchée par les G-CSF.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	Accepter si la maladie a été stabilisée et qu'elle est bien contrôlée Seul prélèvement de moelle osseuse possible Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT

Grefe de la cornée	Définition	Grefe de la cornée, risque de transmission de prions, maladie de Creutzfeldt-Jakob
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Comme enregistrement , information au centre de transplantation
	MC	Comme enregistrement , acceptation du risque par le centre de transplantation
	Voir aussi	Creutzfeldt-Jakob, maladie de, risque 1_Grefe de tissu humain

Grippe	Se référer à	Infection des voies respiratoires supérieures
---------------	--------------	---

Grippe, contact	Définition	Influenza
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter
	MC	Aptitude à déterminer par le médecin



Grossesse	Enregistrement	CIT pendant toute la grossesse et jusqu'à 12 mois après l'accouchement.
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Avortement

Handicap physique	Définition	Limitation physique, y compris cécité et surdité.
	Enregistrement	Accepter si : <ul style="list-style-type: none">• Le prélèvement est réalisable• Le consentement éclairé est possible• Le donneur ne présente pas de risque accru de thrombose Au moment où le donneur remplit le questionnaire médical et la déclaration de consentement, il faut s'assurer qu'il est à même de répondre librement aux questions.
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Paraplégie / Tétraplégie

Handicap visuel	Se référer à	Handicap physique
------------------------	--------------	-------------------

Haschich	Se référer à	Drogue, usage de
-----------------	--------------	------------------



Helminthiase	Définition	Maladie causée par des vers parasites.
	Enregistrement	Ne pas accepter Exceptions : CIT jusqu'au rétablissement complet et arrêt du traitement en cas d'infection non compliquée causée par : <ul style="list-style-type: none">• Des ascarides (ascaris)• Des oxyures (Enterobius vermicularis)• Le ténia inerme (Taenia saginata)• Le ténia solitaire (Taenia solium)
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Echinococcose

Hémangiome	Définition	Tumeur bénigne des des vaisseaux sanguins. Apparaît généralement sur la peau ou dans le foie mais peut aussi se former dans tout l'organisme.
	Enregistrement	Accepter si: <ul style="list-style-type: none">• cas asymptomatique• tumeur de taille stable• tumeur isolée Sinon aptitude à déterminer par le médecin
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme CT / VT



Hémochromatose	Définition	Hémosidérose. <ul style="list-style-type: none">maladie génétique à transmission autosomique récessive : absorption accrue de fer dans la partie supérieure de l'intestin grêle entraînant un dommage organique dû aux dépôts de fer.secondaire / acquis (p. ex. par un grand nombre de transfusions sanguines, une hémolyse sur le long terme)
	Enregistrement	Accepter si prédisposition génétique sans dommage organique final et si traitement adéquat
	CT / VT	Accepter en l'absence de tout signe de dommage organique (cœur, foie, pancréas), sinon CID
	MC	Comme CT / VT
Hémoglobinopathie	Définition	Maladie due à un trouble de la formation de l'hémoglobine d'origine génétique. Importance clinique variable, selon l'hérédité, la dominance (caractère hétérozygote/homozygote) et la localisation du défaut.
	À noter	L'évaluation définitive de l'aptitude au don est déterminée par le médecin, en informer le centre de transplantation
	Voir aussi	Anémie falciforme Thalassémie
Hémophilie A et B	Définition	Maladie héréditaire récessive liée au chromosome X , touche davantage les hommes. Hémophilie A : déficit en facteur VIII Hémophilie B : déficit en facteur IX
	Enregistrement	Ne pas accepter Les femmes porteuses du défaut peuvent être acceptées. En informer le centre de transplantation
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement



Hémorragie cérébrale liée à un accident	Définition	Hémorragie cérébrale (traumatique) causée par un accident, p.ex. : <ul style="list-style-type: none"> • hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique • hémorragie épidurale traumatique • hémorragie sous-durale traumatique
	Enregistrement	CIT jusqu'au rétablissement complet Ne pas accepter tant que dure la prophylaxie de l'épilepsie et en cas de séquelles neurologiques tardives
	CT / VT	Comme enregistrement Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Creutzfeldt-Jakob, maladie de, risque 3_Opération du cerveau ou de la moelle épinière Epilepsie Opération grande_4 Opération moyenne_3
Hémorragie cérébrale non liée à un accident	Se référer à	Maladie cérébrovasculaire
Hémorroïdes	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CI en cas de saignement fort
	MC	Comme CT / VT
Hémorroïdes, cure chirurgicale	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 1 mois après l'intervention
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Opération petite_2



Hépatite	Définition	Inflammation du foie, non infectieuse/infectieuse, aiguë/chronique, causes nombreuses.
	Enregistrement	Ne pas accepter si la cause est inconnue
	CT / VT	Accepter s'il s'agit d'une hépatite opportuniste en présence d'une infection virale, et ce après guérison complète et normalisation des valeurs hépatiques
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Hépatite A Hépatite B, aiguë Hépatite C Hépatite E Herpès labial Mononucléose infectieuse Syndrome pieds-mains-bouche

Hépatite A	Définition	Infection par le virus de l'hépatite A
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 3 mois après le rétablissement complet
	MC	CIT de 4 mois après le rétablissement complet

Hépatite B, aiguë	Enregistrement	CIT de 2 ans après le rétablissement complet
	CT / VT	CIT de 2 ans Ensuite accepter si HBs-Ag négatif, Ac anti-HBc positif, anti-HBs positif et titre anti-HBs > 100 IU/L, PCR VHB négatif
	MC	Comme CT / VT

Hépatite B, chronique	Définition	Porteur chronique du virus, infection persistante : HBs-Ag positif et/ou PCR VHB positif, anti-HBc positif, anti-HBs négatif
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID



Hépatite B, déclarée ou confirmée	Enregistrement	CIT de 2 ans après guérison complète
	CT / VT	Accepter si: <ul style="list-style-type: none"> infection date de > 2 ans HBs-Ag négatif, anti-HBc positif, anti-HBs positif et titre anti-HBs > 100 IU/L, PCR VHB négatif
	MC	Comme CT / VT
Hépatite B, partenaire sexuel	Définition	Partenaire sexuel atteint d'une hépatite B aiguë ou porteur chronique du virus
	Enregistrement	Accepter si: <ul style="list-style-type: none"> dernier rapport sexuel avec le partenaire il y a > 12 mois ou le donneur est vacciné
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Activités à risque Hépatite Hépatite, activités à risque, contact
Hépatite B, vie en famille	Définition	Compagnon de vie séropositif pour l'hépatite B
	Enregistrement	Accepter si le donneur est vacciné
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
Voir aussi	Activités à risque Hépatite Hépatite, activités à risque, contact	



Hépatite C

Définition	Infection par le virus de l'hépatite C, aiguë ou chronique. Test positif pour Ac anti-VHC et/ou PCR VHC
Enregistrement	Ne pas accepter
CT / VT	CID
MC	CID
Voir aussi	Activités à risque Comportement à risque, sexuel et autre Hépatite Hépatite, activités à risque, contact Situation à risque

Hépatite C, partenaire sexuel

Définition	Partenaire sexuel atteint d'une hépatite C
Enregistrement	Accepter si dernier rapport sexuel il y a >12 mois
CT / VT	Comme enregistrement
MC	Comme enregistrement
Voir aussi	Comportement à risque, sexuel et autre Situation à risque



Hépatite E	Définition	<p>Infection avec le virus de l'hépatite E. En Europe génotypes 3&4 --> transmission à partir des animaux par la consommation de viande crue ou insuffisamment cuite (porc, chasse, coquillages). Transmission possible par les produits sanguins.</p> <p>Infection aiguë en règle générale asymptomatique (90%) / clémente, limitée. Temps d'incubation 3-8 semaines. Evolution grave / chronique chez les patients souffrant de maladies hépatiques, immunosupprimés, ayant été transplantés ou chez des prématurés ou nouveau-nés (groupes à risque).</p> <p>Dès le 1.10.2018 tous les donneurs de sang (déterminant pour la libération du produit) et les donneurs de cellules souches du sang (non déterminant pour la libération du produit) sont testés pour le HEV.</p>
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	<p>CIT de 2 mois si HEV NAT positive, puis répéter le test NAT</p> <p>Le centre de transplantation peut décider de raccourcir la durée du CIT, si donneur asymptomatique</p>
	MC	Comme CT / VT
Hernie discale, opération	Se référer à	Opération moyenne_3
Hernie hiatale, opération	Se référer à	Opération moyenne_3
Hernie inguinale	Se référer à	Opération moyenne_3
Héroïne	Se référer à	Drogue, usage de



Herpès génital	Définition	Maladie infectieuse sexuellement transmissible causée par le virus Herpes simplex (VHS).
	Enregistrement	Accepter en l'absence d'autres maladies sexuellement transmissibles à l'anamnèse
	CT / VT	CI jusqu'à guérison des lésions et 2 semaines après arrêt du traitement, si l'anamnèse ne révèle aucune autre maladie sexuellement transmissible
	MC	Comme CT / VT
Herpès labial	Définition	« Bouton de fièvre ». Manifestation la plus fréquente d'une infection par le virus Herpes simplex avec formation d'ampoules sur les lèvres.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter
	MC	Accepter Informez le centre de transplantation si présence de symptômes au moment du don
Herpes zoster	Définition	Maladie virale, déclenchée par le virus varicelle-zona (varicella zoster virus VZV), de la famille de l'herpès. Réactivation endogène d'une première infection antérieure (généralement varicelle dans l'enfance). Le virus reste persistant à vie dans les cellules gliales des ganglions spinaux.
	À noter	Toujours informer le centre de transplantation
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 1 mois après rétablissement complet (lésions cutanées guéries)
MC	CIT de 2 mois après rétablissement complet (lésions cutanées guéries)	
Herpes zoster, contact	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Aptitude à déterminer par le médecin Informer le centre de transplantation
	MC	Comme CT / VT, avec sérologie de varicelle



Homosexualité	Définition	L'homosexualité per se n'entraîne pas automatiquement une Clt ou CID. Voir DOK_269_Classification_Risk_Behaviour
	Voir aussi	Comportement à risque, sexuel
Hormone de croissance	Définition	Utilisée comme médicament en cas de carence en hormone de croissance suite à une insuffisance de l'hypophyse.
	Voir aussi	Creutzfeldt-Jakob, maladie de, risque 5_Traitement par des hormones de croissance avant le 1.1.1986
HSH (hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes)	Se référer à	Comportement à risque, sexuel
HTLV I/II, infection	Définition	Virus T-lymphotropique humain (HTLV, de l'anglais Human T-lymphotropic virus). Rétrovirus qui infecte l'homme et d'autres primates et provoque la leucémie lymphoïde T de l'adulte et la paraparésie spastique tropicale (myélonéuropathie démyélinisante liée à l'infection par le virus HTLV 1). Transmission verticale / transplacentaire, par le sang (transfusion de produits sanguins infectés), par voie sexuelle. Le virus est endémique dans certaines régions de l'Afrique sub-Saharienne, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique Centrale, au Japon.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
Hypercholestérolémie	Définition	Taux de cholestérol trop élevé dans le sang. Facteur de risque significatif de l'artériosclérose / d'accidents cardiovasculaires. Causes variées: Primaire : maladie héréditaire (hypercholestérolémie familiale). Secondaires : le diabète, l'excès pondéral, l'alcoolisme, l'hypothyroïdie, l'insuffisance rénale, etc.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CID si associée à une maladie cardiovasculaire
	MC	Comme CT / VT



Hyperhidrose	Définition	Transpiration excessive non physiologique. Peut être généralisée ou locale (p. ex. paume des mains). L'hyperhidrose est classée en primaire (aucune cause identifiable) et en secondaire (cause identifiable, p. ex. diabète sucré, tumeur, maladie infectieuse, troubles endocriniens ou psychiques).
	Enregistrement	Accepter si: <ul style="list-style-type: none">• cause primaire• la maladie à l'origine de l'hyperhidrose secondaire ne constitue pas un motif d'exclusion
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Traitement au Botox

Hyperparathyroïdie	Définition	Production accrue d'hormone parathyroïdienne (PTH) par les parathyroïdes qui régulent pour une large part la métabolisation du calcium, d'où l'apparition d'une hypercalcémie.
	Enregistrement	Accepter si: <ul style="list-style-type: none">• Traitement chirurgical réussi ou influence réduite, avec ou sans traitement médicamenteux• Aucun cancer• Préménopause
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement

Hyperplasie nodulaire focale	Se référer à	Hémangiome
-------------------------------------	--------------	------------

Hyperplasie surrénale	Définition	Trouble endocrinien génétique dû à un déficit en une enzyme stéroïdienne
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID



Hypertension artérielle	Définition	Pression élevée dans le système artériel. Symptômes généralement non spécifiques Définition : $\geq 160/100$ (stade 2 conformément à l'European Society of Hypertension ou ESH) Causes : primaires pour jusqu'à 95% des cas (hypertension essentielle) : aucune cause organique. Dans 5-15% des cas, hypertension secondaire due à une maladie de base, p. ex. troubles du système hormonal, du système cardiovasculaire et lésions rénales. Conséquences possibles : maladie coronarienne, défaillance rénale, accident vasculaire cérébrale (AVC)
	Enregistrement	Accepter si la pression sanguine est stable et que le donneur ne présente pas de symptôme grâce au traitement antihypertenseur Ne pas accepter tant que l'évaluation est en cours
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Bradycardie Maladie cardiovasculaire

Hypertension portale	Définition	Hypertension dans la veine porte (veine hépatique).
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID



Hyperthermie maligne	Définition	Forme subclinique de myopathie congénitale autosomique dominante. Trouble fonctionnel potentiellement mortel des muscles squelettiques provoqué par l'administration d'un anesthésique volatil inhalé ou d'un myorelaxant dépolarisant (p. ex. l'halothane, le suxaméthonium) lors d'une anesthésie générale ou dans les services de soins intensifs. Si cas soupçonné dans la famille : identification des membres de la famille éventuellement concernés
	Enregistrement	<p>Accepter si, en dépit d'une hyperthermie maligne avérée dans l'anamnèse familiale, le donneur a subi un test d'HM dont le résultat a été déclaré négatif (test : biopsie musculaire et test de contracture in vitro)</p> <p>Ne pas accepter si:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le donneur lui-même est touché • Si le lien de parenté du donneur avec les proches touchés ≤ 4e degré (degré inférieur ou égal aux arrière-grands-parents, grandes-tantes/grands-oncles, cousins/cousines, petites-nièces/petits-neveux, arrière-petits-enfants) et si le donneur n'a pas subi de test
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement

Hyperthyroïdie	Se référer à	Maladie thyroïdienne
-----------------------	--------------	----------------------

Hypertrophie bénigne de la prostate (HBP)	Définition	Hypertrophie bénigne de la prostate due à la prolifération de cellules anodines par ailleurs.
	Enregistrement	<p>Accepter sauf si sous traitement avec des médicaments tératogènes comme Proscar®, le finastéride, Avodart®, Duodart®</p> <p>Aptitude à déterminer par le médecin</p>
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Médicaments tératogènes



Hypoglycémie	Définition	Taux de glycémie fortement réduit. Diverses causes possibles.
	Enregistrement	La cause doit être déterminée. Décision dépendant de la maladie de base. Aptitude à déterminer par le médecin
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Diabète sucré
Hypogonadisme	Définition	Sécrétion réduite des hormones sexuelles en raison d'un dysfonctionnement des gonades (testicules / ovaires) ou d'un dysfonctionnement central (hypophyse / thalamus).
	Enregistrement	Accepter si: <ul style="list-style-type: none">• la cause ne constitue pas un critère d'exclusion• aucune ostéoporose• traitement adéquat
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
Hypotension	Définition	Pression artérielle systolique < 100 mmHg , diastolique < 90 mmHg
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Aptitude à déterminer par le médecin
Hypothyroïdie	Se référer à	Maladie thyroïdienne
Hystérectomie	Se référer à	Opération moyenne_3
Ictère	Se référer à	Jaunisse
Ictère, infectieux	Se référer à	Hépatite



Iléostomie Se référer à Stomie

IMC Se référer à Poids



Immunobiothérapie

Définition

Forme de traitement consistant à influencer le système immunitaire.

Diverses possibilités:

- Stimulante: vaccination active, administration d'immunostimulants (immunothérapie active, non spécifique en cas de maladies tumorales)
- Suppressive (administration d'immunosuppresseurs): en cas de maladies auto-immunes survenant après une greffe (d'organe)
- Substitutive: vaccination passive au moyen d'immunoglobulines, administration d'anticorps monoclonaux (p. ex. maladie de Crohn, immunothérapie spécifique en cas de maladies tumorales)
- Modulatrice: hyposensibilisation en cas d'allergies, immunoabsorption en vue de supprimer des auto-anticorps ou des complexes immuns

Enregistrement Accepter en cas de:

- Vaccinations actives avec délais de suspension selon la liste des vaccinations (Annexe Art. 7, Vaccine Check)
- Prophylaxie par immunoglobuline anti-D (Rhopylac®) (voir aussi durée de CIT sous Grossesse / Avortement)
- Désensibilisation ou hyposensibilisation en cas d'allergies
- Préparations bactériennes (p. ex. Broncho-Vaxom®, Buccalin® etc.), en l'absence de maladie chronique ou d'infection récidivante
- Préparations d'origine animale (p.ex. préparations d'origine bovine comme Bio-Oss®, Bio-Gide®, Cerabone®), en l'absence de maladie chronique ou d'infection récidivante

CIT de 12 mois après l'arrêt de la sérothérapie / l'immunothérapie avec des préparations d'origine humaine (p. ex. Cytotect®, Hepatect®, vaccins passifs contre la rage ou le tétanos, Varitect®)

Ne pas accepter si:

- Utilisation pour le traitement de maladies auto-immunes, maladies tumorales, maladies chroniques ou infections récidivantes

CT / VT

Comme enregistrement

Nr: 1411	Name: DOK_Donor_Eligibility_Criteria-Blood_Stem_Cell_Donation_F	Version: 9.0	Gültig ab: 11.08.2025
			Seite: 95 von 195



	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Liste des vaccinations
Immunodéficience commune variable, IDCV	Définition	Immunodéficience congénitale, syndrome de carence en anticorps. Bien que relativement rare, cette maladie représente la cause génétique la plus fréquente d'une immunodéficience symptomatique s'accompagnant d'un déficit en IgG et induisant souvent aussi une baisse des taux d'IgA et d'IgM.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
Immunosuppression	Enregistrement	Ne pas accepter, sauf si traitement topique (p.ex. Cortisone-crème)
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Creutzfeldt-Jakob, maladie de, risque 1_Greffe de tissu humain Immunobiothérapie Maladie auto-immune
Immunothrombocytopénie (PTI)	Définition	Purpura thrombopénique idiopathique. Maladie auto-immune. Destruction des thrombocytes par des anticorps libres ou liés aux thrombocytes → thrombopénie <ul style="list-style-type: none"> • PTI aigu: frappe avant tout les enfants, disparaît souvent spontanément • PTI chronique: touche avant tout les adultes (maladie de Werlhof). Evolution presque toujours chronique
	Enregistrement	Ne pas accepter sauf si épisode unique au cours de l'enfance avec rétablissement complet
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement



Implant dentaire	Se référer à	Implant osseux et tendineux
Implant osseux et tendineux	Définition	Également augmentation osseuse.
	Enregistrement	Ne pas accepter si: implants crâniens et de la dure-mère Accepter en cas d'utilisation des produits suivants: <ul style="list-style-type: none"> • Bio-Oss© (à base de la partie minérale d'os de bovins) • Bio-Oss Collagen© (90% Bio-Oss) • Bio-Gide© (membrane porcine de collagène) • Cerabone® • Autogreffe • Allogreffe d'os et de tendons humains (à l'exception d'os crâniens)
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Creutzfeldt-Jakob, maladie de, risque 1_Greffe de tissu humain
Infarctus du myocarde	Se référer à	Maladie cardiovasculaire
Infection des voies respiratoires supérieures	Définition	Maladie infectieuse aiguë, généralement virale, de la muqueuse du nez (avec / sans les sinus), de la gorge ou des bronches
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter en cas de symptômes de refroidissement légers et si les troubles régressent CIT de 1 semaine en cas de fièvre et de mauvais état général Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Accepter en cas de symptômes de refroidissement légers et si les troubles régressent CIT de deux semaines en cas de fièvre et de mauvais état général Aptitude à déterminer par le médecin
	Voir aussi	Sinusite (rhinosinusite) aiguë



Infection fongique	Se référer à	Mycose
Infection urinaire	Définition	Maladie infectieuse des voies urinaires
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 2 semaines après arrêt de l'antibiothérapie et jusqu'au rétablissement complet Aptitude à déterminer par le médecin en cas d'infections récurrentes
	MC	Comme CT / VT
Inflammation articulaire	Se référer à	Arthrite non infectieuse
Inflammation de la thyroïde	Se référer à	Maladie thyroïdienne
Inflammation de la vésicule biliaire	Se référer à	Cholécystite
Insuffisance cardiaque	Définition	L'une des maladies internes les plus fréquentes (en Europe). 80-90% des cas dus à un trouble fonctionnel du muscle cardiaque. Causes possibles : Fréquent : maladie coronarienne, hypertension, fibrillation auriculaire Plus rare : cardiomyopathie, vice valvulaire, maladie du péricarde Prévalence et incidence croissantes avec l'âge
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID



Insuffisance rénale aiguë / chronique	Définition	Défaillance rénale. Sous-fonction de l'un ou des deux reins. Augmentation de la concentration sanguine des substances excrétées dans l'urine. <ul style="list-style-type: none"> • Insuffisance rénale aiguë (IRA) : aggravation de la fonction rénale apparaissant en quelques heures à jours, généralement réversible. Cause prérénale/rénale/postrénale. • Insuffisance rénale chronique (IRC) : perte progressive de la fonction rénale sur une longue période, généralement irréversible. Causes de nature diverse, dont diabète, hypertension, glomérulopathies, néphrite interstitielle
	Enregistrement	Ne pas accepter si insuffisance rénale chronique Sinon aptitude au don à déterminer par le médecin
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
Insuffisance surrénale	Définition	Sous-fonction des glandes surrénales qui, non traitée, mène à une carence en hormones surrénales potentiellement mortelle.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
Insuffisance veineuse chronique (IVC)	Définition	Syndrome à effet de barrage veineux chronique. Trouble de la microcirculation des vaisseaux suite à un blocage du flux veineux. Conséquences : modifications cutanées et veineuses pouvant être graves.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
Interruption de grossesse	Se référer à	Avortement



Intolérance à l'histamine	Définition	L'ingestion d'aliments riches en histamine (p. ex. fromage mûr, charcuterie, vin rouge) provoque des réactions pseudoallergiques
	Enregistrement	Accepter en cas de symptômes légers avec/sans traitement Ne pas accepter si <ul style="list-style-type: none">• Troubles sévères• Réaction circulatoire sévère connue (p. ex. choc)
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement

Intolérance au lactose	Définition	Trouble de la digestion du lactose suite à une carence en lactase ou un problème d'absorption du lactose. Congénital, primaire ou secondaire.
	Enregistrement	Accepter si asymptomatique Ne pas accepter en cas d'intolérance au lactose secondaire si la maladie de base constitue une contre-indication
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Allergie alimentaire Intoxication alimentaire

Intolérance au gluten	Se référer à	Maladie cœliaque
------------------------------	--------------	------------------

Intoxication alimentaire	Se référer à	Maladie diarrhéique
---------------------------------	--------------	---------------------

Isotrétinoïne	Se référer à	Médicaments tératogènes
----------------------	--------------	-------------------------



Jaunisse	Définition	Ictère. Jaunissement des yeux, de la peau et des muqueuses comme symptôme d'une augmentation de la bilirubine dans l'organisme. Apparition en présence de diverses maladies, dont des maladies hépatiques ou biliaires. Classement selon la cause / localisation du trouble: <ul style="list-style-type: none"> • Ictère hémolytique (préhépatique), p. ex. ictère du nouveau-né • Ictère hépatocellulaire (intrahépatique) • Ictère cholestatique (posthépatique) La jaunisse est souvent assimilée à l'hépatite virale
	Enregistrement	Accepter en cas d'anamnèse d'une cause non infectieuse sans symptômes actuels
	CT / VT	Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Aptitude à déterminer par le médecin
	Voir aussi	Hépatite
Kala-azar	Se référer à	Leishmaniose
Kératite sèche	Se référer à	Maladie auto-immune
Kyste ovarien	Définition	Kyste de l'ovaire. Tumeur bénigne à composante liquidienne dans l'ovaire. Kystes généralement fonctionnels – apparition dans le cadre des modifications hormonales cycliques normales dans les ovaires ou en raison d'un trouble du métabolisme hormonal / suite à un traitement hormonal Forme particulière : syndrome des ovaires polykystiques (SOPK)
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT jusqu'au rétablissement complet. en cas de complications
	MC	Comme CT / VT



Lambliaze	Se référer à	Maladie diarrhéique
Laminectomie	Définition	Intervention chirurgicale consistant à supprimer une ou plusieurs lames vertébrales, uni- ou bilatérale. Permet d'élargir le canal lombaire. Fenestration.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter si: <ul style="list-style-type: none"> opération il y a > 3 mois, traitement post-opératoire terminé et le don est physiquement possible
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités) Hernie discale/HD-opération Opération moyenne_3
Laryngite	Définition	Inflammation du larynx
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 2 semaines après arrêt de l'antibiothérapie et jusqu'au rétablissement complet Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT
Laser, traitement ophtalmologique	Définition	Méthode pour le traitement de l'amétropie
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT jusqu'au rétablissement complet.
	MC	CIT jusqu'au rétablissement complet
	Voir aussi	Chirurgicale, intervention (Généralités) Correction de la vision, opération Décollement de la rétine Opération_généralités_1



Légionellose	Définition	Maladie du légionnaire. Infection bactérienne due à des bactéries de la famille Legionella. L'agent le plus fréquent (90-95%) est la bactérie Legionella pneumophila. Pneumonie potentiellement mortelle provoquée par une infection par gouttelettes et pouvant s'accompagner d'une infestation de plaies, d'endocardites et de pyélonéphrites.
	Enregistrement	Accepter après rétablissement complet (aucun trouble respiratoire résiduel) et dans la mesure où une éventuelle maladie de base le permet
	CT / VT	CIT de 1 mois après fin du traitement et rétablissement complet (aucun trouble respiratoire résiduel), et dans la mesure où une éventuelle maladie de base le permet
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Pneumonie

Leishmaniose	Définition	Maladie infectieuse survenant chez l'être humain et les animaux partout dans le monde et provoquée par des parasites protozoaires obligatoirement intracellulaires de la famille Leishmania. Les agents sont présents dans pratiquement tous les pays chauds. Transmission avant tout par la mouche des sables, souvent par le biais de chiens infectés (pays méditerranéens). Formes de la leishmaniose : viscérale / cutanée / cutanéomuqueuse, étendue dépendant de l'immunocompétence de l'organisme infecté. Foie, rate et moelle osseuse touchés dans la forme viscérale
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID



Leptospirose	Définition	Infection bactérienne due à des bactéries de la famille des leptospires. Présence dans les sols et les eaux mais aussi comme parasites d'animaux sauvages et d'animaux domestiques. Transmission avant tout par les rongeurs (souris, rats) et par les porcs et les bovins (fièvre des porchers). Transmission à l'être humain au contact de l'urine, du sang et des tissus d'animaux infectés ou d'eaux contaminées (zoonose soumise à l'obligation d'annoncer). Formes : notamment maladie de Weil, fièvre des rizières, fièvre des champs, fièvre des porchers.
	Enregistrement	CIT de 2 semaines après rétablissement complet
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement

Lichen simplex (chronique)	Définition	Névrodermite circonscrite. Maladie cutanée inflammatoire locale chronique, apparaissant sous forme de plaques. Evolution par poussée, fortes démangeaisons.
	Enregistrement	Accepter si <ul style="list-style-type: none">• La zone touchée représente une faible surface• Le point de ponction est dépourvu de lésion• Un traitement local est suffisant Les antihistaminiques contre les démangeaisons sont admissibles
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Eczéma

Ligature	Se référer à	Opération moyenne_3
-----------------	--------------	---------------------



Lipœdème	Définition	Prédisposition à un trouble de la répartition des graisses qui se traduit par un dépôt disproportionné et progressif de tissu adipeux sous la peau des jambes et des bras. Symptômes chroniques avec douleurs au toucher et à la pression, douleurs spontanées. Tendance aux œdèmes et aux hématomes. Classification dans les altérations cutanées de stades I-III. Apparition presque exclusivement chez les femmes.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement

Lipome	Définition	Tumeur bénigne du tissu adipeux généralement localisée dans le tissu sous-cutané.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme CT / VT

Liste des médicaments	Définition	Annexe Art. 7, Mediliste, Délais de contre-indication pendant / après prise de médicaments Prescriptions de Transfusion CRS Suisse
------------------------------	------------	---

Liste des pays	Définition	Annexe Art. 7, Travelcheck, Liste de pays présentant un risque élevé d'infections virales ou parasitaires Prescriptions de Transfusion CRS Suisse
-----------------------	------------	--

Liste des vaccinations	Définition	Annexe Art. 7, Vaccine Check, Délais de contre-indication après vaccination Prescriptions de Transfusion CRS Suisse
-------------------------------	------------	---



Long Covid (Post Covid Syndrom)	Définition	Syndrome aux manifestations multiples, sans qu'un corrélat physiopathologique uniforme soit connu en l'état actuel des connaissances.
	À noter	En raison de la physiopathologie peu claire/inconsistante, les contre-indications temporaires (CIT) des symptômes individuels s'appliquent : Voir pneumonie/trouble respiratoire ; céphalées ; bronchite/toux ; dépression ; etc. Aptitude à déterminer par le médecin
	Voir aussi	Anosmie/ Parosmie / Ageusie Céphalées Dépression Pneumonie
Lumpectomie	Définition	Ablation chirurgicale d'une petite tumeur du sein
	Voir aussi	Cancer Opération grande_4 Opération moyenne_3 Opération petite_2
Lupus érythémateux systémique (SLE)	Se référer à	Maladie auto-immune
Lyme, maladie de	Se référer à	Borréliose
Lymphangite	Définition	Inflammation des voies lymphatiques cutanées et sous-cutanées provoquée généralement par des bactéries ou plus rarement par des toxines.
	Enregistrement	Accepter pour autant que la maladie de base le permet
	CT / VT	Accepter 1 mois après rétablissement complet et arrêt de toute antibiothérapie
	MC	Comme CT / VT



Lymphogranulome vénérien	Définition	Également appelé granulome vénérien ou granulome inguinal. Maladie sexuellement transmissible, fréquente sous les tropiques. Agents : sérotypes L1-L3 de la bactérie Chlamydia trachomatis.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Voir aussi	Maladie sexuellement transmissible
Maladie auto-immune	Définition	Réaction excessive du système immunitaire contre ses propres tissus/cellules. La réaction peut être renforcée / déclenchée par le G-CSF. Maladies concernées, p.ex.: <ul style="list-style-type: none"> • Sang: anémie hémolytique auto-immune • Maladies rhumatismales inflammatoires chroniques (p. ex. spondylarthrite ankylosante / maladie de Bechterew, syndrome de Reiter) • Maladies intestinales inflammatoires chroniques (p. ex. maladie de Crohn, colite ulcéreuse, voir aussi maladie cœliaque) • Peau & cheveux: lichen scléreux, sclérodermie, pemphigus, alopecie en aires, syndrome de Sjögren) • Reins: glomérulonéphrite • Thyroïde: voir Thyroïdite de Hashimoto / maladie de la thyroïde • SNC: syndrome de Guillain-Barré, sclérose en plaques, myasthénie grave • Maladies systémiques: sarcoïdose, lupus érythémateux systémique (SLE)
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Voir aussi	Maladie cœliaque Maladie thyroïdienne Thyroïdite de Hashimoto



Maladie cardiaque	Voir aussi	Arythmie Cardiomyopathie Cardiopathie congénitale Endocardite Insuffisance cardiaque Péricardite / épanchement péricardique Vice valvulaire
--------------------------	------------	---

Maladie cardiovasculaire	Définition	Maladies émanant du système circulatoire et/ou du cœur. En font partie : <ul style="list-style-type: none"> • Maladie coronarienne / angine de poitrine • Infarctus du myocarde (thrombose coronarienne) • Obstruction artérielle périphérique / claudication intermittente • Anévrisme vasculaire, p. ex. anévrisme aortique • Statut après pose de stent / pontage coronarien
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Voir aussi	Hypertension artérielle



Maladie cérébrovasculaire	Définition	Groupe de maladies frappant les vaisseaux sanguins du cerveau, c-à-d. les artères ou les veines cérébrales. Énumération synthétique : <ul style="list-style-type: none">• Malformation vasculaire• Hémorragie cérébrale• Trouble de la circulation cérébrale• Attaque cérébrale / AVC• Accident ischémique transitoire (AIT)• Occlusion de la veine centrale de la rétine
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Voir aussi	Hémorragie cérébrale liée à un accident
Maladie cœliaque	Définition	Intolérance au gluten (protéine présente dans les céréales), forme mixte d'une allergie et d'une maladie auto-immune.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	Accepter en cas de maladie bien contrôlée avec des symptômes mineurs Seul don de moelle osseuse admis ; Information au centre de transplantation
	MC	Comme CT / VT Acceptation du risque par le centre de transplantation
	Voir aussi	Maladie auto-immune
Maladie coronarienne	Se référer à	Maladie cardiovasculaire
Maladie d'Osler-Vaquez	Se référer à	Polycytémie vraie
Maladie de Bechterew	Se référer à	Spondylarthrite ankylosante
Maladie de Boeck	Se référer à	Sarcoïdose



Maladie de Crohn	Se référer à	Maladie auto-immune
Maladie de la peau	Se référer à	Dermatite
Maladie de Menière	Définition	Maladie de l'oreille interne se caractérisant par des crises récurrentes de vertige, de surdité et de bourdonnements d'oreille (acouphènes, tinnitus). Triade classique.
	Enregistrement	Accepter selon le degré de gravité des symptômes et la fréquence des crises. Les troubles peuvent s'aggraver lors du don Aptitude à déterminer par le médecin
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
Maladie de Meulengracht	Définition	Maladie de Gilbert, maladie de Meulengracht, syndrome de Meulengracht, maladie de Gilbert-Meulengracht. Trouble génétique du métabolisme de la bilirubine, provoque une légère hyperbilirubinémie, généralement asymptomatique et anodine. Très étendu, aucun traitement nécessaire.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CI si ictère
	MC	Comme CT / VT
Maladie de Mondor	Définition	Induration inflammatoire subaigüe des veines superficielles dans le thorax et les bras ; forme particulière : maladie de Mondor pénienne. Peut survenir comme symptôme concomitant d'un cancer, pour cette raison établir si présence d'un cancer (cancer des seins chez les femmes). Les femmes sont plus fréquemment atteintes, et 75% des patientes sont d'âge moyen
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID



Maladie de Perthes	Définition	Nécrose osseuse de la tête fémorale. Maladie aseptique idiopathique apparaissant dans l'enfance.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
Maladie de Raynaud	Définition	Syndrome de Raynaud. Trouble de la circulation sanguine dans les doigts et les orteils dû à un rétrécissement des vaisseaux (doigts / orteils blancs). Apparition primaire / idiopathique (sans cause identifiable), secondaire en association avec une maladie auto-immune (p. ex. maladie des agglutinines froides, Lupus érythémateux, sclérodermie, etc.), une maladie vasculaire, un traumatisme, des médicaments. Déclenché par des facteurs endogènes (hormones) ou exogènes (froid, stress).
	Enregistrement	Accepter sauf si lié à une maladie auto-immune systémique Aptitude à déterminer par le médecin
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
Maladie de Refsum	Définition	Heredopathia atactica polyneuritiformis. Fait partie des neuropathies héréditaires motrice et sensorielle. Maladie du métabolisme, autosomique récessive, avec accumulation d'acide phytanique dans les tissus. Signes cliniques: rétino-pathie pigmentaire avec héméralopie (baisse de la vision nocturne) (souvent premier symptôme), polyneuropathie périphérique, ataxie cérébelleuse, surdité.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Voir aussi	Rétinite pigmentaire
Maladie de von Reck-linghausen	Se référer à	Neurofibromatose (NF)



Maladie diarrhéique	Définition	Agents possibles : Bactéries : p. ex. E. coli entérotoxique, Vibrio cholerae (choléra), Salmonella enteritidis (salmonellose), Yersinia enterocolitica, Shigella, Campylobacter, Clostridium difficile, Salmonella typhi (fièvre typhoïde, fièvre paratyphoïde) Virus: rotavirus, norovirus Parasites intestinaux: vers ou protozoaires, Giardia lamblia (lambliaose)
	À noter	Demander la fréquence et la durée, déterminer la cause
	Enregistrement	CIT de 2 semaines après rétablissement complet et arrêt du traitement lors des autres maladies diarrhéiques CIT de 3 mois après rétablissement complet en cas de choléra CIT de 6 mois après rétablissement complet en cas de shigellose, yersiniose
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Fièvre typhoïde/paratyphoïde
Maladie diarrhéique inflammatoire chronique	Se référer à	Maladie auto-immune
Maladie diarrhéique, contact	Définition	Contact avec une personne souffrant d'une maladie diarrhéique infectieuse
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 2 semaines après le contact lors des autres maladies diarrhéiques CIT de 2 mois en cas de contact avec une personne atteinte de la fièvre typhoïde / paratyphoïde CIT de 3 mois en cas de contact avec une personne atteinte d'une helminthiase ou infection par des protozoaires (amibes, Giardia lamblia, crypto / microsporidies, etc.)
	MC	Comme CT / VT
Maladie du sommeil	Voir aussi	Encéphalite Narcolepsie Trypanosomiase africaine



Maladie infantile	Définition	Maladies infectieuses avec fort degré de propagation et fort pouvoir contagieux, qui confèrent typiquement une immunité à vie et surviennent principalement pendant l'enfance.
	Voir aussi	Erythème infectieux aigu Herpes zoster Oreillons Poliomyélite Rougeole Rubéole

Maladie infantile, contact	Définition	Contact direct avec une personne atteinte d'une maladie infantile.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter
	MC	Accepter si immunité existante (maladie surmontée / vaccination) CIT de 1 mois après le dernier contact, en fonction de la maladie de base Aptitude à déterminer par le médecin

Maladie infectieuse	À noter	Toujours déterminer la cause. La conduite à tenir est expliquée sous chaque maladie concernée.
	Enregistrement	Ne pas accepter si infection chronique
	CT / VT	CI si infection aiguë, durée variant selon l'infection et le degré de guérison du donneur Normalement CIT de 2 semaines après arrêt de l'antibiothérapie et jusqu'au rétablissement complet Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT



Maladie infectieuse, contact	Définition	Contact direct avec une personne malade sans être soi-même malade.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter ou CI en fonction de la maladie de base Accepter, si immunité en place (maladie déjà subie, donneur vacciné) Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Accepter, si immunité en place (maladie déjà subie, donneur vacciné) CIT de 1 mois après le dernier contact, en fonction de la maladie de base Aptitude à déterminer par le médecin
Maladie ORL	Définition	Maladies / troubles fonctionnels de tous les organes et structures de la tête et de la gorge à l'exception du cerveau et des yeux. Il s'agit souvent de maladies inflammatoires / infectieuses.
	Voir aussi	Amygdalite aiguë Amygdalite chronique / récidivante Laryngite Mastoïdite Otite moyenne aiguë Otite moyenne chronique Pharyngite
Maladie psychiatrique	Voir aussi	Borderline Dépression Névrose Psychose Schizophrénie Traitement au lithium Trouble affectif bipolaire Trouble du comportement alimentaire



Maladie sanguine auto-immune	Se référer à	Maladie auto-immune
Maladie sanguine maligne	Définition	Toutes les formes de leucémie, lymphome hodgkinien et non hodgkinien, néoplasies myéloprolifératives.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
Maladie sanguine, non maligne	Voir aussi	Anémie Diathèse hémorragique, troubles acquis Diathèse hémorragique, troubles congénitaux Thrombophilie
Maladie sexuellement transmissible	Voir aussi	Chancres mou Chlamydie Comportement à risque, sexuel Gonorrhée Hépatite B, aiguë Hépatite B, chronique Hépatite C Herpès génital HTLV I/II, infection Lymphogranulome vénérien Syphilis Verrues génitales VIH, infection Virus du papillome humain (VPH)



Maladie thyroïdienne	Définition	Maladie de la glande thyroïde avec ou sans trouble du métabolisme hormonal (hyper-/ hypothyroïdie)
	Enregistrement	Accepter si l'hormone thyroïdienne est dans la norme (eu-thyroïdie) avec / sans traitement substitutif, sauf si: <ul style="list-style-type: none">• clarification en cours d'une éventuelle thyroïdite• tumeur maligne (carcinome thyroïdien)• Maladie de Basedow = maladie de Graves Accepter si étiologie inconnue et aucun signe actuel de maladie auto-immune (même en cas de statut après thyroïdec-tomie)
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Thyroïdite de Hashimoto
Maladie vasculaire artérielle	Définition	Maladies veino-occlusives causées généralement par des dépôts sur les parois des vaisseaux (artériosclérose) et / ou par des processus inflammatoires entraînant une réduction ou une interruption totale de l'approvisionnement en oxygène de l'organe ou des tissus concernés. En font partie : <ul style="list-style-type: none">• Maladie artérielle occlusive périphérique (MAOP)• Occlusion vasculaire aiguë• Anévrisme artériel• Vasculite• Thromboangéite oblitérante (TAO)• Artériosclérose• Maladie coronarienne
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Voir aussi	Maladie cardiovasculaire Maladie cérébrovasculaire



Maladie vasculaire veineuse	Définition	Varices ou thromboses
	Voir aussi	Hémorroïdes Hypertension portale Insuffisance veineuse chronique (IVC) Phlébothrombose Thrombophlébite / Phlébite Thrombose des sinus veineux Varices, jambes

Malaria, histoire de	Définition	Infection confirmée, pathogène: parasite du genre Plasmodium
	Enregistrement	Accepter si: <ul style="list-style-type: none">infection il y a > 3 ans et donneur est sans symptômes de la maladie depuis lors
	CT / VT	Accepter si: <ul style="list-style-type: none">infection il y a > 3 annéesdonneur traité et asymptomatique depuis lorseffectuer test de dépistage de la malaria (anticorps et NAT)
	MC	Comme CT / VT Le test est répété au moment du Medical CheckUp, même si le résultat était négatif au CT

Malaria, prophylaxie	Se référer à	Malaria, risque de
-----------------------------	--------------	--------------------



Malaria, risque de	Définition	Séjour dans une région endémique: voir Annexe Art. 7, Travelcheck
	À noter	Toujours information du centre de transplantation par SBSC -> décision quant à l'admissibilité du donneur en fonction de la situation
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	<p>CIT de 3 mois après retour d'une région endémique</p> <p>Accepter sans test de malaria au moment du CT (test effectué au moment du MC):</p> <ul style="list-style-type: none"> • séjour court (< 6 mois) sans fièvre / autres symptômes pendant ou après le séjour <p>Accepter avec test de malaria au moment du CT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • séjour court (<6 mois) avec fièvre / autres symptômes pendant ou après le séjour • séjour plus long (> 6 mois) sans fièvre / autres symptômes pendant ou après le séjour • séjour plus long (> 6 mois) avec fièvre / autres symptômes pendant ou après le séjour (avec suspicion de malaria) • histoire de malaria il y a > 3 années, donneur traité et sans symptômes depuis lors <p>Test de malaria = test anticorps et NAT !</p> <p>Ne pas accepter si:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de retour depuis < 3 mois • histoire de malaria il y a < 3 années • test de malaria actuel positif (NAT et / ou anti-corps)



MC

Toujours demander si séjour dans une région endémique de la malaria au cours des 3 dernières années !

Chez tous les groupes à risque:

- CIT de 4 mois après retour d'une région endémique
- En cas de séjour dans une région impaludée au cours des 3 dernières années: effectuer les tests de malaria lors du MC
- Si tests de malaria faits au moment du CT / VT, les répéter au moment du MC
- Ne pas accepter, si test de malaria actuel positif

Test = sérologie anti-malaria + NAT !

Si séjour dans une région endémique de la malaria au cours des 6 derniers mois : toujours répéter la NAT le jour du prélèvement

Mesure exceptionnelle :

Lors d'un cas très urgent, le centre de transplantation peut décider de raccourcir la durée du CIT de 4 mois, en acceptant le risque :

- CIT d'au **moins 3 semaines** après le retour, puis tester NAT et anticorps
- Si NAT **négative** : accepter et **répéter la NAT le jour du prélèvement**
- Si NAT **positive** : **arrêt du WorkUp et CIT de 3 ans**
- Si NAT **négative le jour du prélèvement** : documenter le résultat et informer le centre de transplantation
- Si NAT **positif le jour du prélèvement** : informer le centre de transplantation **sans tarder**. En théorie, le donneur doit être bloqué, mais d'entente avec le centre de transplantation, la réservation usuelle de 5 années pour ce patient peut être maintenue.
- Lors d'une demande pour un nouveau don : répéter les tests de malaria chez le donneur et acceptation du risque par le centre de transplantation si nécessaire
- Lors de la libération du donneur après 5 années : répéter les tests de malaria. Si positif : exclusion du donneur

Nr: 1411	Name: DOK_Donor_Eligibility_Criteria-Blood_Stem_Cell_Donation_F	Version: 9.0	Gültig ab: 11.08.2025
			Seite: 119 von 195



Marqueurs infectieux positifs, non spécifiques	À noter	Suivre les Politiques SBSC et les prescriptions de STS, décrits dans - POL_003, Pt. 3.1 et 4.1 - Chapitre 11A_Qualification biologique du don: marqueurs infectieux
	CT / VT	Accepter, en présence d'un test de screening positif et d'un test de confirmation négatif. Saisir le résultat comme étant négatif mais décrire le test de screening positif sous forme de remarque. Test NAT additionnel si nécessaire
	MC	Comme CT / VT
Mastocytose	Définition	Accumulation, d'origine vraisemblablement génétique, de mastocytes dans les organes. Est subdivisée en mastocytose cutanée (accumulation de mastocytes dans les tissus) et en mastocytose systémique (accumulation de mastocytes dans les organes et la moelle osseuse). Mastocytes atypiques présentant un trouble de la régulation de l'activité des mastocytes. Stades de la mastocytose systémique : indolente → agressive → leucémie mastocytaire.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
Mastoïdectomie	Se référer à	Opération moyenne_3
Mastoïdite	Définition	Inflammation de l'apophyse mastoïde située à la base de l'os temporal avec fonte purulente des cavités osseuses. La mastoïdite est une complication de l'otite moyenne aiguë.
	Enregistrement	Accepter après arrêt de la thérapie et rétablissement complet
	CT / VT	CIT de 2 mois après arrêt de la thérapie et rétablissement complet
	MC	Comme CT / VT
Médicaments	Se référer à	Traitement médicamenteux



Médicaments térato-gènes	Définition	Médicaments susceptibles de provoquer des malformations chez l'embryon. Nommés plutôt reprotoxiques aujourd'hui, de tels médicaments: a) agissent sur le taux d'hormones masculines / l'aptitude à la procréation et ont une demi-vie (relativement) courte b) peuvent réduire l'aptitude à la procréation et provoquer des malformations chez l'embryon ou le fœtus (fœto-toxicité)
	À noter	Informar le centre de transplantation sur la prise
	Enregistrement	Accepter si le traitement médicamenteux peut être interrompu en vue du don selon les durées de suspension.
	CT / VT	Les durées de suspension dépendent du degré de reprotoxicité et de la demi-vie des médicaments. Demi-vie = temps nécessaire pour que la concentration plasmatique du médicament diminue de moitié (50%). Durées de suspension: a) Médicaments agissant sur le taux d'hormones masculines / l'aptitude à la procréation et ayant une demi-vie (relativement) courte: <ul style="list-style-type: none">• Pas de suspension si prise de: Alocapil®, Finacapil®, Finasterax®, Andropecia Biorga®, Propecia® ou Proscar® (principe actif: finastéride)• 6 mois: Avodart®, Duodart® (principe actif: dutastéride) b) Médicaments présentant une reprotoxicité sévère: <ul style="list-style-type: none">• 1 an: Acicutan®, Neotigason (principe actif: acitrétine)• 2 ans: Erivedge® (principe actif: vismodegib) Il revient au médecin d'évaluer au cas par cas la possibilité de réduire la durée de suspension pour les médicaments susmentionnés. En cas de prise d'autres médicaments tératogènes, aptitude au don à déterminer par le médecin



MC

Durées de suspension:

a) Médicaments agissant sur le taux d'hormones masculines / l'aptitude à la procréation et ayant une demi-vie (relativement) courte:

- 1 mois: Alocapil®, Finacapil®, Finasterax®, Andropecia Biorga®, Propecia® ou Proscar® (principe actif: finastéride)
- 6 mois: Avodart®, Duodart® (principe actif: dutastéride)

b) Médicaments présentant une reprotoxicité sévère:

- 1 an: Acicutan®, Neotigason (principe actif: acitrétine)
- 2 ans: Erivedge® (principe actif: vismodegib)

Il revient au médecin d'évaluer au cas par cas la possibilité de réduire la durée de suspension pour les médicaments susmentionnés

En cas de prise d'autres médicaments tératogènes, aptitude au don à déterminer par le médecin

Méningite	Définition	Inflammation des membranes entourant le cerveau et la moelle épinière, causée par des virus, des bactéries, d'autres organismes ou encore des agents non infectieux. Peut aussi être un symptôme secondaire d'une maladie infectieuse générale. Toujours traiter comme une urgence médicale ; de manière générale, la méningite bactérienne est potentiellement mortelle. Agents les plus fréquents : méningocoques, pneumocoques, Haemophilus influenzae
	À noter	Lors de l'anamnèse, demander si le donneur a souffert de convulsions associées (épilepsie)
	Enregistrement	CIT de 3 mois après rétablissement complet sans séquelles
	CT / VT	CIT de 6 mois après rétablissement complet sans séquelles
	MC	Comme CT / VT
Voir aussi	Encéphalite Epilepsie Méningoencéphalite vernoestivale (MEVE)	

Méningoencéphalite Se référer à Encéphalite



Méningoencéphalite vernoestivale (MEVE)	Définition	Méningoencéphalite à tique. Maladie déclenchée par le virus de la MEVE, se manifestant par des symptômes de type grippal et par une méningoencéphalite chez une partie des patients tandis que, dans la majorité des cas, la maladie est asymptomatique. Transmission par les tiques.
	Enregistrement	Accepter après rétablissement complet sans séquelle neurologique
	CT / VT	CIT de 3 mois après rétablissement complet sans séquelle neurologique
	MC	Comme CT / VT
Méniscectomie	Se référer à	Opération moyenne_3
Migraine	Définition	Céphalée primaire se manifestant par une douleur pulsatoire récurrente, survenant par crise, généralement sur un côté de la tête. S'accompagne souvent de symptômes secondaires tels que nausées, vomissements, sensibilité à la lumière et au bruit. Est parfois précédée d'une aura avec troubles de la perception optique ou sensitive. Divers facteurs déclencheurs dont des facteurs hormonaux, le manque de sommeil, le stress, la nourriture, des facteurs environnementaux. Demander quels sont les agents déclencheurs et le degré de gravité !
	Enregistrement	Accepter sauf si les crises sont fréquentes (1 – 2x / mois) et graves ou nécessitent une médication prophylactique
	CT / VT	Comme enregistrement Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Céphalée en grappe
Minkowski-Chauffard, maladie	Se référer à	Sphérocytose héréditaire



Mononucléose infectieuse	Définition	Infection par le virus d'Epstein-Barr, très fréquente dans la population. Evolution souvent asymptomatique. Transmission par la salive, par gouttelettes. Les virus infectent les lymphocytes B et restent à vie dans l'organisme. Réactivation possible en cas d'immunité affaiblie (patients immunosupprimés !). Sinon, les complications sont rares.
	Enregistrement	CIT de 6 mois après rétablissement complet
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
Morsure d'animaux domestiques / sauvages	Enregistrement	CIT de 12 mois après vaccination contre la rage post-exposition / vaccination passive
	CT / VT	CIT de 2 semaines après arrêt de l'antibiothérapie et jusqu'au rétablissement complet CIT de 12 mois après vaccination contre la rage post-exposition / vaccination passive
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Liste des vaccinations
MSM (Men who have sex with men)	Se référer à	Comportement à risque, sexuel
Mucoviscidose	Définition	Maladie métabolique souvent génétique avec sécrétion de mucus visqueux des glandes exocrines et complications subséquentes, graves pour certaines.
	Enregistrement	Ne pas accepter à moins que le sujet soit uniquement porteur de la maladie
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
Mucoviscidose, statut de porteur	Définition	Porteur sain de la mucoviscidose
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement



Muguet	Se référer à	Candidose
Mycose	Définition	<p>Maladie infectieuse causée par des champignons. Champignons les plus fréquents :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dermatophytes : champignons filamenteux • Levures : p. ex. Candida • Moisissures (champignons filamenteux) : p. ex. Aspergillus <p>Subdivision en :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mycose superficielle : peau, ongles, muqueuses • Mycose systémique : L'agent parvient dans le système circulatoire (le plus souvent par les poumons) et touche les organes internes -> normalement seulement chez les patients à l'immunité affaiblie, souffrant d'une maladie grave, alors difficile à traiter et peut avoir une issue fatale.
	Enregistrement	Accepter sauf si mycose d'organe / mycose systémique
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
Myomectomie	Se référer à	Opération moyenne_3
Myxoedème	Définition	Infiltration cutanée par accumulation des glycosaminoglycane formant un œdème généralisé accompagnant une hypothyroïdie. Survient également sous forme de myxoedème pré tibial lors d'une hyperthyroïdie (maladie de Basedow).
	Enregistrement	Accepter si la maladie de base ne constitue pas un critère d'exclusion
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Maladie thyroïdienne



Narcolepsie	Définition	Hypersomnie due à un trouble central de la régulation des cycles de sommeil-éveil qui se manifeste sous forme soit cataleptique (classique) soit non cataleptique (monosymptomatique).
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
Narcose	Voir aussi	Opération grande_4 Opération moyenne_3 Opération petite_2
	Définition	Médecine alternative, p. ex. homéopathie, acupuncture, médecine chinoise, etc.
	À noter	Un traitement par naturopathie ne constitue pas en soi un motif de suspension mais il faut prêter attention à la maladie de base et à la voie d'administration (iv, sc, extracorporelle).
Naturopathie	Enregistrement	Accepter si la raison du traitement le permet
	CT / VT	S'informer du composant du médicament et, le cas échéant, suspendre le traitement jusqu'au prélèvement Respecter les éventuels délais de suspension (p. ex. acupuncture)
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Acupuncture Blessure par piqûre d'aiguille
Nécrolyse épidermique toxique (NET)	Se référer à	Syndrome de Lyell
Nématodes	Se référer à	Helminthiase
Neotigason	Se référer à	Médicaments tératogènes



Néphrectomie	Définition	Résection partielle ou totale des reins. Déterminer la cause et la fonction rénale restante.
	Enregistrement	Accepter si <ul style="list-style-type: none">• Intervention faisant suite à un traumatisme• Résection partielle due à une cause bénigne (p. ex. tumeur encapsulée bénigne)• Don de rein Aptitude à déterminer par le médecin
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Opération grande_4 Opération moyenne_3

Néphrite	Définition	Maladie inflammatoire aiguë ou chronique des reins. Causes : infections, toxines, maladies auto-immunes, conséquence d'une maladie systémique (comme le diabète ou le lupus érythémateux disséminé). Déterminer les causes !
	Voir aussi	Glomérulonéphrite Néphrite interstitielle Pyélonéphrite

Néphrite interstitielle	Définition	Maladie inflammatoire des reins qui conduit à une perte fonctionnelle et est généralement causée par des médicaments, une infection ou une maladie systémique.
	Enregistrement	Accepter <ul style="list-style-type: none">• 6 mois après rétablissement complet• Si fonction rénale normale
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement



Néphropathie aiguë	Voir aussi	Calculs rénaux Colique rénale Glomérulonéphrite Insuffisance rénale aiguë / chronique Néphrite Pyélonéphrite
Néphropathie chronique	Définition	En font partie : <ul style="list-style-type: none"> • Glomérulonéphrite • Néphrite • Insuffisance rénale • Calculs rénaux • Cancer du rein • Tumeur rénale bénigne • Dysplasie fibromusculaire rénale
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
Néphrosclérose	Se référer à	Cirrhose néphrotique
Neurinome de l'acoustique	Définition	Tumeur bénigne émanant de cellules de la gaine du 8e nerf cérébral (nerf vestibulocochléaire, nerf de l'équilibre) (cellules de Schwann), synonyme: schwannome vestibulaire
	Enregistrement	Accepter si ablation chirurgicale complète de la tumeur ou radiothérapie, sans résidu significatif
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Neurofibromatose (NF)



Neurofibromatose (NF)	Définition	Maladie génétique, à transmission autosomique dominante, pouvant être à l'origine de neurofibromes. Type 1 (maladie de von Recklinghausen) : NF périphérique Type 2 : NF centrale
	Enregistrement	Ne pas accepter si signe de NF centrale et/ou dégénérescence maligne Aptitude à déterminer par le médecin
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
Névralgie de Bing-Horton	Se référer à	Céphalée en grappe
Névralgie du trijumeau	Définition	Douleur faciale intense dans la zone du nerf trijumeau, généralement unilatérale, survenant brusquement, de courte durée. Idiopathique ou symptomatique, notamment suite à un processus inflammatoire ou un cancer.
	Enregistrement	Accepter, si événement unique et clos
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
Névrodermite	Définition	Neurodermite. Maladie cutanée atopique chronique, non contagieuse, qui se manifeste plutôt dans l'enfance et dont la rémission est fréquente à la puberté.
	Enregistrement	Accepter, sauf en cas de symptômes chroniques accrus à l'âge adulte
	CT / VT	Comme enregistrement et pour autant que les points de ponction ne soient pas touchés
	MC	Comme CT / VT



Névrose	Définition	Terme générique vieillissant englobant les troubles psychiques légers causés par un conflit.
	Enregistrement	Accepter si absence de traitement médicamenteux, sinon clarifier le diagnostic exact et procéder en conséquence
	CT / VT	Comme enregistrement Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Borderline Dépression Psychose Schizophrénie Traitement au lithium
Norovirus	Se référer à	Maladie diarrhéique
Obstruction artérielle périphérique	Se référer à	Maladie vasculaire artérielle
Oesophage de Barrett	Définition	Transformation de la muqueuse à la jonction entre l'œsophage et l'estomac. La maladie apparaît souvent comme une complication du reflux gastro-œsophagien et doit être considérée comme une précancérose pouvant mener à un adénocarcinome de l'œsophage.
	Enregistrement	Accepter en cas de muqueuse de Barrett sans dysplasie Ne pas accepter en cas de muqueuse de Barrett avec dysplasie
	CT / VT	Comme enregistrement Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme enregistrement Aptitude à déterminer par le médecin



Œsophagite	Définition	Inflammation de la muqueuse de l'œsophage. Local/diffus, aigu/chronique. Forme la plus fréquente : œsophagite de reflux (reflux d'acide gastrique). Autres causes : infections, médicamenteux-toxique Risque de dégénérescence maligne de la muqueuse en cas d'œsophagite chronique.
	Enregistrement	Ne pas accepter si <ul style="list-style-type: none"> • symptomatique • chronique • signe de malignité
	CT / VT	Accepter si sujet asymptomatique sous traitement et en l'absence de signe de malignité
	MC	Comme CT / VT
Opération cardiaque	Enregistrement	Ne pas accepter sauf si foramen ovale opéré sans séquelle ni thérapie
	CT / VT	CID
	MC	CID
Opération dentaire	Se référer à	Opération moyenne_3
Opération des varices	Se référer à	Varicectomie
Opération du cartilage	Se référer à	Opération moyenne_3



Opération grande_4	Définition	Valeur indicative pour la durée de l'opération: > 60 min <ul style="list-style-type: none"> • Opérations d'urgence après un polytraumatisme • Toute ouverture du crâne • Opérations thoraciques ouvertes • Opérations ouvertes de l'abdomen, y c. césarienne • Opérations de la colonne vertébrale à l'exception des opérations des hernies discales lombaires • Remplacements d'os du bassin, y c. résection partielle du sacrum • Opérations du fémur, y c. endoprothèse totale de la hanche • Remplacements d'endoprothèses totales
	Enregistrement	Accepter 1 an après l'intervention si: <ul style="list-style-type: none"> • La maladie de base ne constitue pas un critère d'exclusion • L'évolution est dépourvue de complication • Le traitement est achevé Sinon aptitude au don à déterminer par le médecin
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Creutzfeldt-Jakob, maladie de, risque 3_Opération du cerveau ou de la moelle épinière



Opération moyenne_3	Définition	Valeur indicative pour la durée de l'intervention : 15-60 min Exemples : <ul style="list-style-type: none"> • Toute opération osseuse sur le crâne sans ouverture du crâne, y c. correction de la déviation de la cloison nasale • Interventions laparoscopiques / arthroscopiques • Amputations des doigts et des orteils • Opérations des hernies discales lombaires • Opérations d'hernies inguinales • Opérations orthopédiques sur les grands os longs à l'exception du fémur (tibia, humérus, radius, cubitus), y c. endoprothèse totale du genou et ablation de matériel • Débridements étendus des plaies • Varicectomies > 1 varice
	Enregistrement	Accepter 3-6 mois après l'intervention si : <ul style="list-style-type: none"> • La maladie de base ne constitue pas un critère d'exclusion • L'évolution est dépourvue de complication • Le traitement est achevé Sinon aptitude au don à déterminer par le médecin
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement



Opération petite_2	Définition	Valeur indicative pour la durée de l'intervention : <15 min Exemples : <ul style="list-style-type: none"> • Petites interventions dermatologiques et ophtalmologiques, y c. opération de la cataracte • Ponctions diagnostiques / thérapeutiques, p. ex. arthroscopies • Petites varicectomies (1 varice)
	Enregistrement	Accepter 1 mois après l'opération si : <ul style="list-style-type: none"> • La maladie de base ne constitue pas un critère d'exclusion • L'évolution est dépourvue de complication • Le traitement est achevé Sinon aptitude au don à déterminer par le médecin
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement

Opération généralités_1	Définition	Toujours déterminer la maladie de base. <ul style="list-style-type: none"> • CID systématique si maladie de base maligne, sauf en cas de basaliome et carcinome cervical in situ • Durée de CIT dépendant de la gravité de l'intervention • De manière générale, aptitude au don et durée de suspension à déterminer par le médecin, les délais d'attente suite aux interventions chirurgicales n'étant que des valeurs indicatives
	Voir aussi	Opération grande_4 Opération moyenne_3 Opération petite_2



Oreillons	Définition	Parotidite épidémique. Maladie virale contagieuse avec inflammation des glandes salivaires et d'autres organes. Maladie infantile classique, en règle générale immunité à vie. Complications fréquentes: méningite et orchite
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 1 mois après le rétablissement complet
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Maladie infantile, contact

Orgelet	Définition	Inflammation purulente aiguë/abcès du bord de la paupière (inflammation des glandes sébacées ou des glandes sudoripares apocrynes). Se résout normalement sans thérapie spécifique.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CI jusqu'à la résorption de l'infection
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Blépharite

Ostéomyélite / Ostéite	Définition	Inflammation aiguë ou chronique du tissu osseux / de la moelle osseuse, causée par une infection.
	Enregistrement	CIT de 2 ans après arrêt de l'antibiothérapie (si événement unique et pas de récurrence) et guérison complète Déterminer la cause ! Aptitude à déterminer par le médecin
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement

Ostéoporose	Définition	Diminution de la densité osseuse suite à un déséquilibre entre la formation et la destruction du tissu osseux.
	Enregistrement	Ne pas accepter en cas de diagnostic explicite d'ostéoporose
	CT / VT	Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT



Otite moyenne aiguë	Définition	Forme soudaine d'inflammation de l'oreille moyenne causée par une infection.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT jusqu'au rétablissement complet.
	MC	Comme CT / VT

Otite moyenne chronique	Définition	Inflammation chronique de l'oreille moyenne se manifestant par une suppuration chronique de la muqueuse ou de l'os.
	Enregistrement	Ne pas accepter sauf si traitement chirurgical réussi et après arrêt de l'antibiothérapie
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Opération moyenne_3

Otosclérose	Définition	Modification de la structure osseuse de l'oreille interne et moyenne accompagnée d'une surdité de transmission progressive. Causes envisagées: infections virales, réactions auto-immunes, facteurs héréditaires et effets hormonaux.
	Enregistrement	Accepter en cas d'otosclérose asymptomatique ou oligosymptomatique Ne pas accepter en cas de maladie progressive
	CT / VT	Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Aptitude à déterminer par le médecin

Pacemaker	Définition	Stimulateur cardiaque
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID



Pancréatite aiguë	Définition	Inflammation aiguë du pancréas causée dans 60-70% des cas par une accumulation de bile généralement due à une maladie des voies biliaires, dans 30% des cas à un abus d'alcool.
	Enregistrement	Accepter si la cause est <ul style="list-style-type: none">• biliaire• virale (oreillons)• traumatique• iatrogène sinon CID
	CT / VT	Comme enregistrement et CIT de 3 mois après rétablissement complet
	MC	Comme CT / VT

Pancréatite chronique	Définition	Inflammation persistante du pancréas avec défaillance permanente de la fonction exocrine puis, au cours de l'évolution de la maladie, de la fonction endocrine. Insuffisance pancréatique. Pseudokystes. Cause : >70% pour abus d'alcool, également hypercalcémie ou obstruction des voies biliaires.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID

Parahémophilie	Se référer à	Déficit en facteur V, congénital
-----------------------	--------------	----------------------------------

Paralysie faciale centrale	Définition	Paralysie de la zone d'innervation du nerf facial causée par une lésion du nerf dans son parcours central (tractus corticoconcléaire).
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID



Paralysie faciale périphérique	Définition	Paralysie de la zone d'innervation du nerf facial causée par une lésion du nerf dans son parcours périphérique.
	Enregistrement	CIT de 3 mois après le début des symptômes, puis accepter lorsqu'il est manifeste que les symptômes régressent
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Herpes zoster
Paraplégie / Tétraplégie	Définition	Paralysie résultant d'une lésion d'une section de la moelle épinière avec perte de fonctions motrices, sensorielles ou végétatives.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
Partenaires sexuels multiples	Se référer à	Comportement à risque, sexuel et autre
Pemphigus	Se référer à	Maladie auto-immune
Péri-amygdalite	Se référer à	Amygdalite aiguë
Péricardite / épanchement péricardique	Définition	Inflammation du péricarde. Subdivision en aigu / chronique ; forme particulière : péricardite constrictive. Causes : infections (bactériennes, virales, fongiques, parasitaires), dans le cadre de maladies systémiques (p. ex. maladies auto-immunes, collagénoses, sarcoïdose, maladies endocriniennes), paranéoplasiques, posttraumatiques, idiopathiques.
	Enregistrement	Ne pas accepter, sauf en cas de post-traumatisme ou de maladie virale et de guérison complète sans traitement.
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement



Péritonite	Définition	Inflammation du péritoine. Local / diffus. Maladie rarement indépendante, généralement symptôme principal. Causes possibles: Local : le plus fréquemment en cas d'appendicite aiguë perforée, cholécystite Diffus : notamment lors de diverticulite, d'occlusion intestinale, d'infarctus mésentérique, de lésion intestinale perforée, de salpingite, de carcinose péritonéale
	Enregistrement	Accepter après rétablissement complet pour autant que la maladie de base permette un don
	CT / VT	CIT jusqu'au rétablissement complet. et 4 semaines après la fin du traitement, si la maladie sous-jacente permet de faire des dons. CID en cas de processus malin
	MC	Comme CT / VT

Personnel hospitalier	Se référer à	Activités à risque
------------------------------	--------------	--------------------



Personnes transgenres	Définition	Personnes transsexuelles, dont le sexe social diffère de leur sexe biologique. Elles ne ressentent pas d'appartenance au sexe qui leur a été attribué à la naissance. Aucun rapport avec l'orientation sexuelle.
	Enregistrement	L'enregistrement dans la banque de données internationale doit être effectué sous le sexe biologique On s'adresse au donneur sous le nom auquel il s'identifie- Tenir compte d'éventuels traitements hormonaux ou changements de sexe médicaux / chirurgicaux
	CT / VT	Accepter si les éventuels traitements hormonaux ou changements de sexe médicaux / chirurgicaux ne constituent pas une contre-indication <ul style="list-style-type: none"> • Informer les centres de prélèvement et transplantation du status transgenre • Chez des hommes trans (f → h): anamnèse de grossesses • Chez des femmes trans (h → f): prévalence globale élevée de VIH, due principalement à comportement MSM antérieur → poser la question ! <p>Aptitude à déterminer par le médecin</p>
	MC	Comme CT / VT, en plus: <ul style="list-style-type: none"> • lors d'un don, tenir compte des paramètres physiologiques (Hb, ferritine, volume sanguin) • éventuellement. test de grossesse chez les hommes trans
	Voir aussi	Comportement à risque, sexuel



Perte de connaissance	Définition	Diverses causes possible, par ex. collapsus circulatoire.
	À noter	Toujours demander / clarifier la cause de l'évanouissement.
	Enregistrement	Ne pas accepter si : <ul style="list-style-type: none"> • La personne présente une tendance aux évanouissements • La cause est une contre-indication à l'enregistrement • La cause n'est pas connue Aptitude à déterminer par le médecin
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
Voir aussi	Blessure à la tête, grave Epilepsie Hypoglycémie Hypotension Maladie cardiaque Maladie cardiovasculaire	

Petit mal	Se référer à	Epilepsie
------------------	--------------	-----------

Pharyngite	Définition	Inflammation du pharynx
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 2 semaines après arrêt de l'antibiothérapie et jusqu'au rétablissement complet
	MC	Comme CT / VT Aptitude à déterminer par le médecin

Phlébite	Se référer à	Thrombophlébite / Phlébite
-----------------	--------------	----------------------------



Phlébothrombose	Définition	Thrombose veineuse profonde
	À noter	L'administration de G-CSF constitue un facteur de risque supplémentaire. Risque d'embolie en cas de formation de caillot.
	Enregistrement	CIT de 12 mois après fin du traitement et rétablissement complet si <ul style="list-style-type: none">• Thrombose provoquée unique• Non déclenchée par une maladie de base• Aucune prédisposition familiale
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement

Phobie des aiguilles	Définition	Peur démesurée des seringues et des aiguilles.
	Enregistrement	Accepter si la donneuse ou le donneur, une fois informé-e de façon exhaustive des examens préalables et de la procédure de prélèvement de cellules souches du sang, peut envisager de s'y soumettre.
	CT / VT	Comme enregistrement Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT

Piqûre de tique	Définition	Piqûre de tique. Les tiques peuvent transmettre différentes maladies, dont la borréliose, la méningoencéphalite vernoestivale MEVE, ou la babésiose.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter si <ul style="list-style-type: none">• la piqûre remonte à au moins un mois ou que le sujet a reçu une prophylaxie secondaire de la borréliose• en l'absence de symptômes
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Babésiose Borréliose Méningoencéphalite vernoestivale (MEVE)



Pityriasis rosé de Gilbert	Définition	Exanthème passager non contagieux. Synonyme : dermatose papulosquameuse.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter si sujet totalement guéri
	MC	Comme CT / VT

Pityriasis versicolor	Définition	Mycose anodine fréquente de l'épiderme.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter si le point de ponction n'est pas touché
	MC	Comme CT / VT

Pleurésie	Définition	Inflammation de la plèvre avec fortes douleurs thoraciques à la respiration. Accompagnant généralement une maladie pulmonaire primaire ou secondaire (maladie inflammatoire locale, ischémique, infectieuse, maligne, auto-immune).
	Enregistrement	Accepter pour autant que la maladie de base le permette CIT de 4 semaines après fin du traitement (plus longtemps en cas de pleurésie TBC) et rétablissement complet Aptitude à déterminer par le médecin
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement

Pneumonie	Définition	Inflammation des poumons
	Enregistrement	Accepter après rétablissement complet (aucun trouble respiratoire résiduel) et pour autant que la maladie de base le permette
	CT / VT	CI de 4 semaines après fin du traitement et rétablissement complet (aucun trouble respiratoire résiduel) pour autant que la maladie de base le permette
	MC	Comme CT / VT



Pneumothorax	Définition	Entrée d'air généralement aiguë dans la cavité pleurale -> empêche la dilatation du poumon -> collapsus partiel ou total du poumon concerné. Peut avoir une issue fatale. <ul style="list-style-type: none"> • Pneumothorax spontané : aucune cause détectable (frappe souvent les hommes jeunes et minces) • Pneumothorax traumatique : dû à une lésion directe ou indirecte du thorax et de ses organes
	Enregistrement	Accepter si pneumothorax spontané ou traumatique après fin du traitement et rétablissement complet
	CT / VT	Comme enregistrement Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Opération moyenne_3 Opération petite_2
Poids	Enregistrement	Ne pas accepter si poids < 50 kg ou IMC ≥ 40
	CT / VT	CID si IMC ≥ 40 Ne pas accepter si poids < 50 kg
	MC	Comme CT / VT
Poliomyélite	Définition	Maladie infectieuse provoquée par les poliovirus qui frappe les motoneurones, conduisant à une paralysie permanente ; toutefois, dans 90% des cas la maladie est asymptomatique. La paralysie de la musculature respiratoire est mortelle.
	Enregistrement	Accepter en l'absence complète de symptômes
	CT / VT	Comme enregistrement Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT
Voir aussi	Handicap physique	
Polyarthrite	Se référer à	Arthrite non infectieuse



Polycytémie vraie	Définition	Maladie myéloproliférative rare avec multiplication des trois lignées de cellules sanguines en raison d'une mutation d'une cellule souche myéloïde.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Voir aussi	Maladie sanguine maligne

Polykystose rénale	Définition	Groupe de maladies des reins d'origine généralement génétique se caractérisant par la formation de multiples kystes remplis de liquide et s'accompagnant alors d'une perte progressive de fonction des reins.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID

Polypectomie intestinale	Définition	Ablation endoscopique de polypes du gros intestin.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 1 mois après intervention ou plus longtemps en fonction du degré de gravité et d'éventuelles complications Aptitude à déterminer par le médecin en fonction du résultat des tests histologiques
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Endoscopie Opération moyenne_3 Opération petite_2



Polypose familiale	Définition	Polypose adénomateuse familiale (PAF). Maladie génétique à transmission autosomique dominante avec formation de polypes adénomateux multiples dans la zone du gros intestin. Risque de dégénérescence : 70-100%
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID

Polypose intestinale	Définition	Accumulation de polypes dans la muqueuse intestinale. Dans 95% des cas, excroissances bénignes de la muqueuse ; dégénérescence maligne possible.
	Enregistrement	Accepter si forme non familiale (p. ex. polypose juvénile), sinon CID
	CT / VT	Comme enregistrement et CIT en cas de symptômes
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Endoscopie Polypose familiale

Polytraumatisme	Définition	Lésions simultanées de plusieurs zones du corps dont une lésion au moins ou la combinaison de plusieurs peut avoir une issue fatale.
	Enregistrement	Ne pas accepter tant que dure le traitement Aptitude à déterminer par le médecin.
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Opération grande_4 Opération moyenne_3 Transfusion sanguine



Porphyries	Définition	Groupe de maladies métaboliques s'accompagnant d'un trouble de la synthèse de l'hémoglobine. Cause : généralement génétique, rarement secondaire p. ex. suite à un dysfonctionnement hépatique, un empoisonnement au plomb, une hémochromatose, une anémie hémolytique, une leucémie.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement

Porteuse du BRCA1	Définition	Mutation perte de fonction ou délétion du gène BRCA1, augmente la probabilité de cancer (en particulier des seins ou des ovaires).
	Enregistrement	Ne pas accepter, si connu
	CT / VT	Ne pas accepter si la donneuse ne bénéficie pas d'un contrôle complet régulier selon les directives de l'OFSP Aptitude à déterminer par le médecin Informez le centre de transplantation
	MC	Comme CT / VT L'acceptation du risque revient au centre de transplantation

Précancereux	Définition	Stade antérieur au cancer
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Voir aussi	Basaliome Carcinome du col utérin in situ Œsophage de Barrett



Proctite	Définition	Inflammation douloureuse de la muqueuse du rectum souvent étendue à l'anus. La proctite infectieuse survient avant tout lors d'une maladie sexuellement transmissible. Cause fréquente : rapport sexuel anal réceptif non protégé. Peut aussi survenir en cas de maladies intestinales inflammatoires chroniques.
	Enregistrement	Accepter si : <ul style="list-style-type: none"> • Cas clarifié • Une éventuelle maladie de base le permet
	CT / VT	Comme enregistrement et CIT jusqu'à la résorption de l'inflammation
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Comportement à risque, sexuel Maladie auto-immune Maladie sexuellement transmissible

Professions ou loisirs dangereux	Définition	Concernant la reprise du travail après le don, des dispositions particulières peuvent s'appliquer aux personnes qui pratiquent une profession comprenant une responsabilité majeure pour d'autres personnes (p. ex. pilote d'avion, conducteur de train, de bus) ou une profession dangereuse (p. ex. conducteur de machines lourdes, grutier, couvreur, personne devant grimper sur des échelles ou des échafaudages, plongeur). Chez les pilotes p. ex. un contrôle médical additionnel peut être nécessaire après le don voir une libération par le service médical aéronautique. Ces dispositions spéciales doivent être clarifiées avant le don. Lors de loisirs comme plongée sous-marine, parapente, pilotage d'avion et de planeur, escalade, course automobile ou de moto: un entretien avec le centre de prélèvement est nécessaire pour déterminer le délai recommandé d'attente avant la reprise de l'activité. Au sportifs de haut niveau il est recommandé de cesser l'entraînement pendant au moins une semaine.
---	------------	---



Prolactinome	Définition	Tumeur bénigne (adénome) du lobe antérieur de l'hypophyse qui produit la prolactine, conduit à l'hyperprolactinémie
	Enregistrement	Ne pas accepter même si traité / opéré
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
Prolapsus utérin, opération	Se référer à	Opération moyenne_3
Propecia	Se référer à	Médicaments tératogènes
Proscar	Se référer à	Médicaments tératogènes
Prostatectomie	Voir aussi	Opération grande_4 Opération moyenne_3
Prostitution	Définition	Rapports sexuels rémunérés (services sexuels en échange d'argent, de drogues ou de médicaments)
	À noter	Voir DOK_269_Classification_Risk_Behaviour
	Voir aussi	Comportement à risque, sexuel
Prothèse de la hanche	Se référer à	Opération moyenne_3
Prothèse du genou	Se référer à	Opération moyenne_3
Pseudokystes pancréatiques	Se référer à	Pancréatite chronique



Pseudoxanthome élastique (PXE)	Définition	Syndrome de Grönald-Strandberg. Maladie génétique à transmission autosomique dominante ou récessive caractérisée par une calcification des fibres élastiques du tissu conjonctif. Les fibres deviennent cassantes et se fragmentent en petits morceaux. La maladie touche les yeux, la peau, le système cardiovasculaire, le tractus gastro-intestinal. Complication : risque accru d'hémorragie
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Voir aussi	Stries angioïdes
Psoriasis	Définition	Maladie inflammatoire chronique de la peau et de certains autres organes, avant tout des articulations (arthrite psoriasique). Maladie auto-immune, généralement héréditaire. Peut être aggravée / déclenchée par le G-CSF
	Enregistrement	Ne pas accepter sauf en cas de: <ul style="list-style-type: none"> • Psoriasis capitis (psoriasis du cuir chevelu) • Psoriasis guttata (psoriasis en goutte)
	CT / VT	Accepter en cas de forme modérée (seul traitement topique) et si les points de ponction ne sont pas touchés Seul don de moelle osseuse admis, information à transmettre au centre de transplantation Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT, formulaire Risk acceptance à signer par le centre de transplantation
	Voir aussi	Maladie auto-immune Psoriasis capillaire Psoriasis en gouttes
Psoriasis capillaire	Définition	Forme particulière de psoriasis. Forme de psoriasis circonscrite au cuir chevelu et à l'évolution généralement chronique
	Voir aussi	Psoriasis



Psoriasis en gouttes	Définition	Forme particulière de psoriasis, qui se manifeste le plus souvent chez les enfants et les adolescents, souvent comme première manifestation du psoriasis, avec des petites plaques rouges ou rosées, recouvertes de squames et prurigineuses. En général sur le tronc, les faces d'extension des extrémités et parfois le cuir chevelu. le plus souvent suite à une infection (par ex. infection à streptocoque). Souvent guérison spontanée, surtout chez des enfants, mais peut aussi passer à une forme classique de psoriasis, avec évolution chronique
	Voir aussi	Psoriasis

Psychose	Définition	Trouble psychique aigu grave accompagné d'une perte provisoire de contact avec la réalité de gravité variable.
	Enregistrement	Accepter, 5 ans après arrêt du traitement médicamenteux si épisode unique. Ne pas accepter si deux épisodes ou plus.
	CT / VT	Comme enregistrement Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Névrose Schizophrénie Traitement au lithium

Purpura thrombotique thrombocytopenique	Définition	Maladie aiguë fulminante qui s'accompagne d'une thrombocytopenie et d'une anémie hémolytique microangiopathique.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement



Pyélonéphrite	Définition	Inflammation du bassinnet d'un seul rein généralement avec atteinte du parenchyme rénal due le plus souvent à une infection bactérienne.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CI de 4 semaines après arrêt de l'antibiothérapie et rétablissement complet
	MC	Comme CT / VT
Reflux œsophagien	Se référer à	Œsophagite
Refroidissement	Se référer à	Infection des voies respiratoires supérieures
Régime amaigrissant, injection de hCG	Définition	Traitement amaigrissant : injections quotidiennes de hCG combinées à un régime personnalisé extrêmement hypocalorique (<500kcal/j), protéiné et pauvre en hydrates de carbone et en graisses – le but de ce régime étant de perdre du tissu adipeux sans perdre de tissu musculaire
	Enregistrement	Accepter un mois après la fin du régime sans complication
	CT / VT	Comme enregistrement et information au centre de transplantation
	MC	Comme CT / VT
Rétinite pigmentaire	Définition	Rétinite pigmentaire. Dégénération de la rétine avec destruction progressive des photorécepteurs. Génétique ou survenant par mutation spontanée.
	Enregistrement	Accepter, pourvu que sans relation avec un autre syndrome (p.ex. Maladie de Refsum)
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Handicap physique Maladie de Refsum



Rhinite	Voir aussi	Allergie Sinusite (rhinosinusite) aiguë Sinusite (rhinosinusite) chronique
----------------	------------	--

Rhume des foins	Définition	Inflammation allergique de la muqueuse nasale due au pollen (rhinite), pollinose.
	À noter	Informez des allergies le centre de prélèvement et le centre de transplantation
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CI si symptômes sévères pendant la saison du pollen Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Allergie

Roaccutan	Se référer à	Médicaments tératogènes
------------------	--------------	-------------------------

Rosacée	Définition	Affection dermatologique inflammatoire chronique, fréquente, se manifestant par des rougeurs, des papules et des pustules sur le visage. Dans les cas graves, le tableau clinique se complique avec des hyperplasies du tissu conjonctif et des glandes sébacées (formation de nodules). Cause multifactorielle : notamment inflammation neurogénique, trouble de la régulation des vaisseaux, trouble du système immunitaire. Différents facteurs déclencheurs.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID

Rotavirus	Se référer à	Maladie diarrhéique
------------------	--------------	---------------------



Rougeole	Définition	Maladie infectieuse hautement contagieuse frappant avant tout les enfants. Virus à RNA de la famille des paramyxovirus. Risque de complications potentiellement mortelles comme la pneumonie ou l'encéphalite.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 1 mois après le rétablissement complet
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Maladie infantile, contact

Rubéole	Définition	Maladie infectieuse hautement contagieuse déclenchée par le virus de la rubéole et qui confère une immunité à vie ; compte parmi les maladies infantiles.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 1 mois après fin du traitement et rétablissement complet
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Maladie infantile, contact

Rupture du ligament, opération	Se référer à	Opération petite_2
---------------------------------------	--------------	--------------------

Saignée par sangsues	Enregistrement	Accepter si la maladie de base le permet
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Maladie vasculaire veineuse



Saignement de nez	Définition	Epistaxis. Cause généralement locale et non dangereuse, mais peut aussi être le symptôme d'une maladie générale et être grave/potentiellement mortelle.
	Enregistrement	Accepter sauf si grave, apparaissant régulièrement et de cause non déterminée
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement

Salmonella typhi et paratyphi	Se référer à	Fièvre typhoïde/paratyphoïde
--------------------------------------	--------------	------------------------------

Salmonellose, contact	Se référer à	Maladie diarrhéique, contact
------------------------------	--------------	------------------------------

Salpingite	Définition	Inflammation de l'une ou des deux trompes de Fallope.
	Enregistrement	CIT de 2 semaines après fin du traitement et rétablissement complet
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement

Sarcoïdose	Définition	Inflammation granulomateuse, peut frapper n'importe quel organe, manifestation clinique la plus marquée sur le poumon.
	Voir aussi	Maladie auto-immune



Scarlatine	Définition	Maladie infectieuse bactérienne aiguë qui frappe avant tout les enfants entre quatre et sept ans. Complications possibles : fièvre rhumatismale, glomérulonéphrite, endocardite.
	Enregistrement	CIT jusqu'au rétablissement complet
	CT / VT	CIT de 2 mois après rétablissement complet
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Endocardite Fièvre rhumatismale Glomérulonéphrite

Scarlatine, contact	Enregistrement	Accepter après le contact
	CT / VT	CIT de 2 semaines
	MC	Comme CT / VT

Schistosomiase	Se référer à	Bilharziose
-----------------------	--------------	-------------

Schizophrénie	Définition	Groupe de tableaux cliniques psychiques présentant un schéma symptomatique pouvant toucher la perception, la pensée, les fonctions du moi, la volonté, la vie affective et émotionnelle, l'initiative et la psychomotricité.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID

Sclérose en plaques	Se référer à	Maladie auto-immune
----------------------------	--------------	---------------------

Sclérose latérale amyotrophique, SLA	Définition	Maladie dégénérative incurable du système nerveux moteur.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID



Séjour à l'étranger	Voir aussi	Creutzfeld-Jakob, maladie de, risque 7_séjour en Grande-Bretagne Liste des pays
Séjour en Angleterre	Se référer à	Creutzfeld-Jakob, maladie de, risque 7_séjour en Grande-Bretagne
Shigellose	Définition	Maladie diarrhéique bactérienne provoquée par des shigelles.
	Enregistrement	CIT de 6 mois après guérison complète.
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Maladie diarrhéique
Shigellose, contact	Se référer à	Maladie diarrhéique, contact
SIDA	Se référer à	VIH, infection
Sinusite (rhinosinusite) aiguë	Définition	Modification inflammatoire de la muqueuse des sinus (sinusites) et des voies nasales (rhinite) d'une durée inférieure à 12 semaines.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CI de 2 semaines après fin de l'antibiothérapie et rétablissement complet
	MC	Comme CT / VT



Sinusite (rhinosinusite) chronique	Définition	Modification inflammatoire de la muqueuse des sinus (sinusites) et des voies nasales (rhinite) d'une durée supérieure à 12 semaines.
	Enregistrement	CIT de 3 mois après rétablissement complet
	CT / VT	Comme enregistrement Ne pas accepter si forme chronique récidivante et / ou anti-biothérapie requise
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Opération moyenne_3 Opération petite_2
Situation à risque	Définition	Situation qui recèle un risque élevé d'acquérir une maladie/infection transmissible par le sang (p.ex. VHB,VHC,VIH)
	Voir aussi	Blessure par piqûre d'aiguille Comportement à risque, sexuel et autre Endoscopie
Souffle cardiaque	Définition	Bruit généralement pathologique, survenant dans ou autour du cœur qui s'entend à l'auscultation.
	Enregistrement	Accepter si asymptomatique et cas clarifié médicalement
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement Check-up médical avec examen cardiologique
Sphérocytose héréditaire	Définition	Anémie hémolytique génétique due à un défaut structurel des érythrocytes.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Voir aussi	Anémie hémolytique



Spina bifida	Définition	Défaut de développement ou de fermeture de la moelle épinière/de la colonne vertébrale de l'enfant dans l'utérus. Les symptômes varient selon la gravité du défaut. Dans certains cas, il ne subsiste que de légers symptômes, voire aucun, alors que, dans d'autres, le défaut peut entraîner de graves troubles neurologiques en dessous de la lésion. On distingue entre le spina bifida occulta et le spina bifida aperta.
	Enregistrement	Accepter : spina bifida occulta sans : <ul style="list-style-type: none">dérivation permanentecathétérisme de la vessiedécubitus Ne pas accepter : Spina bifida aperta Aptitude à déterminer par le médecin
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Creutzfeldt-Jakob, maladie de, risque 3_Opération du cerveau ou de la moelle épinière

Splénectomie	Définition	Ablation chirurgicale de la rate.
	Enregistrement	CIT de 6 mois après l'opération et jusqu'au rétablissement complet si la cause est traumatique ou ne constitue pas un critère d'exclusion
	CT / VT	Comme enregistrement Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Opération grande_4



Spondylarthrite ankylosante	Définition	Maladie de Bechterew. Maladie systémique inflammatoire rhumatismale, séronégative et chronique, provoquant des douleurs et une perte de souplesse des articulations. Touche avant tout les articulations de la colonne vertébrale (atteinte distale) et les articulations sacro-iliaques. Souvent associé à l'antigène HLA B-27. Maladie auto-immune
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Voir aussi	Maladie auto-immune
Spondylodèse, opération	Se référer à	Opération grande_4
Stérilisation	Voir aussi	Opération moyenne_3 Opération petite_2
Stérilité	Définition	Infertilité. Toujours déterminer la cause.
	Enregistrement	Ne pas accepter si <ul style="list-style-type: none"> • Cause en cours d'examen • Traitement médical par tamoxifène • Transfert d'ovule ou d'embryon de donneurs non apparentés • Traitement hormonal d'origine humaine avant 1986 • La cause constitue une contre-indication au don Aptitude à déterminer par le médecin
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Clomid®



Stomie	Définition	Déviations chirurgicales d'un conduit naturel entre un organe creux et la peau extérieure (p. ex. entérostomie, trachéostomie).
	Enregistrement	Ne pas accepter, sauf après stomie provisoire et si la maladie de base ne constitue pas un critère d'exclusion
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Opération grande_4 Opération moyenne_3

Stries angioïdes	Définition	Déchirures bilatérales de la membrane de Bruch (membrane élastique de la rétine) dues à une calcification. Survenant souvent en association avec d'autres maladies, dont : pseudoxanthome élastique, syndrome d'Ehlers-Danlos, maladie de Paget, drépanocytose, autres hémoglobinopathies
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Voir aussi	Anémie falciforme Syndrome d'Ehlers-Danlos

Surdité brutale neurologique	Définition	Perte de l'audition survenant brusquement, généralement dans une seule oreille, sans facteur déclenchant. Peut être légère ou mener jusqu'à la surdité définitive. Causée vraisemblablement par des troubles de perfusion de l'oreille interne.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID

Syncope	Se référer à	Perte de connaissance
----------------	--------------	-----------------------



Syndrome d'Ehlers-Danlos	Définition	<p>Groupe hétérogène de troubles congénitaux du tissu conjonctif / de la synthèse du collagène se caractérisant par une élasticité excessive de la peau et une hyperlaxité des articulations. Touche aussi les vaisseaux sanguins, les muscles, les tendons, les ligaments, les organes internes.</p> <p>Conséquences: déchirement facile des structures concernées, avant tout des parois des vaisseaux sanguins -> hémorragies, rupture de l'intestin, hernies, déviation de la colonne vertébrale, pneumothorax récidivants.</p>
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID

Syndrome d'Alport	Définition	<p>Maladie héréditaire chronique progressive accompagnée d'une insuffisance rénale. Transmission dominante à 80%, transmission autosomique récessive à env. 10% et nouvelles mutations dans env. 10% des cas. Conséquences : anomalies de structure du collagène de type IV, constituant de la membrane basale de l'oreille interne et des reins -> atteinte cochléaire et insuffisance rénale chronique progressive ; possibilité d'anomalies oculaires.</p>
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID



Syndrome d'Asperger	Définition	Trouble grave du développement faisant partie des troubles du spectre autistique et se caractérisant principalement par des difficultés à établir des interactions sociales et à manifester de l'empathie. QI normal à élevé, talents extraordinaires, développement normal, souvent précoce, du langage.
	Enregistrement	<p>Accepter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si le donneur est capable de discernement et de consentement • S'il comprend la procédure de prélèvement • Si l'état du donneur est stable (indépendamment du traitement médicamenteux) <p>Important: Poser des questions sur la situation professionnelle, sur d'éventuelles restrictions au quotidien</p>
	CT / VT	<p>Comme enregistrement , réévaluation de l'état et d'éventuelles restrictions</p> <p>Aptitude à déterminer par le médecin</p>
	MC	<p>Comme CT / VT</p> <p>Aptitude à déterminer par le médecin</p>
Syndrome d'hypermobilité	Se référer à	Syndrome d'Ehlers-Danlos
Syndrome de Cushing	Définition	Hypercortisolisme dans le sang provoquant des modifications physiques. Les causes peuvent être d'origine centrale, surrénale, ectopique (paranéoplasique) ou iatrogène.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
Syndrome de Flammer	Définition	Dérèglement vasculaire sporadique, focal ou généralisé.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
Syndrome de Gilbert	Se référer à	Maladie de Meulengracht



Syndrome de Guillain-Barré	Se référer à	Maladie auto-immune
Syndrome de Klinefelter	Définition	Anomalie chromosomique numérique XXY
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter
	MC	Accepter
Syndrome de l'intestin irritable (SII)	Définition	Syndrome du côlon irritable. Maladie intestinale fonctionnelle, fréquente, sans cause organique identifiable (CID !)
	Enregistrement	Accepter si les troubles sont contrôlables
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement Aptitude à déterminer par le médecin
Syndrome de Lyell	Définition	Epidermolyse toxique aiguë, nécrolyse épidermique toxique (NET). « Syndrome de la peau échaudée ». Affection cutanée aiguë rare se manifestant par la destruction et le détachement de l'épiderme. Dermatose potentiellement mortelle, taux de mortalité : 25-70% selon étendue. 2 formes : - médicamenteuse : allergie gravissime à des médicaments, notamment aux antibiotiques (sulfonamide), aux anti-épileptiques (phénytoïne), aux analgésiques, aux ARNS (méfamizole, ibuprofène, diclofénac), à l'allopurinol. - staphylogène : due à l'exotoxine du staphylocoque doré, touche avant tout les nouveau-nés au cours des trois premiers mois de vie ou les adultes immunodéprimés. Débute souvent par un impétigo localisé. La NET est la forme la plus grave de l'épidermolyse toxique. Le syndrome de Stevens-Johnson (SSJ) en constitue le « stade préalable ».
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Syndrome de Stevens-Johnson



Syndrome de Marfan	Définition	Maladie génétique du tissu conjonctif (faiblesse du tissu conjonctif), à transmission autosomique dominante. Sont touchés avant tout le squelette, le système cardiovasculaire et les yeux, manifestations de degré variable. Exemples de caractéristiques : Squelette : anatomie longue et fine (taille élevée) avec extrémités et doigts particulièrement allongés (arachnodactylie). Cœur : notamment dilatation de la racine aortique, prolapsus des valves cardiaques, insuffisance des valves cardiaques. Yeux : luxation du cristallin, myopie.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
Syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH)	Définition	Absence congénitale du vagin avec ou sans aplasie de l'utérus due vraisemblablement à une anomalie chromosomique. Trompes et ovaires normaux, d'où développement normal des caractères sexuels secondaires Fréquence : env. 1:5000 Complication : malformation concomitante éventuelle des reins ou des voies urinaires, ou du squelette (colonne vertébrale)
	Enregistrement	Accepter si fonction rénale normale et en l'absence de malformation du squelette
	CT / VT	Comme enregistrement Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT
Syndrome de Owren	Se référer à	Déficit en facteur V, congénital
Syndrome de Parkinson	Définition	Maladie de Parkinson. Maladie neurodégénérative évoluant lentement, accompagnée de symptômes moteurs et cognitifs.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID



Syndrome de Protée	Définition	Maladie génétique très rare qui se caractérise tout d'abord par une croissance anormale de certaines zones du corps (crâne, extrémités, plante des pieds) puis par la formation de tumeurs multiples, auxquelles s'ajoutent des malformations des vaisseaux sanguins, ce qui entraîne des embolies pulmonaires et des thromboses des veines profondes. Complication : risque accru de thromboses
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID

Syndrome de Reiter	Définition	Maladie articulaire inflammatoire réactionnelle, déclenchée par une infection bactérienne et se caractérisant par la triade typique de symptômes, le syndrome oculo-urétéro-synovial, forme la plus complète de l'arthrite réactionnelle.
	Voir aussi	Maladie auto-immune

Syndrome de Sjögren	Définition	Maladie auto-immune chronique conduisant à une inflammation des glandes salivaires ou des glandes séreuses de la tête et du cou.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
Voir aussi	Maladie auto-immune	



Syndrome de Stevens-Johnson	Définition	SSJ. Compte parmi les érythèmes exsudatifs multiformes. Réaction immunologique (allergique) rare de la peau déclenchée par les cellules T provoquant une destruction et un détachement de l'épiderme. La cause est souvent médicamenteuse (50%), infectieuse (mycoplasmes, bactéries, virus) ou cancéreuse. Il s'ensuit une nécrose des kératinocytes. Muqueuses toujours (obligatoirement) associées. Mortalité : env. 6%. Taux de gravité distincts : <ul style="list-style-type: none"> • jusqu'à 10% de surface de peau touchée : SJS • 10-30% de surface de peau touchée : forme intermédiaire SSJ – NET • > 30% de surface de peau touchée : NET (NET = nécrolyse épidermique toxique, syndrome de Lyell)
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Syndrome de Lyell
Syndrome de Turner	Définition	Monosomie gonosomale, caryotype 45, X
	Enregistrement	Accepter en l'absence de malformations ou troubles fonctionnels cardiaques ou rénaux congénitaux et consentement informé possible
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Handicap physique
Syndrome de von Willebrand	Définition	Trouble génétique de la coagulation le plus fréquent à transmission autosomique dominante. Défaut de structure ou carence en facteur de von Willebrand (fvW). Le fvW est la protéine porteuse du facteur VIII.
	Enregistrement	Ne pas accepter sauf si statut de porteur du type 3
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement



Syndrome des jambes sans repos	Définition	Sensations désagréables au niveau des jambes associées à un besoin irrésistible de bouger et souvent à des mouvements involontaires. Compte parmi les hyperkinésies extrapyramidales. Maladie neurologique, prédisposition familiale, secondaire à différentes maladies de base ou métaboliques (carence en fer, grossesse, insuffisance rénale, hypo- ou hyperthyroïdie p. ex.)
	Enregistrement	Evaluer le degré de gravité, demander si le sujet souffre de restrictions dans sa vie quotidienne. Accepter, en cas de forme modérée sans restriction, que le sujet prenne ou non des médicaments
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK)	Définition	PCOD : polycystic ovarian disease. Forme particulière de kystes ovariens. Déséquilibre hormonal entraînant une dysfonction ovarienne avec oligo- ou aménorrhée, prise de poids et hyperandrogénisme. Important: exclure une tumeur lors de hypertestostéronémie ou de hyperprolactinémie (prolactinome).
	Enregistrement	Accepter si pas de complications, même sous traitement (Metformin)
	CT / VT	CIT jusqu'au rétablissement complet. en présence de complications
	MC	Comme CT / VT Aptitude à déterminer par le médecin
Voir aussi	Kyste ovarien	
Syndrome douloureux régional complexe (SDRC)	Définition	Complication d'une blessure ou d'une opération des extrémités. Syndrome posttraumatique caractérisé par des douleurs anormalement aiguës / de durée anormalement longue, des troubles de l'irrigation sanguine, des restrictions de la mobilité et des troubles de la croissance. Inflammation neuronale conduisant à une dystrophie / atrophie des membres (anciennement maladie de Sudeck)
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
MC	CID	



Syndrome du canal carpien	Définition	Syndrome de compression du nerf médian dans la région du carpe. Thérapie conservatrice ou chirurgicale.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 1 mois après l'opération et jusqu'au rétablissement complet
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Opération moyenne_3

Syndrome pieds-mains-bouche	Définition	Maladie infectieuse virale hautement contagieuse. Présente dans le monde entier, touche avant tout les enfants mais peut aussi survenir chez les adultes. Agents : avant tout les entérovirus, dont les virus Coxsackie et les entérovirus humains. Transmission par contact direct avec des liquides corporels (salive, gouttes, sécrétions de vésicules) ou transmission par voie fécale-oral. Transmission indirecte par des surfaces contaminées. Immunité uniquement contre l'agent déclencheur.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT jusqu'au rétablissement complet.
	MC	Comme CT / VT

Syndrome post-polio	Définition	Manifestation subséquente de la poliomyélite caractérisée par une fatigue, des douleurs musculaires et articulaires et une faiblesse musculaire croissantes apparaissant plusieurs décennies après l'infection.
	Voir aussi	Handicap physique



Syphilis	Définition	Vérole. Infection sexuellement transmissible contagieuse, due à la bactérie tréponème pâle.
	Enregistrement	Accepter si le traitement a réussi et que la maladie est intégralement guérie
	CT / VT	Accepter si la maladie est intégralement guérie et que les analyses de laboratoire excluent toute infection actuelle Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT Aptitude à déterminer par le médecin
	Voir aussi	Comportement à risque, sexuel

Syphilis, contacts sexuels	Enregistrement	CIT de 12 mois après le dernier contact avec partenaire infecté/e
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement

Syringomyélie	Définition	Présence de cavités contenant du liquide céphalorachidien à l'intérieur de la moelle épinière, avant tout dans la moelle cervicale / thoracique, congénitale (en association avec d'autres anomalies) ou acquise (en cas de cancer, après un traumatisme).
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID



Tatouage , piercing, maquillage (semi-)permanent, épilation électrique, microblading	Définition	Blessure par piqûre d'une aiguille de ponction ou d'injection potentiellement contaminée
	À noter	Toujours appliquer une technique de travail stérile avec aiguilles à usage unique, la prudence étant de mise en cas de tatouage / piercing dans un pays présentant un risque infectieux accru (demander! -> information au centre de transplantation)
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter seulement si aucun signe d'infection (bactérienne) et en absence de complications CIT de 1 mois après l'évènement
	MC	Accepter seulement si aucun signe d'infection (bactérienne) et en absence de complications CIT de 2 mois après l'évènement
Voir aussi	Acupuncture Blessure par piqûre d'aiguille	
TDAH	Définition	Trouble du déficit de l'attention (TDA) Trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) Trouble du comportement et de la régulation émotionnelle apparaissant à l'enfance ou à l'adolescence. Il se caractérise par un manque d'attention et de contrôle de soi et par de l'impulsivité. Les personnes atteintes de TDAH présentent en outre une agitation motrice excessive. D'intensité très variable, les symptômes ne surviennent pas toujours simultanément. En général, l'hyperactivité diminue avec l'âge.
	Enregistrement	Accepter <ul style="list-style-type: none"> • Si l'état du donneur est stable (indépendamment du traitement médicamenteux) • Si le donneur est capable de donner son consentement éclairé • S'il comprend la procédure de prélèvement et est en mesure d'assumer l'engagement pris
	CT / VT	Comme enregistrement Aptitude au don à déterminer par le médecin
	MC	Aptitude à déterminer par le médecin
Ténia	Se référer à	Echinococcose



Tension artérielle basse	Se référer à	Hypotension
Tension artérielle élevée	Se référer à	Hypertension artérielle
Thalassémie alpha	Définition	Anémie méditerranéenne. Perturbation génétique de la fabrication de l'hémoglobine.
	À noter	Informer le centre de transplantation
	Enregistrement	Accepter <ul style="list-style-type: none">• si le donneur est porteur de la maladie• en cas de thalassémie mineure si le donneur est en bonne santé et que le taux d'hémoglobine se situe dans les valeurs admises Ne pas accepter : <ul style="list-style-type: none">• en cas de thalassémie majeure et intermédiaire
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
Thalassémie bêta	Définition	Anémie méditerranéenne. Perturbation génétique de la fabrication de l'hémoglobine.
	À noter	Informer le centre de transplantation
	Enregistrement	Accepter <ul style="list-style-type: none">• si le donneur est porteur de la maladie• en cas de thalassémie mineure si le donneur est en bonne santé et que le taux d'hémoglobine se situe dans les valeurs admises Ne pas accepter : <ul style="list-style-type: none">• en cas de thalassémie majeure et intermédiaire
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement



**Thrombocytémie pri-
maire / essentielle**

Définition	Thrombocytose faisant partie des néoplasies myéloprolifératives. Production excessive continue de thrombocytes dans le sang.
Enregistrement	Ne pas accepter
CT / VT	CID
MC	CID

Thrombocytopathie

Définition	Aussi appelé thrombopathie. Altération de la fonction des thrombocytes conduisant à une prédisposition accrue aux saignements.
Enregistrement	Ne pas accepter
CT / VT	CID
MC	CID



Thrombophilie	Définition	<p>Prédisposition aux thromboses. Prédisposition génétique ou acquise à la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins (suite à une mutation des propriétés des cellules sanguines, du plasma sanguin, de la circulation sanguine ou de la paroi des vaisseaux sanguins). Prédisposition génétique dans jusqu'à 50% des cas, les facteurs de coagulation sanguine sont modifiés suite à des mutations génétiques.</p> <p>Facteurs de risque (supplémentaires) : tabagisme, excès pondéral, sédentarité, médicaments (surtout contraceptifs à base d'œstrogènes), grossesse, immobilisation.</p> <p>Facteurs les plus fréquents:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Résistance APC (mutation du facteur V de Leiden) • Carence en protéine C • Carence en protéine S • Mutation 20210 de la prothrombine • Carence en antithrombine • Anticorps antiphospholipides / anticoagulants lupiques • Thrombocytopénie induite par l'héparine de type II <p>Autres formes à discuter avec le médecin.</p>
	Enregistrement	<p>Accepter en cas de thrombophilie modérée (mutation hétérozygote du facteur V de Leiden, mutation 20210 hétérozygote de la prothrombine) si</p> <ul style="list-style-type: none"> • pas d'antécédent d'événement thromboembolique • on ne connaît à la personne aucun autre facteur de risque de <p>Ne pas accepter toute autre forme de thrombophilie</p>
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement



Thrombophlébite / Phlébite	Définition	Inflammation superficielle des veines avec / sans formation d'un caillot sanguin. Toujours déterminer la maladie de base et les facteurs de risque !
	À noter	L'administration de G-CSF constitue un facteur de risque supplémentaire. Risque d'embolie en cas de formation d'un caillot.
	Enregistrement	Accepter après épisode provoqué unique si thérapie achevée, rétablissement complet et aucune prédisposition familiale Ne pas accepter en cas d'épisodes répétés Aptitude à déterminer par le médecin
	CT / VT	CI de 1-6 mois après fin de la thérapie selon gravité du cas Comme enregistrement
	MC	Comme CT / VT
Thrombose artérielle	Se référer à	Maladie vasculaire artérielle
Thrombose coronarienne	Se référer à	Maladie cardiovasculaire
Thrombose des sinus veineux	Définition	Caillot sanguin se trouvant dans les grands confluent veineux du cerveau dans la dure-mère.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
Thrombose oculaire	Définition	Obstruction / occlusion de la veine rétinienne.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
Thrombose veineuse profonde	Se référer à	Phlébothrombose



Thrombose veineuse superficielle	Se référer à	Thrombophlébite / Phlébite
Thyroïdite	Se référer à	Maladie thyroïdienne
Thyroïdite de Hashimoto	Définition	Inflammation auto-immune de la thyroïde
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	Accepter si état stable et absence de symptôme après au moins trois mois de traitement de substitution Seul don de moelle osseuse admis, information à transmettre au centre de transplantation Ne pas accepter en cas de: <ul style="list-style-type: none">• Thyroïdite active• Prise de thyrostatiques
	MC	Comme CT / VT Formulaire Risk acceptance à signer par le centre de transplantation
	Voir aussi	Maladie thyroïdienne



Tinnitus	Définition	Nommé également acouphène. Sensation auditive non liée à un son généré par une vibration d'origine extérieure. Classification selon le degré de gravité (Biesinger et al.): Degré 1: Bonne gestion du tinnitus, pas de détresse psychologique Degré 2: Apparition du tinnitus principalement lors de silences et la gêne ressentie s'aggrave en cas de stress et de contraintes Degré 3: Le tinnitus entraîne des nuisances durables dans la vie privée comme professionnelle et, par là des troubles sur les plans émotionnel, cognitif et physique Degré 4: Le tinnitus conduit à la décompensation totale dans la vie privée, à une incapacité de travail Tinnitus pulsatile: perçu comme synchronisé avec les battements du pouls, généralement unilatéral, souvent dû à une cause vasculaire cérébrale.
	Enregistrement	Accepter si • Tinnitus de degré 1 ou 2 (pas de nuisance grave au quotidien) et • en l'absence d'une cause somatique connue Ne pas accepter en cas de • Tinnitus dès degré III (nuisance durable au quotidien, danger de décompensation) • Tinnitus pulsatile • Traitement médicamenteux régulier Sinon aptitude au don à déterminer par le médecin
	CT / VT	Comme enregistrement Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme enregistrement Aptitude à déterminer par le médecin

Toctino	Se référer à	Médicaments tératogènes
----------------	--------------	-------------------------

Toxicomanie	Se référer à	Drogue, usage de
--------------------	--------------	------------------



Toxoplasmose	Définition	Maladie infectieuse causée par le protozoaire <i>Toxoplasma gondii</i> . Zoonose touchant en premier les chats. L'être humain est un hôte intermédiaire facultatif. Chez les personnes immunocompétentes, l'infection est généralement asymptomatique. Chez la femme enceinte, l'infection peut provoquer des malformations fœtales.
	À noter	Toujours informer le centre de transplantation des résultats positifs aux tests.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 6 mois en cas d'infection actuelle établie
	MC	Comme CT / VT
Trachéite	Définition	Inflammation de la muqueuse de la trachée. Causes infectieuses, allergiques, chimiques ou irritations mécaniques. La trachéite aiguë est souvent la conséquence d'une infection virale des voies respiratoires ou lui est associée (p. ex. rhinotrachéite, trachéobronchite).
	Enregistrement	Accepter sauf si maladie chronique avec forte gêne respiratoire
	CT / VT	CIT jusqu'au rétablissement complet. en cas de symptômes aigus CID si maladie chronique avec forte gêne respiratoire
	MC	Comme CT / VT
	Traitement au Botox	Définition
Enregistrement		Accepter
CT / VT		Accepter en l'absence de toute manifestation d'infection (bactérienne) CIT de 1 mois après la dernière injection
MC		Accepter en l'absence de toute manifestation d'infection (bactérienne) CIT de 2 mois après la dernière injection
Voir aussi		Hyperhidrose



Traitement au laser	Définition	Application d'un laser à des fins paramédicales ou esthétiques, p. ex. pour effacer des taches cutanées, des tatouages, ou pour épiler le corps. La surface de peau traitée doit être intacte!
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter sauf en cas de détatouage --> CIT de deux semaines après la dernière séance
	MC	Comme CT / VT

Traitement au lithium	Définition	Médicament traitant les troubles bipolaires, la manie, la dépression. Médicament tératogène.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Voir aussi	Maladie psychiatrique Médicaments tératogènes

Traitement de fer	Se référer à	Anémie, carence en fer
--------------------------	--------------	------------------------

Traitement de substitution aux opiacés	Enregistrement	Accepter si: <ul style="list-style-type: none">• traitement de substitution à base de buprénorphine• mode de vie stable• à long terme Ne pas accepter si: <ul style="list-style-type: none">• traitement de substitution à base de méthadone
	CT / VT	Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Drogues, consommation par voie intra-veineuse



Traitement hormonal	Définition	Administration thérapeutique d'hormones naturelles ou synthétiques en cas de maladie ou de troubles causés par une carence hormonale. p. ex. : hormone thyroïdienne en cas d'hypothyroïdie, œstrogènes à la ménopause, somatotropine en cas de nanisme, traitement hormonal contre l'infertilité.
	À noter	Toujours déterminer la cause de la thérapie hormonale
	Enregistrement	Accepter en cas d'administration d'hormones synthétiques ou recombinantes, si la maladie de base le permet Ne pas accepter si administration d'hormones d'origine humaine
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement

Traitement médicamenteux	Enregistrement	Accepter si le donneur est stable sous le traitement médicamenteux prescrit par un médecin (p. ex. pression artérielle, diabète) Ne pas accepter si la médication est due à une maladie grave chronique Avec certains médicaments, contenant p. ex. des substances tératogènes, le donneur doit être prêt à/en mesure de suspendre la médication (p. ex. dérivés de la vit. A, finastéride, vismodegib, etc.) pour un certain temps en cas de don Vérifier la cause de la thérapie Aptitude à déterminer par le médecin
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Liste des médicaments



Transfusion sanguine	Définition	Produits sanguins labiles : CE, CP, PFC homologues. Produits sanguins stables : albumine, immunoglobulines et facteurs de coagulation extraits du plasma. Facteurs de coagulation recombinants : produits par génie génétique.
	À noter	Toujours poser question additionnelle: Quand et où la transfusion a-t-elle été effectuée?
	Enregistrement	CIT de 12 mois après transfusion dans un pays à risque élevé de VIH/SIDA, sinon accepter en fonction de l'indication
	CT / VT	CIT de 1 mois ou plus selon la situation / protection du donneur après transfusion dans un pays sans risque élevé de VIH/SIDA NB: si transfusion en Grande-Bretagne: accepter pour le CT/VT, mais toujours informer le centre de transplantation CIT de 12 mois après transfusion dans un pays à risque élevé de VIH/SIDA Si le partenaire sexuel a reçu une transfusion dans un pays à risque élevé de VIH/SIDA, se référer à "Comportement à risques, autre, B8/C8/D8"
	MC	CIT de 2 mois ou plus selon la situation / protection du donneur après transfusion dans un pays sans risque élevé de VIH / SIDA NB: si transfusion en Grande-Bretagne: Medical CheckUp ok, mais toujours informer le centre de transplantation CIT de 12 mois après transfusion dans un pays à risque élevé de VIH/SIDA Si le partenaire sexuel a reçu une transfusion dans un pays à risque élevé de VIH/SIDA, se référer à "Comportement à risques, autre; B8/C8/D8"
Voir aussi	<vide> Comportement à risque, autre, C8 Comportement à risque, autre, D8 Comportement à risque, sexuel et autre Opération_généralités_1 Polytraumatisme Situation à risque	



Transplantation allogénique	Se référer à	Creutzfeldt-Jakob, maladie de, risque 1_Greffe de tissu humain
Transplantation, autologue	Définition	Greffe/transfert de tissu d'une personne à un autre endroit de son propre corps.
	Enregistrement	Accepter si transplantation de la peau, des vaisseaux sanguins, des cheveux, des os, des ligaments ou de cartilage Ne pas accepter : Transplantation autologue de cellules souches du sang Aptitude à déterminer par le médecin en fonction de la maladie de base
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
Traumatisme crânien	Se référer à	Blessure à la tête, grave
Tretinac	Se référer à	Médicaments tératogènes
Trouble affectif bipolaire	Définition	Appelé autrefois psychose maniacodépressive, caractérisé par une alternance de niveaux complètement opposés (bipolaires) de l'énergie, de l'activité et de l'humeur.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
Trouble de la circulation cérébrale	Se référer à	Maladie cérébrovasculaire
Trouble de la coagulation	Définition	Coagulopathie. Trouble du processus de coagulation (plasmatique), induit une tendance accrue aux hémorragies (diathèse hémorragique, hémophilie) ou aux thromboses (thrombophilie, hypercoagulabilité). Héritaire ou acquis.
	Voir aussi	Hémophilie A et B Syndrome de von Willebrand Thrombophilie



Trouble du comportement alimentaire	Définition	En font partie : <ul style="list-style-type: none">• L'anorexie• La boulimie
	Enregistrement	Ne pas accepter sauf en cas de guérison complète et en l'absence de toute séquelle physiologique Aptitude à déterminer par le médecin
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
Trouble panique	Définition	Trouble anxieux se manifestant par plusieurs attaques par mois et accompagné d'une angoisse de l'attente ou conduite d'évitement et de restrictions du quotidien.
	Enregistrement	Accepter si: <ul style="list-style-type: none">• Les situations à risque sont largement connues• Les attaques de panique peuvent être contrôlées de sorte qu'il n'existe pas de risque accru de devoir interrompre une éventuelle procédure de don
	CT / VT	Comme enregistrement Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT
Trypanosoma cruzi	Voir aussi	Chagas, infection Chagas, risque de
Trypanosomiase africaine	Définition	Maladie tropicale potentiellement mortelle causée par des protozoaires et transmise par la mouche tsé-tsé se caractérisant par une confusion mentale, des troubles de la coordination et une perturbation du cycle du sommeil.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID



Tuberculose	Définition	Maladie infectieuse bactérienne causée par différents types de mycobactéries et qui frappe le plus souvent les poumons chez l'être humain. Contamination intervenant presque toujours par les gouttelettes, beaucoup plus rarement par le sang, la transplantation d'organe ou d'autres sécrétions organiques.
	Enregistrement	Accepter : <ul style="list-style-type: none"> • Si aucune infection aiguë avérée • 2 ans au minimum après fin du traitement • Si aucune récurrence
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Mantoux, test

Tuberculose latente	Définition	Détection sérologique (p. ex. Quantiferon®) d'une infection par la tuberculose sans signe de tuberculose active ou après exclusion de celle-ci.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID

Tuberculose, contact	Définition	<u>Contact avec une personne malade de la tuberculose. Le risque d'infection dépend de la fréquence, de la durée et de la proximité du contact, de la virulence de l'agent pathogène et de l'immunité de l'hôte.</u>
	Enregistrement	Accepter sauf en cas de contact régulier et étroit avec des personnes souffrant d'une tuberculose ouverte
	CT / VT	CIT de 2 mois après le dernier contact puis test de screening
	MC	Comme CT / VT



Tumeur cérébrale	Définition	Tumeur bénigne ou maligne du cerveau.
	Enregistrement	Ne pas accepter même après ablation
	CT / VT	CID
	MC	CID
Tumeur rénale bénigne	Définition	Tumeurs rénales bénignes typiques : tumeurs constituées de graisses et de vaisseaux (angiomyolipomes).
	Enregistrement	Accepter event. après excision si fonction rénale normale Aptitude à déterminer par le médecin
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
Ulcère gastrique / Ulcère duodéal	Définition	Ulcère de l'estomac ou du duodénum.
	À noter	Exclusion d'un cancer de l'estomac
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CI : <ul style="list-style-type: none"> • en cas de symptômes aigus • d'un mois après endoscopie et selon résultats d'analyse • jusqu'à l'éradication de l'<i>Helicobacter pylori</i> en cas de résultat positif au <i>H. pylori</i> Aptitude à déterminer par le médecin
MC	CI : <ul style="list-style-type: none"> • en cas de symptômes aigus • de 2 mois après endoscopie et selon résultats d'analyse • jusqu'à l'éradication de l'<i>Helicobacter pylori</i> en cas de résultat positif au <i>H. pylori</i> Aptitude à déterminer par le médecin	
Voir aussi	Endoscopie	



Urétrite	Définition	Inflammation de l'urètre
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT jusqu'au rétablissement complet. et de 2 semaines après l'arrêt de l'antibiothérapie, si urétrite aiguë CID si urétrite chronique
	MC	Comme CT / VT

Urticaire	Définition	Eruption cutanée d'origine variable (p. ex. allergie, froid, rayons UV).
	Enregistrement	Accepter si <ul style="list-style-type: none">l'agent déclencheur est connu et que la cause ne constitue pas une contre-indicationévénement unique, même si la cause n'est pas connue Considérer la fréquence et l'intensité !
	CT / VT	Comme enregistrement Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Allergie

Urticaire factice	Définition	Urticaire physique déclenché par les frottements ou les frictions de la peau ou par une pression physique sur la peau.
	Enregistrement	Ne pas accepter, si le facteur déclencheur est une "pression physique sur la peau"
	CT / VT	Comme enregistrement Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT

Vaccination	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter selon Annexe Art. 7, Vaccine Check: Délai de CIT après vaccination
	MC	Comme CT / VT



Varicectomie	Définition	Il existe différentes méthodes d'ablation des veines en cas d'insuffisance veineuse chronique (p.ex. les varices) : chimique, thermique, mécanique. En font partie : <ul style="list-style-type: none"> • Sclérothérapie • Ablation au laser / à la lumière / par radiofréquence • Ligature des veines / des veines perforantes • Stripping des veines • Crossectomie
	Voir aussi	Opération grande_4 Opération moyenne_3 Opération petite_2
Varicelle	Se référer à	Herpes zoster
Varices œsophagiennes	Se référer à	Hypertension portale
Varices, jambes	Définition	Varices
	Enregistrement	Accepter si <ul style="list-style-type: none"> • Aucune complication inflammatoire ou thrombotique • Stade variqueux ≤ C2 selon classification CEAP, c-à-d. aucun œdème ni modification cutanée
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Hypertension portale Phlébothrombose Varicectomie
Vasectomie	Se référer à	Stérilisation
Veines variqueuses	Se référer à	Varices, jambes



Verrues	Définition	Petites tumeurs épithéliales fréquentes de la couche supérieure de la peau, clairement circonscrites, contagieuses selon les circonstances et causées par le virus du papillome humain.
	Enregistrement	Accepter si les verrues cutanées ne sont traitées que localement et que la peau est intacte
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Verrues génitales
Verrues génitales	Définition	Condylomes acuminés. L'une des maladies sexuellement transmissibles les plus fréquentes causée par le virus du papillome humain.
	Enregistrement	Accepter si l'anamnèse ne révèle aucune autre maladie sexuellement transmissible
	CT / VT	Comme enregistrement et information au centre de transplantation si symptomatique
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Comportement à risque, sexuel Virus du papillome humain (VPH)
Vertiges	Définition	Illusion de mouvement, diverses causes possibles.
	Enregistrement	CIT tant que en cours de clarification, sinon décision en fonction de la cause des vertiges Aptitude à déterminer par le médecin
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Maladie cérébrovasculaire Maladie de Menière Migraine Neurinome de l'acoustique
Vésicule biliaire, opération	Se référer à	Opération moyenne_3



Vice valvulaire	Définition	Trouble congénital ou acquis de la fonction des valves cardiaques ; peut toucher chacune des quatre valves et être causé par une sténose (rétrécissement), une insuffisance (incapacité à se refermer) ou les deux (vice combiné). Les vices valvulaires peu sévères ne provoquent pas de symptôme selon les cas. Les vices symptomatiques requièrent généralement une intervention chirurgicale (reconstruction ou remplacement des valves).
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
VIH, comportement sexuel à risque	Se référer à	Comportement à risque, sexuel
VIH, infection	Définition	Infection par le virus VIH, test positif pour le VIH
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
Virus du Nil occidental, histoire de	Définition	Maladie infectieuse survenant principalement chez les oiseaux et qui est transmise à l'être humain par des moustiques. L'évolution est asymptomatique dans 80%, sinon, se manifeste par des symptômes de type grippal.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 4 mois après le diagnostique ou le début de symptômes Informez le centre de transplantation du résultat positive / de la maladie. Lors d'un cas très urgent, le centre de transplantation peut décider de raccourcir la durée du CIT, en acceptant le risque, si le donneur est asymptomatique -> voir " Virus de West Nile, risque de "
	MC	Comme CT / VT



Virus du Nil occidental, risque

Définition	Séjour dans une zone à risque (Annexe Art. 7, Travel-check). Tester généralement pendant la saison.
Enregistrement	Accepter
CT / VT	<p>Si de retour depuis > 4 mois avec ou sans symptômes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • accepter • sans CIT • sans test <p>Si de retour depuis < 4 mois, sans symptômes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • accepter • sans CIT • sans test (test effectué au moment du MC) <p>Si de retour depuis < 4 mois, avec symptômes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accepter pour CT • Tester avec NAT, au plus tôt 5 jours après le retour! <p>Si NAT négatif: accepter, si donneur asymptomatique. Si symptômes résiduels → aptitude à déterminer par le Médecin</p> <p>Si NAT positif: CIT de 4 mois après le retour ou début de symptômes (risque pour le patient)</p> <p>Informez le centre de transplantation d'un résultat positif, le transplantateur peut décider de raccourcir la durée du CIT en acceptant le risque. Dans ce cas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIT de 3 semaines (au minimum) • puis répéter le NAT • si NAT négatif: accepter • si NAT positif: CIT d' encore 3 semaines et répéter le NAT



MC

Date du MC fixée entre juillet et décembre:

Effectuer le test NAT **dans tous les cas**. En cas de voyage, **au plus tôt 5 jours après le retour de la zone à risque**.

Date du MC fixée entre janvier et juin:

Si de retour depuis **> 4 mois**, avec ou sans symptômes

- accepter
- sans CIT
- sans test

Si de retour depuis **< 4 mois**, avec ou sans symptômes:

- tester avec NAT, **au plus tôt 5 jour après le retour, sans exceptions!**
- les IgG et IgM peuvent être analysés sur demande

Si NAT **négatif** et donneur **asymptomatique**:

Accepter

Si NAT **positif**: CIT de 4 mois après le retour ou début de symptômes (risque pour le patient). Informer le centre de transplantation d'un résultat positif. Le transplantateur peut décider de raccourcir la durée du CIT en acceptant le risque. Dans ce cas:

- CIT de 3 semaines (au minimum)
- puis répéter le NAT
- si NAT **négatif** -> répéter de nouveau le NAT après une semaine et **accepter si NAT 2 fois négatif**
- si NAT **positif**: CIT d'encore 3 semaines et répéter le NAT



Virus du papillome humain (VPH)	Définition	Virus à ADN qui infecte par contact direct (sexuel, oral, cutané) la peau et les muqueuses. Manifestations cliniques de la contamination: verrues génitales, verrues vulgaires et verrues plantaires. Le virus VPH est responsable des infections sexuellement transmissibles les plus fréquentes. Certains génotypes du VPH (types à potentiel cancérogène élevé) sont souvent associés aux cancers, surtout du col de l'utérus. Le virus peut rester inactif après l'infection et se manifester seulement plusieurs mois plus tard. Vaccination préventive possible
	Enregistrement	Accepter en l'absence d'autres maladies sexuellement transmissibles à l'anamnèse
	CT / VT	Comme enregistrement et information au centre de transplantation si symptomatique
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Comportement à risque, sexuel

Virus Zika, histoire de	Définition	Infection virale transmise par un moustique avec des symptômes de type grippal mais dans env. 80 % des asymptomatique. Infection chez une femme enceinte.peut entraîner des lésions du fœtus.
	À noter	Etendue actuelle visible sur les cartes du CDC (Centre for Disease Control and Prevention, USA): https://www.cdc.gov/zika/areasatrisk.html
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	CIT de 4 mois après le diagnostique ou le début de symptômes Informier le centre de transplantation du résultat positive NAT / de la maladie. Lors d'un cas urgent, le centre de transplantation peut décider de raccourcir la durée du CIT, en acceptant le risque, si le donneur est asymptomatique -> voir "Virus Zika, risque de"
	MC	Comme CT / VT



Virus Zika, risque	Définition	Séjour dans une zone à risque de virus Zika (voir liste des pays à risque ou cartes du CDC).
	À noter	Etendue actuelle visible sur les cartes du CDC (Centre for Disease Control and Prevention, USA): https://www.cdc.gov/zika/areasatrisk.html
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	<p>Si de retour depuis > 4 mois avec ou sans symptômes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • accepter • sans CIT • sans test <p>Si de retour depuis < 4 mois, sans symptômes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • accepter • sans CIT • sans test <p>Si de retour depuis < 4 mois, avec symptômes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accepter pour CT / VT • Tester avec NAT, au plus tôt 5 jours après le retour! <p>Si PCR négatif: accepter, si donneur asymptomatique. Si symptômes résiduels : aptitude à déterminer par le Médecin</p> <p>Si PCR positif: CIT de 4 mois après le retour ou début de symptômes (risque pour le patient)</p> <p>Informez le centre de transplantation d'un résultat positif. Le transplantateur peut décider de raccourcir la durée du CIT en acceptant le risque -> dans ce cas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIT de 3 semaines (au minimum), puis répéter le PCR • si PCR négatif: accepter • si PCR positif: CIT d' encore 3 semaines et répéter le PCR



MC

Si de retour depuis **> 4 mois**, avec ou sans symptômes
 • accepter
 • sans CIT
 • sans test

Si de retour depuis **< 4 mois**, avec ou sans symptômes:
 • tester avec PCR, **au plus tôt 5 jour après le retour, sans exceptions !**
 • les IgG et IgM peuvent être analysés sur demande

Si PCR **négative et donneur asymptomatique**: Accepter.
 Si PCR **positif**: CIT de 4 mois après le retour ou début de symptômes (risque pour le patient).

Informez le centre de transplantation d'un résultat positif. Le transplantateur peut décider de raccourcir la durée du CIT en acceptant le risque -> dans ce cas ->

- CIT de 3 semaines (au minimum)
- puis répéter le PCR
- si PCR négatif -> répéter de nouveau le PCR après une semaine et **accepter si PCR 2 fois négatif**
- si PCR **positif**: CIT d' encore 3 semaines et répéter le PCR

Vismodegib	Se référer à	Médicaments tératogènes
Vitiligo	Définition	Dermatose fréquente caractérisée par l'apparition de taches blanches sur la peau, significatives sur le plan cosmétique. Cette dépigmentation s'explique par la disparition des mélanocytes, cellules de l'épiderme.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	Accepter Seul don de moelle osseuse admis, information à transmettre au centre de transplantation Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT, formulaire Risk acceptance à signer par le centre de transplantation
Xénotransplantation	Se référer à	Creutzfeldt-Jakob, maladie de, risque 4_Greffe de tissu animal



Yersiniose à Yersinia enterocolitica Se référer à Maladie diarrhéique

Zona Se référer à Herpes zoster