



Criteria d'attitudine – Donazione di cellule staminali del sangue

Documentazione e principi generali

I criteri di attitudine / idoneità alla donazione di cellule staminali del sangue costituiscono le basi a salvaguardia della sicurezza della donatrice e del ricevente e sono vincolanti. Vengono applicate durante tutto il processo di donazione di cellule staminali del sangue, compresa la donazione di linfociti (DLI) (registrazione, tipizzazione di controllo, check-up medico).

I criteri vengono redatti in conformità con le leggi, gli standard e le direttive vigenti a livello nazionale e internazionale e aggiornati periodicamente dal gruppo di lavoro competente.

I criteri di idoneità sono classificati in ordine alfabetico. Il documento è disponibile sul sito Internet [prescrizioni.donazione-cellule-staminali-sangue.ch](https://www.blutspende.ch/prescrizioni-donazione-cellule-staminali-sangue) di Trasfusione CRS Svizzera. Viene completato dai seguenti documenti contenuti nelle prescrizioni di Trasfusione CRS Svizzera e di SBSC:

- [Online Travelcheck](#) o [Allegato Art. 7.2, Travelcheck](#): Paesi o aree rischio di malattie infettive
- [Online Vaccine Check](#) o [Allegato Art. 7.3, Vaccine Check](#): controllo vaccinale
- [Allegato Art. 7.1, Medicamenti](#): Termini di CIT a causa / a seguito dell'assunzione di medicinali
- 1415_DOK_Classification_Risk_Behaviour
- 1409_DOK_Procedure_Malaria_CT_MC

Inoltre, per la valutazione del rischio di malattie trasmissibili **devono essere considerate anche eventuali decisioni recenti** di SBSC o del STR ([decisioni SBSC](#); [decisioni BSD](#)).

L'idoneità viene accertata da personale specializzato sotto la responsabilità di una medica o un medico (SBSC, SRTS, centro di prelievo). Se dal colloquio, e quindi dall'accertamento, emergono elementi o risultati che mettono in dubbio l'attitudine, questi devono essere interpretati e valutati in base ai criteri. In caso di CIT o di esclusione il donatore o la donatrice deve ricevere una spiegazione dettagliata sul motivo.

Se sussistono dubbi sull'idoneità, oppure si sospetta o si individua un rischio per la salute del donatore o della ricevente e questo rischio non è descritto nei criteri o lo è insufficientemente, la decisione spetta al medico o alla medica competente. Qualora siano necessari chiarimenti, il servizio medico di SBSC rimane a disposizione.

Protezione del donatore / protezione del paziente

SBSC e i centri di prelievo sono responsabili della protezione del donatore o della donatrice contro i rischi legati a una donazione. Per questo motivo, i criteri di idoneità alla donazione devono essere rigorosamente rispettati in caso di rischio **per il donatore**.

Nelle situazioni in cui il centro di prelievo valuta il donatore idoneo a donare, ma sussiste un **rischio per il o per la paziente** (ad es. soggiorno del donatore in una zona in cui la malaria è endemica), vi è un certo margine di manovra nell'applicare i criteri di idoneità alla donazione, nel senso che sono possibili deroghe (ad es. riduzione del termine di CIT dopo un soggiorno all'estero). Ogni caso deve essere esaminato e valutato individualmente.

Eventuali deroghe devono essere discusse con il Servizio medico di SBSC. Il registro/centro di trapianto che ha conferito il mandato viene informato da SBSC in merito al rischio e coinvolto nella decisione sul seguito della procedura. Spetta alla medica responsabile del trapianto accettare o rifiutare un rischio per un paziente (2097_FOR_Declaration_Risk_Acceptance).

Nr: 1412	Name: DOK_Donor_Eligibility_Criteria-Blood_Stem_Cell_Donation_I	Version: 10.0	Gültig ab: 14.08.2026
			Seite: 1 von 187



Terminologia impiegata nel documento

Contro-indicazione definitiva, CID	Misura illimitata nel tempo. La donatrice o il donatore viene ritirato dal registro e deve esserne informato in modo per lui comprensibile
Contro-indicazione temporanea, CIT	Misura limitata nel tempo. Il donatore o la donatrice deve sapere quando e come sarà di nuovo ammesso
Accettare	La donatrice o il donatore è ammesso alla registrazione come donatore di cellule staminali del sangue, alla tipizzazione di controllo o al check-up medico
Rinvio a	La voce indicata deve essere consultata, poiché vi figura il procedimento da seguire per questo criterio (stesso procedimento)
Vedere anche	Se necessario, consultare anche la voce indicata
Nota bene	Indicazione particolare che deve essere considerata per il criterio in questione
Complemento	Aiuto per la decisione
CT / VT	Tipizzazione di controllo (Confirmatory Typing / Verification Typing)
MC	Check-up medico (Medical CheckUp)



Aborto	Definizione	Interruzione di gravidanza, aborto spontaneo
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CI dalla data del termine, per il numero di mesi di gravidanza (gravidanza prima della fine della 28a settimana) CIT di 12 mesi se interruzione di gravidanza nel 3° trimestre (> 28 settimane)
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Operazione_in generale_1
Aborto spontaneo	Rinvio	Aborto
Acicutan	Rinvio	Medicamenti teratogeni
Acne	Definizione	Malattia dell'apparato pilo-sebaceo (ghiandole sebacee e follicoli piliferi) con formazione all'inizio di comedoni non infiammatori, in un secondo momento di efflorescenze infiammatorie come papule, pustole e noduli. Trattamento a seconda della gravità, locale o sistemico
	Nota bene	Informazione al centro di trapianto
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare se il donatore è disposto a / o se è possibile interrompere il trattamento medicamentoso prima della donazione
	MC	Come CT / VT Interrompere 4 settimane prima del prelievo in caso di impiego di isotretinoina orale (Curakne®, Roaccutan®, Tretinac®), tretinoina (Vesanoid®) o alitretinoina (Toctino®) Interrompere 2 settimane prima del prelievo in caso di impiego di retinoidi topici (Roaccutan® Gel, Differin®) e/o antibiotici orali
Vedere anche	Acne inversa	



Acne inversa	Definizione	Patologia infiammatoria cronica della pelle, caratterizzata da noduli dolorosi che possono trasformarsi in ascessi e fistole e che si localizzano tipicamente in ascelle, inguine, zona genitale e anale. Il trattamento, a seconda della gravità, può essere farmacologico e/o chirurgico.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare nei casi lievi con singole infiammazioni locali e non estese Non accettare se: <ul style="list-style-type: none">• Infestazione estesa• Formazione di fistole• Terapia sistemica Valutazione dell'idoneità alla donazione da parte di una medica
	MC	Come CT / VT

Acromegalia	Definizione	Malattia endocrinologica. Ipertrofia delle ossa acrali (estremità, parti del corpo sporgenti, ad es. mento) dovuta all'eccessiva produzione dell'ormone della crescita somatropina. È causata perlopiù da un tumore benigno dell'adenoipofisi.
	Registrazione	Accettare se il tumore è stato eliminato con successo e non è necessaria una terapia medicamentosa
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione



Acufene	Definizione	<p>Detto anche «tinnito». Percezioni auditive che non possono essere attribuibili a fonti sonore esterne.</p> <p>Classificazione secondo la gravità (Biesinger et al.):</p> <p>grado 1: l'acufene è ben compensato, nessuno stress psicologico</p> <p>grado 2: l'acufene si manifesta principalmente in silenzio e ha un effetto dirompente in caso di stress e tensione</p> <p>grado 3: l'acufene porta a danni permanenti nelle aree private e professionali. I disturbi si verificano nelle aree emotiva, cognitiva e fisica.</p> <p>grado 4: l'acufene porta al completo scompenso nella sfera privata e alla disabilità professionale.</p> <p>Acufene pulsante: sincrono con il battito cardiaco, perlopiù monolaterale, è spesso dovuto a una causa correlata ai vasi sanguigni intracerebrali.</p>
	Registrazione	<p>Accettare se</p> <ul style="list-style-type: none">• grado 1 - 2 (nessuna compromissione grave nella vita di ogni giorno) e• non sono note cause somatiche <p>Non accettare in caso di</p> <ul style="list-style-type: none">• acufene a partire dal grado III (compromissione duratura nella vita di ogni giorno, pericolo decompensazione)• acufene pulsante• trattamento medicamentoso regolare <p>Altrimenti attitudine da determinare dal medico</p>
	CT / VT	<p>Come registrazione</p> <p>Valutazione dell'idoneità da parte di una medica</p>
	MC	<p>Come registrazione</p> <p>Valutazione dell'idoneità da parte di una medica</p>



ADHD	Definizione	Disturbo da deficit dell'attenzione Disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) Disturbo comportamentale ed emotivo che inizia nell'infanzia o nella gioventù. Presenta problemi di attenzione, di autocontrollo e di impulsività. Nella forma con iperattività predominante si denota un'eccessiva irrequietezza fisica. I sintomi possono tuttavia essere più o meno marcati e non insorgere necessariamente allo stesso tempo. Nella maggior parte dei casi l'iperattività diminuisce con l'avanzare dell'età.
	Registrazione	Accettare se: • lo stato del donatore è stabile (indipendentemente dal trattamento medicamentoso) • il donatore è capace di dare il proprio consenso informato • il donatore o la donatrice comprende il processo della donazione e può assumersi l'impegno
	CT / VT	Come registrazione Attitudine da determinare dal medico
	MC	Valutazione dell'idoneità da parte di una medica

Agofobia	Definizione	Forte paura di siringhe e aghi.
	Registrazione	Accettare se la donatrice o il donatore è stato pienamente informato in merito agli esami preliminari e alla procedura di donazione di cellule staminali del sangue e può immaginare di sottoporsi a un prelievo.
	CT / VT	Come registrazione Attitudine da determinare dal medico
	MC	Come CT / VT



Agonisti GLP-1	Definizione	Antidiabetici del gruppo degli agonisti GLP-1. Vengono impiegati in caso di diabete mellito di tipo 2 e per la perdita di peso. <ul style="list-style-type: none"> • Semaglutide: ad es. Ozempic®, Wegovy®, Rybelsus® • Liraglutide: ad es. Saxenda®
	Nota bene	Informare il centro di trapianto
	Registrazione	Accettare se il sovrappeso o la malattia di base lo consentono
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
Agopuntura	Definizione	Metodo di trattamento della medicina tradizionale cinese (MTC) consistente nell'inserire aghi sterilizzati in punti precisi del corpo
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare se: <ul style="list-style-type: none"> • l'agopuntura è stata eseguita in Svizzera • non vi sono dubbi sulla tecnica lavorativa sterile e sull'impiego di materiale monouso • non vi sono segnali di un'infezione (batterica) <p>CIT di 1 mese se l'agopuntura è stata eseguita in un paese con elevato rischio di infezione</p>
MC	Accettare 48 ore dopo il trattamento se: <ul style="list-style-type: none"> • l'agopuntura è stata eseguita in Svizzera • non vi sono dubbi sulla tecnica lavorativa sterile e sull'impiego di materiale monouso • non vi sono segnali di un'infezione (batterica) <p>CIT di 2 mesi dopo il trattamento se l'agopuntura è stata eseguita in un paese con elevato rischio di infezione</p>	



Alcol	Nota bene	La «capacità di giudizio» può essere compromessa sotto l'influsso dell'alcol (consenso informato)
	Registrazione	<p>Non accettare se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il donatore è regolarmente/costantemente sotto l'influsso dell'alcol • il donatore si autodichiara alcolista • il consumo supera le 40 unità a settimana • il donatore si trova in cura di disassuefazione (Antabus) <p>Una unità di alcol corrisponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 bicchiere di birra a 5% (2.5 dl) • 1 bicchiere di vino o champagne a 12% (1 dl) • 1 bicchiere di aperitivo a 20% (6 cl) • 1 bicchiere di vodka o whisky a 40% (3 cl) • 1 bicchiere di alcolpop/premix a 5% (2.5 dl)
	CT / VT	<p>Come registrazione</p> <p>Valutazione dell'idoneità da parte di una medica</p>
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Droga, consumo di

Alfa-1-antitripsina (A1AT), deficit di	Definizione	<p>Malattia ereditaria autosomica recessiva. Patologia metabolica con formazione ridotta di alfa-1-antitripsina (inibitore della proteasi, inibisce diversi enzimi che vengono liberati in caso di processi infettivi ->proteolisi illimitata). Ripercussioni tra cui nel fegato e nei polmoni.</p> <p>Fegato: secrezione di alfa-1-antitripsina ridotta, accumulo nelle cellule epatiche -> danni cellulari -> cirrosi (fino al 40%) e insufficienza epatica (circa il 15%)</p> <p>Polmoni: distruzione del tessuto connettivo polmonare a causa delle elastasi liberate dai leucociti -> enfisema polmonare progressiva</p>
	Registrazione	<p>Accettare se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nessun sintomo a livello del fegato o del polmone • stato di portatore asintomatico
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione



Alitretinoina

Rinvio

Medicamenti teratogeni

Nr: 1412	Name: DOK_Donor_Eligibility_Criteria-Blood_Stem_Cell_Donation_I	Version: 10.0	Gültig ab: 14.08.2026
			Seite: 9 von 187



Allergia	Definizione	Reazione immunologica ad allergeni (ad es. medicinali, alimenti, puntura di ape/vespa, ecc.) <u>Ripartizione in gradi delle reazioni acute:</u> grado 1: prurito, rossore, orticaria, gonfiore grado 2: grado 1, raucedine, dispnea, nausea, vomito, aumento della frequenza cardiaca, calo della pressione sanguigna, aritmia cardiaca grado 3: grado 1, vomito, gonfiore delle vie respiratorie, broncospasmo, shock grado 4: grado 1, vomito, arresto respiratorio, arresto circolatorio
	Nota bene	In caso di allergia informare sempre il centro di prelievo e il centro di trapianto Da considerare in particolare le reazioni gravi a medicinali, tra cui anestetici!!
	Registrazione	Accettare in caso di grado 1 con / senza trattamento: <ul style="list-style-type: none">soltanto trattamento locale / soltanto in caso di crisi / soltanto terapia inalatoria Non accettare se: <ul style="list-style-type: none">reazioni di grado 2 - 4necessario trattamento perorale periodiconota reazione anafilattica
	CT / VT	Accettare in caso di grado 2 se evento unico con allergene noto che non è problematico per la mobilizzazione e il prelievo Non accettare se: <ul style="list-style-type: none">grado 3 - 4 Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	Vedere anche	Allergia alimentare Asma (bronchiale) Desensibilizzazione Eczema Orticaria Raffreddore da fieno Trattamento medicamentoso



Allergia ai medicinali	Rinvio	Allergia
-------------------------------	--------	----------

Allergia alimentare	Definizione	Ipersensibilità specifica a determinate sostanze contenute negli alimenti.
	Nota bene	In caso di allergia informare il centro di prelievo e il centro di trapianto!
	Registrazione	Accettare se sintomi lievi Non accettare se anamnesi di shock anafilattico
	CT / VT	CI in caso di sintomi attuali con causa incerta Non accettare se anamnesi di shock anafilattico
	MC	CIT fino a guarigione completa dei sintomi attuali Non accettare se anamnesi di shock anafilattico
	Vedere anche	Allergia Orticaria

Allo-anticorpi anti-eritrocitari	Nota bene	Informare il centro di trapianti se presenza di allo-anticorpi anti-eritrocitari
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare
	MC	Accettare

Alocapil	Rinvio	Medicamenti teratogeni
-----------------	--------	------------------------



Alopecia	Definizione	<p>Caduta di capelli patologica, alopecia, può essere congenita o acquisita, diffusa, focale o totale.</p> <p>Forme:</p> <p><u>Alopecia diffusa</u>: caduta di capelli avanzata su tutta la testa, sintomo di diversi disturbi dell'organismo (ad es. grave patologia generale, squilibri ormonali, patologia tiroidea, carenza di vitamine/ferro, malattie infettive, medicinali, stress)</p> <p><u>Alopecia androgenetica</u>: caduta di capelli androgenetica, dovuta a fattori ereditari/ormonali. Suscettibilità del follicolo pilifero agli androgeni, circa l'80% degli uomini è interessato. Trattamento con finasteride (per gli uomini)</p> <p><u>Alopecia areata</u>: caduta dei capelli circolare. Caduta di capelli patologica, localizzata, infiammatoria. Probabilmente malattia autoimmune</p>
	Registrazione	<p>Accettare</p> <ul style="list-style-type: none"> • se lo stato generale lo consente in caso di <u>alopecia diffusa</u> • se è possibile interrompere un eventuale trattamento medicamentoso per il tempo della donazione in caso di <u>alopecia androgenetica</u> <p>Non accettare in caso di alopecia areata</p>
	CT / VT	<p>Non accettare in caso di terapia immunosoppressiva sistemica</p> <p>In caso di assunzione di medicinali teratogeni (vedi criterio Medicamenti teratogeni) (ad es. Alocapil®, Finacapil® oppure Propecia®)</p> <p>Alopecia areata: soltanto donazione di midollo osseo, informare il centro di trapianto</p> <p>Valutazione dell'idoneità da parte di una medica</p>
	MC	<p>Come CT / VT</p> <p>In caso di alopecia areata: accettazione del rischio da parte del centro di trapianto</p>
	Vedere anche	Malattia autoimmune



Alport, sindrome di	Definizione	Nefropatia cronica progressiva con insufficienza renale. L'80% è trasmesso per via ereditaria legata al cromosoma x, circa il 10% è autosomico recessivo, circa il 10% rappresenta nuove mutazioni. Conseguenza: fibre di collagene di tipo IV difettose, che possono comparire nelle membrane basali dell'orecchio interno e del rene -> perdita dell'udito nell'orecchio interno e insufficienza renale cronica progressiva, anche possibili alterazioni oculari.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID

Amebiasi	Definizione	Infezione dell'intestino dovuta ad amebe del tipo Entamoeba histolytica. Trattamento con antibiotici (metronidazolo, tetraciclina) e cloroquina.
	Registrazione	CIT di 6 mesi dopo la fine del trattamento se viscerale CIT fino a guarigione completa e fino a la fine del trattamento se intestinale
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione

Anafilassi	Rinvio	Allergia
-------------------	--------	----------



Anemia	Definizione	Riduzione della concentrazione di emoglobina nel sangue al di sotto dei valori normali per l'età e il sesso. Suddivisione in acuta/cronica, congenita o acquisita, in base alla morfologia degli eritrociti.
	Nota bene	Accertare sempre la causa dell'anemia. Nessuna donazione in stato anemico. Attitudine da determinare dal MDD.
	Vedere anche	Anemia aplastica Anemia emolitica Anemia falciforme Anemia, carenza di ferro Anemia, carenza di vit. B12 o acido folico Sferocitosi ereditaria Talassemia

Anemia aplastica	Definizione	Forma particolare dell'anemia. Disturbo della funzione del midollo osseo con pancitopenia dovuta ad aplasia midollare congenita o acquisita. <ul style="list-style-type: none">• congenita: anemia di Fanconi, sindrome di Diamond-Blackfan• acquisita: idiopatica, medicamentosa, tossine, radiazione ionizzante, virus
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID

Anemia emolitica	Definizione	Distruzione precoce degli eritrociti per un processo (auto)immunitario, legata a fattori meccanici o come conseguenza di una malattia ereditata
	Registrazione	Non accettare.
	CT / VT	CID
	MC	CID



Anemia falciforme	Definizione	Malattia ereditaria con produzione di emoglobina anormale (HbS), provoca l'anemia emolitica corpuscolare Ereditarietà autosomica recessiva.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Anemia falciforme/drepanocitosi, portatore	Definizione	Portatore di anemia drepanocitica
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Anemia, carenza di ferro	Definizione	Ridotta concentrazione di emoglobina a causa della diminuzione dei livelli di ferro fisiologici. Forma di anemia più frequente, circa l'80% degli interessati sono donne (mestruazioni, gravidanza, lattazione). Causa più frequente: perdita di ferro per emorragie (croniche). Apporto lacunoso con alimenti, ridotto/disturbato assorbimento del ferro. Escludere emorragie croniche (origine del sanguinamento) e malattie tumorali!
	Nota bene	Nessuna donazione in stato anemico. PBSC è da preferire.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare se il donatore è sottoposto a una terapia integrativa di ferro e i valori dell'emoglobina sono nella norma Accertare la causa e se necessario trattarla Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Emoglobina



Anemia, carenza di vit. B12 o acido folico	Definizione	Carenza di vitamina B12 generalmente dovuta da apporto o assorbimento insufficiente negli anni. Conseguenze tra cui anemia megaloblastica. <ul style="list-style-type: none"> • Apporto insufficiente: legato all'alimentazione • Assorbimento ridotto: alterazioni gastriche (mancanza di fattore intrinseco dovuta, ad es., a gastrite cronica, operazione gastrica, infezione da Helicobacter), patologia intestinale infiammatoria, resezione intestinale • Aumento del fabbisogno: ad es. gravidanza
	Nota bene	Nessuna donazione in stato anemico. PBSC è da preferire.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare se il donatore è sottoposto a una terapia integrativa di vit. B12 e i valori dell'emoglobina sono nella norma Accertare la causa e se necessario trattarla Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT
Anestesia	Rinvio	Operazione_in generale_1
Angina	Rinvio	Tonsillite acuta
Angina pectoris	Rinvio	Malattia cardiovascolare
Anoressia	Rinvio	Disturbo del comportamento alimentare
Anosmia / Parosmia / Ageusia durante un'infezione di COVID-19	Rinvio	Infezione delle vie respiratorie superiori
Antabus	Rinvio	Alcol



Anticoagulazione	Definizione	Inibizione medicamentosa della coagulazione
	Nota bene	Accertare sempre la causa dell'assunzione
	Registrazione	Non accettare finché assunzione. A seconda della malattia di base, eventualmente registrazione dopo la fine del trattamento
	CT / VT	Non accettare finché assunzione. Accettare a seconda della malattia di base se è possibile sospendere il trattamento fino al prelievo.
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Flebotrombosi Lista dei medicinali Malattia cardiaca Malattia cardiovascolare Malattia vascolare arteriosa

Apoplessia	Rinvio	Malattia cerebrovascolare
-------------------	--------	---------------------------

Appendicectomia	Rinvio	Operazione media_3
------------------------	--------	--------------------



Aritmia	Definizione	Alterazione del normale ritmo cardiaco causata da disturbi/irregolarità del sistema di conduzione elettrica e formazione dell'impulso del cuore. Suddivisione perlopiù a seconda del sito di origine (atri, ventricoli, conduzione e formazione dell'impulso): ad es. sopraventricolare: extrasistole (ES), tachicardia sopraventricolare, fibrillazione atriale, flutter atriale, blocco senoatriale ventricolare: ES, tachicardia ventricolare, flutter ventricolare, fibrillazione ventricolare sistema di conduzione elettrica e formazione dell'impulso: sindrome del nodo del seno, blocco atrioventricolare, sindrome di Wolff-Parkinson-White (WPW)
	Nota bene	Informarsi sull'eventuale malattia (cardiaca) di base
	Registrazione	Accettare se: <ul style="list-style-type: none"> • extrasistole sporadiche • aritmia indotta dalla respirazione • dopo terapia ablativa riuscita, stabile e senza medicinali
	CT / VT	Come registrazione Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come registrazione Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	Vedere anche	Sindrome da tachicardia posturale ortostatica (POTS)
Arteriopatia obliterante periferica	Rinvio	Malattia vascolare arteriosa
Arteriosclerosi	Vedere anche	Malattia cardiovascolare Malattia cerebrovascolare



Arterite temporale	Definizione	Arterite gigantocellulare, arterite di Horton. Vasculite sistemica che tocca le arterie grandi e medie della testa.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Vedere anche	Malattia autoimmune
Artrite infettiva	Definizione	Infezione dell'articolazione, diretta (post-traumatica, iatrogena da operazioni o iniezioni) o ematogena
	Registrazione	CIT di 2 settimane dopo la fine della terapia e fino a guarigione completa
	CT / VT	Come registrazione Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT
Artrite non infettiva	Definizione	Malattia articolare infiammatoria appartenente alla forma reumatica, malattia autoimmune. Vi fanno parte, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> • artrite reumatoide • artrite psoriasica • poliartrite (giovanile)
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Artrite reumatoide	Rinvio	Artrite non infettiva
Artroscopia	Registrazione	Accettare.
	CT / VT	CIT di 1 mese o a seconda dell'esito
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Operazione media_3 Operazione piccola_2



Artrosi	Definizione	Malattia articolare degenerativa
	Registrazione	Accettare in assenza di limitazione importante nella vita di ogni giorno
	CT / VT	Accettare in assenza di: <ul style="list-style-type: none"> • fasi acute • limitazione importante nella vita di tutti i giorni
	MC	Accettare se: <ul style="list-style-type: none"> • nessuna fase acuta • la localizzazione dell'artrosi permette la tecnica di prelievo • la donazione è possibile a livello fisico Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
Ascesso	Definizione	Qualsiasi tipo di ascesso, ad es. cutaneo, dentale
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 1 settimana dopo la fine del trattamento antibiotico sistemico e fino a guarigione completa
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Operazione grande_4 Operazione media_3 Operazione piccola_2
Ascesso dentale	Rinvio	Ascesso



Asma (bronchiale)	Definizione	Patologia infiammatoria cronica delle vie aeree caratterizzata da disturbi variabili ricorrenti, ostruzione delle vie aeree reversibile e broncospasmi. Causata da una molteplicità di stimoli (allergici / non allergici, infettivi)
	Nota bene	Gli asmatici presentano un rischio più elevato in caso di donazione, in particolare se anestesia.
	Registrazione	Accettare se: <ul style="list-style-type: none"> • il solo trattamento per via inalatoria è sufficiente (anche combinato, incl. corticosteroidi) • il trattamento per via inalatoria ha funzione preventiva Non accettare se: <ul style="list-style-type: none"> • attacchi d'asma frequenti • necessaria terapia perorale regolare (teofillina, corticosteroidi orali, antagonisti dei leucotrieni) • trattamento stazionario ripetuto • il donatore ha già dovuto essere trattato in terapia intensiva a causa di attacchi d'asma
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
Aspirin®, Aspirin Cardio®	Definizione	Acido acetilsalicilico
	Registrazione	Accettare se assunzione sporadica o preventiva (senza cardiopatia coronarica manifesta) Verificare motivo dell'assunzioneValutazione dell'idoneità da parte di una medica
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Lista dei medicinali Malattia cardiovascolare



Atassia spinocerebellare (SCA)	Definizione	Malattia neurodegenerativa, ereditaria, autosomica dominante della mezza età, tipicamente accompagnata da disturbi motori e demenza progressiva
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Attacco ischemico transitorio (TIA)	Rinvio	Malattia cerebrovascolare
Attività a rischio	Definizione	Personale ospedaliero, analisti, medici, assistenti di studio medico, infermieri che curano pazienti con malattie trasmissibili
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare in assenza di contatto con sangue estraneo (per via di puntura, con ago della pelle o delle mucose)
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Contatto con sangue estraneo Puntura accidentale d'ago
Autismo	Rinvio	Sindrome di Asperger
Avodart	Rinvio	Medicamenti teratogeni



Babesiosi	Definizione	Malattia infettiva causata da un protozoo del genere Babesia, un piccolo parassita intracellulare. Trasmissione tramite il morso di zecca, la sintomatica assomiglia a quella della malaria. Può insorgere anche negli animali (ad es. cani, mucche, pecore, capre, caprioli). I parassiti attaccano gli eritrociti -> emolisi più o meno marcata. Possibile trasmissione congenita.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Barrett, esofago di	Definizione	Alterazione della mucosa al passaggio dell'esofago nello stomaco. La malattia è spesso correlata al reflusso gastroesofageo. Condizione precancerosa per adenocarcinoma dell'esofago.
	Registrazione	Accettare in caso di mucosa di Barrett senza displasie Non accettare in caso di mucosa di Barrett con displasie
	CT / VT	Come registrazione Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come registrazione Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
Basalioma	Definizione	Neoplasia cutanea semimaligna (distruttiva localmente, non metastatica)
	Registrazione	Non accettare se sotto trattamento con vismodegib (Erivedge®). Registrazione soltanto 2 anni dopo la fine del trattamento.
	CT / VT	CIT fino a guarigione completa dopo escissione Non accettare se sotto trattamento con vismodegib (Erivedge®). CT dopo 2 anni dalla fine del trattamento.
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Medicamenti teratogeni Operazione_in generale_1

Batteriuria asintomatica	Definizione	Rilevazione di batteri nelle urine in assenza di sintomi di infezione delle vie urinarie
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
Bechterew, morbo di	Rinvio	Spondilite anchilosante
Betabloccante	Definizione	Medicamento con azione ipotensiva, Impiego in caso di ipertensione, insufficienza cardiaca, Angina pectoris, aritmie, ecc.
	Nota bene	Accertare la causa dell'assunzione
	Registrazione	Accettare se il motivo dell'assunzione lo consente
	CT / VT	Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Ipertensione arteriosa Malattia cardiaca Malattia cardiovascolare
Bilanziosi	Definizione	Malattia tropicale, detta anche schistosomiasi. Agente patogeno: Schistosoma (della classe di vermi Trematoda). Nelle persone sono descritti 5 tipi patogeni (S. mansoni, S. haematobium, S. japonicum, S. intercalatum, S. mekongi). Parassitosi con due forme: bilanziosi urogenitale (infestazione della vescica e dell'uretra), bilanziosi intestinale (trematodi in acqua dolce inquinata)
	Registrazione	CIT di 12 mesi dopo la fine del trattamento (praziquantel)
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
Biopsia	Rinvio	Operazione piccola_2



Blefarite	Definizione	Infiammazione della palpebra. Spesso in correlazione con una malattia della pelle, una congiuntivite, d'origine infettiva o allergica.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 2 settimane dopo la terapia antibiotica e fino a guarigione completa
	MC	Come CT / VT
Blenorragia	Rinvio	Gonorrea
BMI	Rinvio	Peso corporeo
Boeck, malattia di	Rinvio	Sarcoidosi
Borderline	Definizione	Un disturbo della personalità caratterizzata da impulsività e instabilità nelle relazioni interpersonali, nell'umore e nell'autostima. Elevata comorbidità con depressioni e ADHD (sindrome da deficit di attenzione e iperattività, Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder).
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Borreliosi	Definizione	Infezione batterica da Borrelia, trasmissione tramite zecche. Anche nota come malattia di Lyme.
	Registrazione	Accettare dopo un trattamento riuscito senza complicazioni Non accettare se infezione cronica
	CT / VT	CIT di 2 settimane dopo trattamento compiuto e scomparsa dei sintomi (guarigione completa) CID in caso di infezione cronica, se già registrato
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Morso di zecca



Botox, trattamento	Definizione	Terapia con tossina botulinica (iniezione). Impiegata p. es. per il trattamento di rughe del viso o iperidrosi.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare se non vi sono indizi di infezione (batterica) CIT di 1 mese dopo l'ultima iniezione
	MC	Accettare se non vi sono indizi di infezione (batterica) CIT di 2 mesi dopo l'ultima iniezione
	Vedere anche	Iperidrosi

BPCO	Definizione	Broncopneumopatia cronica ostruttiva
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID

Bradycardia	Definizione	Frequenza cardiaca < 60/Min. Cause: malattie del nodo senoatriale (ad es. sindrome del seno malato, blocco senoatriale (blocco SA), blocco atrio-ventricolare (BAV), fibrillazione atriale lenta. Anche malattia coronarica, medicinali (betabloccanti) Escludere sempre una causa cardiaca
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CID in caso di causa cardiaca Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT



BRCA1, portatrice di	Definizione	Mutazione genetica o delezione del gene BRCA1, aumenta il rischio di tumore (in particolare cancro alla mammella o alle ovaie).
	Registrazione	Non accettare, se noto
	CT / VT	Non accettare, se non sotto controllo periodico e completo conformemente alle direttive dell'UFSP Valutazione dell'idoneità da parte di una medica Informare il centro di trapianto
	MC	Come CT / VT Accettazione del rischio da parte del centro di trapianto

Bronchite acuta	Definizione	Infiammazione acuta dei bronchi, malattia infettiva contagiosa se causata da batteri o virus
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 2 settimane dopo la fine del trattamento antibiotico e fino a guarigione completa
	MC	Come CT / VT

Bronchite cronica	Definizione	Tosse ed espettorazione che dura per almeno tre mesi e per due anni consecutivi. Si trasforma spesso in una COPD.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID



Brucellosi	Definizione	Infezione da batteri del genere Brucella: Antropozoonosi, trasmissione alle persone a partire dagli animali infetti con i quali le persone sono venute a contatto (mucche, capre, pecore, maiali, cavalli e cani). Introduzione dell'agente patogeno attraverso le mucose (tratto digestivo o tratto respiratorio via gli escrementi, l'urina, anche il latte non pastorizzato e i formaggi prodotti con esso).
	Registrazione	Non accettare se infezione confermata nell'anamnesi
	CT / VT	CIT di 3 mesi dopo l'assunzione di alimenti sospetti CID se infezione confermata
	MC	Come CT / VT
Bulimia	Rinvio	Disturbo del comportamento alimentare
Bypass gastrico	Registrazione	Accettare 1 anno dopo l'operazione se: <ul style="list-style-type: none"> • la malattia di base non costituisce un criterio di esclusione • decorso senza complicazioni • BMI < 40 • buono stato di salute generale • all'ultimo controllo non sono state riscontrate anomalie Altrimenti attitudine da determinare dal medico
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Operazione grande_4
Caduta di capelli	Rinvio	Alopecia
Calcoli biliari	Rinvio	Colelitiasi



Calcoli renali	Definizione	Aggregazioni cristalline (calcoli urinari) nella zona delle pelvi renali. I calcoli urinari che migrano nell'uretere possono ostruire un passaggio stretto provocando un grave blocco dell'urina (colica renale). Pericolo di infezione (pielonefrite). Terapia medicamentosa / non operativa (ESWL: litotrissia extracorporea ad onde d'urto) / operativa
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CI in caso di sintomatica acuta
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Colica renale Nefrite
Calcoli renali, operazioni	Rinvio	Operazione media_3
Cancro	Definizione	Malattia maligna
	Registrazione	Non accettare tranne : <ul style="list-style-type: none"> • basalioma • neoplasia della cervice uterina (carcinoma in situ) senza chemioterapia o radioterapia
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
Cancro della cervice uterina	Vedere anche	Cancro Carcinoma in situ della cervice uterina
Cancro renale	Rinvio	Cancro



Candidosi	Definizione	Candidiasi, moniliasi. Infezione della pelle e delle mucose da funghi del genere Candida (90% Candida albicans).
	Registrazione	Accettare se semplice mugghetto orale e trattamento locale, sempre che non sia presente una malattia di base
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Micosi
<hr/>		
Cannabidioli, CBD	Rinvio	Droga, consumo di
<hr/>		
Cannabis	Rinvio	Droga, consumo di
<hr/>		
Carcinoma in situ della cervice uterina	Definizione	Neoplasia della cervice uterina, alterazioni della mucosa del collo dell'utero non invasive, potenzialmente maligne
	Registrazione	Accettare : <ul style="list-style-type: none">dopo conizzazione esenza chemio- o radioterapia
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
<hr/>		
Carcinoma prostatico	Rinvio	Cancro
<hr/>		
Cardiochirurgia	Registrazione	Non accettare tranne se forame ovale operato senza residui o terapia
	CT / VT	CID
	MC	CID



Cardiomiopatia	Definizione	Malattia del miocardio: gruppo molto eterogeneo di malattie del miocardio con disfunzione meccanica e/o elettrica. Si suddivide in: <ul style="list-style-type: none"> • primitiva: genetica / mista genetica-acquisita/acquisita • secondaria: colpisce il cuore nel quadro di malattie sistemiche: ad es. malattie del metabolismo, infiammazioni, infezioni, malattia autoimmune, cause tossiche, endocrine
	Registrazione	Non accettare tranne: stato post miocardite dopo malattia virale e guarigione completa senza terapia
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione MC con accertamento cardiologico
Cardiopatía congenita	Definizione	Malformazione congenita o acquisita del cuore oppure dei grossi vasi afferenti o efferenti con limitata funzione del sistema cardiovascolare o cardiopolmonare, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> • Canale atriventricolare (CAV), • difetto interatriale (DIA) / forame ovale pervio (FOP) • difetti di valvole o vasi
	Registrazione	Non accettare tranne se forame ovale operato senza residui o terapia
	CT / VT	Come registrazione Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come registrazione Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
Cataratta	Definizione	Opacizzazione del cristallino. Terapia chirurgica, sostituzione del cristallino opaco con lente artificiale
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 1 mese dopo l'intervento
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Operazione piccola_2



Cefalea a grappolo	Definizione	Nota anche come cefalea di Horton. Cefalea primaria caratterizzata da dolori molto violenti unilaterali a livello delle tempie e degli occhi. Insorge con fasi molto attive («grappoli» o «cluster») alternate a lunghe fasi senza attacchi. Marcata correlazione con il ritmo circadiano. Causa non chiarita, da non associare, come l'emicrania, a disturbi cardiocircolatori.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare se nella fase senza attacchi Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Emicrania

Cefalea di Horton	Rinvio	Cefalea a grappolo
--------------------------	--------	--------------------

Celiachia	Definizione	Intolleranza al glutine (sostanza lipoproteica del grano), forma mista tra un'allergia e una malattia autoimmune.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	Accettare se malattia ben controllata con sintomi minimi Soltanto donazione di midollo osseo; informazione al centro di trapianto
	MC	Come CT / VT Risk acceptance da parte del centro di trapianto
	Vedere anche	Malattia autoimmune



Chagas, infezione	Definizione	Infezione dal protozoo <i>Trypanosoma cruzi</i> . Diffusa in ambienti rurali dell'America latina, trasmessa da cimici ematofaghe. Infezione dichiarata o confermata sulla base di un test di laboratorio anti-T.cruzi positivo
	Nota bene	In caso di incertezza, sempre fare il test. Accettare solo se test negativo
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Vedere anche	Lista dei paesi

Chagas, rischio di	Definizione	La donatrice è nato, è cresciuto o ha vissuto per un periodo di > 6 mesi in un paese con elevato rischio di Chagas, oppure sua madre è originaria da una regione endemica per la malattia di Chagas (vedi Allegato Art. 7, Travelcheck). La malattia viene trasmessa nelle zone rurali dalla cimice all'uomo, molto rara nei viaggiatori turistici
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 2 mesi dopo il rientro da un soggiorno di lunga durata o dopo una trasfusione di sangue; successivamente, CT con test di Chagas (test degli anticorpi anti-T. cruzi) Nessun test necessario se esiste già un risultato negativo e il donatore non è stato esposto all'infezione CID in caso di un risultato positivo di un test per il Chagas
	MC	Come CT / VT



Chikungunya, anamnesi positiva	Definizione	Malattia verificata (Test NAT positiva)
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 4 mesi dopo la diagnosi o l'inizio di sintomi Informare il centro di trapianto del risultato positivo della NAT / della malattia. In occasione d'un caso molto urgente, il centro di trapianto può decidere di ridurre la durata del CIT, accettando il rischio, se il donatore è asintomatico -> vedi " Chikungunya, rischio di "
	MC	Come CT / VT

Chikungunya, rischio di	Definizione	Soggiorno in zona endemica (vedi Allegato Art. 7, Travel-check)
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Se di ritorno da > 1 mese , con o senza sintomi: <ul style="list-style-type: none"> • Accettare • Senza CIT • Senza test Se di ritorno da < 1 mese , senza sintomi: <ul style="list-style-type: none"> • Accettare • Senza CIT • Senza test Se di ritorno da < 1 mese , con sintomi: <ul style="list-style-type: none"> • Accettare per CT / VT • Fare il test NAT - non prima di 5 giorni dopo il ritorno
	MC	Se di ritorno da > 1 mese , con o senza sintomi: <ul style="list-style-type: none"> • accettare • senza CIT • senza test Se di ritorno da < 1 mese , con o senza sintomi: <ul style="list-style-type: none"> • accettare • fare il test NAT, al più presto 5 giorni dopo il ritorno



Circolazione cerebrale, disturbo della	Rinvio	Malattia cerebrovascolare
Cirrosi	Definizione	Aumento di tessuto connettivo in seguito a un'inflam- zione cronica che causa indurimento e cicatrizzazione di un organo e distruzione della capacità funzionale del tessuto, ad es. <ul style="list-style-type: none"> • cirrosi epatica • nefrocirrosi
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Cirrosi renale	Definizione	Stadio finale di molte patologie parenchimali renali con fi- brosi progressiva e di regola con perdita quasi totale della funzione.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Cisti ovarica	Definizione	Tumore benigno caratterizzato da una raccolta di liquidi all'interno di un ovaio. Cisti perlopiù funzionali – Insorgenza nel quadro delle normali alterazioni ormonali indotte dal ci- clo nelle ovaie o causata da uno squilibrio ormonale / con- seguenza di una terapia ormonale Forma speciale: sindrome dell'ovaio policistico (PCOD: po- lycystic ovarian disease)
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT fino a guarigione completa in caso di complicazioni
	MC	Come CT / VT
Cistifellea, operazione	Rinvio	Operazione media_3
Cistite	Rinvio	Infezione delle vie urinarie



Citomegalovirus	Definizione	Cytomegalovirus (CMV). Virus a DNA appartenente alla famiglia delle Herpesviridae, anche denominato Herpesvirus umano 5 (Human Herpes Virus 5, HHV5). Il virus è diffuso globalmente, l'infezione molto comune. La trasmissione avviene attraverso i fluidi corporei (sangue, saliva, secrezioni vaginali, latte materno, sperma e urina). Infezione primaria spesso asintomatica o lieve negli immunocompetenti, forme gravi si riscontrano in persone immunocompromesse, per cui l'infezione può avere un esito letale.
	Nota bene	Lo stato sierologico viene determinato in base al valore delle IgG. Se solo il valore delle IgM risulta positivo, il donatore viene considerato sieronegativo, poiché il test delle IgM dà molto spesso risultati falsi positivi e in quasi tutti i casi non segue alcuna sierconversione delle IgG.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	<p>In caso di sospetto clinico di infezione (primaria) da CMV: valutazione dell'idoneità alla donazione da parte di una medica</p> <p>Al momento del CT, eseguire sempre un esame sierologico. In caso di risultato IgM positivo, viene eseguito un test NAT.</p> <p>In caso di NAT positivo, CIT di</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 mese se IgG positivo• 3 mesi se IgG negativo
MC	<p>In caso di sospetto clinico di infezione (primaria) da CMV: valutazione dell'idoneità alla donazione da parte di una medica</p> <p>Al momento dell'MC, eseguire sempre un esame sierologico (IgM e IgG). In caso di risultato IgM positivo, viene eseguito un test NAT.</p> <p>In caso di NAT positivo, CIT di</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 mese se IgG positivo• 3 mesi se IgG negativo <p>Il periodo di CIT può essere ridotto previa firma di una dichiarazione di accettazione del rischio da parte del centro trapianti.</p> <p>Informare immediatamente il centro trapianti qualora si verifichi un cambiamento nella sierologia tra CT / VT e MC (il risultato IgG diventa positivo).</p>	



Clamidosi	Definizione	Infezione dal batterio <i>Clamidia trachomatis</i> (diversi serotipi). Si tratta d'un' infezione genitale, una delle più frequenti malattie trasmesse per via sessuale. L'infezione occorre frequentemente dai giovani adulti sessualmente attivi ed è spesso asintomatica.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 2 settimane dopo la fine del trattamento e in assenza di altre malattie sessualmente trasmissibili all'anamnesi e se relazione sessuale stabile.
	MC	Come CT / VT
Claudicatio intermittens	Rinvio	Malattia vascolare arteriosa
CMV	Rinvio	Citomegalovirus
Cocaina	Rinvio	Droga, consumo di
Colangite primitiva sclerosante	Definizione	Inflammatione rara cronica dei dotti biliari all'interno e/o all'esterno del fegato. Alto rischio di colangiocarcinoma.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Colecistectomia	Rinvio	Operazione media_3
Colecistite	Definizione	Inflammatione della cistifellea
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 2 settimane dopo la fine del trattamento antibiotico e fino a guarigione completa
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Colelitiasi



Colelitiasi	Definizione	Calcoli biliari. Piccoli sassolini che si formano in seguito all'indurimento dei componenti della bile. Possono provocare infiammazioni della cistifellea o del sistema biliare.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare se asintomatica CIT fino a guarigione completa se sintomatica e necessitante terapia
	MC	Come CT / VT Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	Vedere anche	Colecistite

Colera	Definizione	Grave infezione batterica dell'intestino (soprattutto del intestino tenue) dovuta al batterio <i>Vibrio cholerae</i> . Altamente contagiosa. Infezione causata perlopiù da acqua non potabile o alimenti infetti (pessime condizioni sanitarie!) Grave essiccarsi e perdita di elettroliti dovute a diarrea profusa e forte vomito Tempo di incubazione di 1-3 giorni
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 3 mesi dopo guarigione completa
	MC	Come CT / VT

Colera, contatto	Definizione	Contatto con una persona infetta, soggiorno in una zona endemica
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 1 settimana dopo il contatto con una persona malata o ritorno da una zona endemica
	MC	Come CT / VT



Colica renale	Definizione	Dolori acuti nella regione lombare o addominale, dolori da forti a insopportabili. Causa di acuto disturbo del deflusso di urina nell'uretere per via di calcoli renali o renella.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CI in caso di sintomatica acuta
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Calcoli renali

Colite	Definizione	Infiammazione acuta o cronica dell'intestino crasso (infettiva / non infettiva / cronica / autoimmune)
	Nota bene	Sempre accertare la causa
	Registrazione	Non accettare se infiammazione cronica o genesi autoimmune
	CT / VT	CIT di 2 settimane dopo la fine del trattamento antibiotico e fino a guarigione completa se la causa lo consente Non accettare se infiammazione cronica o genesi autoimmune
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Malattia diarroica

Colite ulcerosa	Definizione	Malattia intestinale infiammatoria cronica, malattia autoimmune
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Vedere anche	Malattia autoimmune

Collasso	Rinvio	Perdita di coscienza
-----------------	--------	----------------------

Colpo apoplettico	Rinvio	Malattia cerebrovascolare
--------------------------	--------	---------------------------

Commozione cerebrale	Rinvio	Ferita alla testa, grave
-----------------------------	--------	--------------------------



Comportamento a rischio, altro, B5	Definizione	Consumo di droghe per endovena > 10 anni fa
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare
	MC	Accettare
Comportamento a rischio, altro, B6	Definizione	Rapporti sessuali con un partner che ha consumato delle droghe per endovena nel corso degli ultimi 10 anni, > 12 mesi fa
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare
	MC	Accettare
Comportamento a rischio, altro, B7	Definizione	Soggiorno di > 6 mesi in paesi con un elevato rischio di AIDS / HIV > 12 mesi fa con esposizione potenziale al HIV (ad.es rapporti sessuali, intervento medico, tatuaggio, piercing) (vedi Allegato Art. 7, Travelcheck)
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare
	MC	Accettare
Comportamento a rischio, altro, C5	Rinvio	Comportamento a rischio, altro, B5
Comportamento a rischio, altro, C6	Definizione	Rapporti sessuali nel corso degli ultimi 12 mesi con un partner che ha consumato delle droghe per endovena nel corso degli ultimi 10 anni.
	Nota bene	Per prima cosa, individuare il gruppo a rischio del donatore: vedi 1415_DOK_Classification_Risk_Behaviour_I
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 12 mesi dopo l'ultimo contatto sessuale
	MC	Come CT / VT



Comportamento a rischio, altro, C7	Definizione	Soggiorno di > 6 mesi in paesi con un elevato rischio di AIDS / HIV nel corso degli ultimi 12 mesi (vedi Allegato Art. 7, Travelcheck), con esposizione potenziale al virus HIV/AIDS (ad.es. rapporti sessuali, intervento medicale / paramedicale come un tatuaggio, un piercing)
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare, se nessuna esposizione, altrimenti CIT di 12 mesi dopo il ritorno
	MC	Come CT / VT

Comportamento a rischio, altro, C8	Definizione	Rapporti sessuali nel corso degli ultimi 12 mesi con un partner che - nel corso degli ultimi 12 mesi - ha ricevuto una trasfusione di sangue in un paese con un elevato rischio di AIDS / HIV oppure che era esposto altrimenti all'HIV (ad es. contatto sessuale, intervento medicale / paramedicale, come tatuaggio, piercing)
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 12 mesi dopo la trasfusione, l'esposizione all'HIV del partner o dopo l'ultimo contatto sessuale con questo partner
	MC	Come CT / VT

Comportamento a rischio, altro, D5	Definizione	Consumo di droghe per endovena nel corso degli ultimi 10 anni
	Registrazione	CIT di 10 anni dopo l'ultimo consumo
	CT / VT	CID
	MC	CID

Comportamento a rischio, altro, D6	Definizione	Rapporti sessuali con un partner attuale che ha consumato delle droghe per endovena nel corso degli ultimi 10 anni
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID



Comportamento a rischio, altro, D8	Definizione	Rapporti sessuali attuali con un partner che - nel corso degli ultimi 12 mesi - ha ricevuto una trasfusione di sangue in un paese con un elevato rischio di AIDS / HIV oppure che era esposto altrimenti all'HIV (ad es. contatto sessuale, intervento medico / paramedico, come tatuaggio, piercing)
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CIT di 12 mesi dopo la trasfusione / l'esposizione all' HIV del partner
	MC	Come CT / VT

Comportamento a rischio, sessuale e altro	Definizione	Comportamento con il quale il donatore corre il rischio di contrarre una malattia trasmissibile che potrebbe essere trasferita al ricevente per via del trapianto / del prodotto di cellule staminali del sangue > ripartizione in gruppi a rischio: A = rischio standard B = Low Risk C = Intermediate Risk D = High Risk
	Nota bene	Prima bisogna determinare il gruppo a rischio del donatore: vedi 1415 DOK_Classification_Risk_Behaviour

Comportamento a rischio, sessuale, A	Definizione	Rapporti sessuali con o senza protezione in una relazione monogama etero- o omosessuale che dura da > 4 mesi : <ul style="list-style-type: none"> • nessun nuovo partner • un partner sessuale unico
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare
	MC	Accettare

Comportamento a rischio, sessuale, B1	Definizione	Rapporti sessuali con un nuovo partner / al massimo 2 partner sessuali diversi nel corso degli ultimi 4 mesi
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 1 mese dopo il primo contatto sessuale con l'ultimo / il nuovo partner
	MC	CIT di 2 mesi dopo il primo contatto sessuale con l'ultimo / il nuovo partner



Comportamento a rischio, sessuale, B2	Definizione	Rapporti sessuali in cambio di denaro, droga o medicinali (donatore paga o è pagato) > 12 mesi fa
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare
	MC	Accettare
Comportamento a rischio, sessuale, B3	Definizione	Rapporti sessuali con partner con un comportamento sessuale a rischio Intermediate o High, ultimo contatto > 12 mesi fa
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare
	MC	Accettare
Comportamento a rischio, sessuale, B4	Definizione	Rapporti sessuali con partner con una malattia sessualmente trasmissibile (ad. es. HIV, VEC, VEB) , ultimo contatto > 12 mesi fa
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare
	MC	Accettare
Comportamento a rischio, sessuale, C1	Definizione	Rapporti sessuali con al massimo 3 partner sessuali diversi nel corso degli ultimi 4 mesi
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 3 mesi dopo il primo contatto sessuale con l'ultimo nuovo partner
	MC	CIT di 4 mesi dopo il primo contatto sessuale con l'ultimo nuovo partner



Comportamento a rischio, sessuale, C2	Definizione	Rapporti sessuali in cambio di denaro, droga o medicinali (donatore paga o è pagato) una volta nel corso degli ultimi 12 mesi
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 12 mesi dopo l'ultimo contatto sessuale pagato
	MC	Come CT / VT

Comportamento a rischio, sessuale, C3	Definizione	Rapporti sessuali con partner con un comportamento sessuale a rischio Intermediate o High, ultimo contatto nel corso degli ultimi 12 mesi
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 12 mesi dopo l'ultimo contatto sessuale
	MC	Come CT / VT

Comportamento a rischio, sessuale, C4	Definizione	Rapporti sessuali con partner con una malattia sessualmente trasmissibile (ad. es. HIV, VEC, VEB) nel corso degli ultimi 12 mesi
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 12 mesi dopo l'ultimo contatto sessuale
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Epatite B, partner sessuale

Comportamento a rischio, sessuale, D1	Definizione	Rapporti sessuali con più di 3 partner sessuali diversi nel corso degli ultimi 4 mesi
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 12 mesi dopo il primo contatto sessuale con l'ultimo nuovo partner oppure CID a causa di comportamento sessuale ad alto rischio
	MC	Come CT / VT



Comportamento a rischio, sessuale, D2	Definizione	Rapporti sessuali in cambio di denaro, droga o medicinali (donatore paga o è pagato), ≥ 2 volte nel corso degli ultimi 12 mesi
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID

Comportamento a rischio, sessuale, D3	Definizione	Rapporti sessuali con partner con un comportamento sessuale a rischio High, attualmente
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CIT di 12 mesi dopo l'ultimo contatto sessuale (o CID)
	MC	Come CT / VT

Comportamento a rischio, sessuale, D4	Definizione	Rapporti sessuali con partner con una malattia sessualmente trasmissibile (ad. es. HIV, VEC, VEB), attualmente
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CIT di 12 mesi dopo l'ultimo contatto sessuale (o CID)
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Epatite B, partner sessuale

Concentrati di fattori della coagulazione	Definizione	Emoprodotti stabili per il trattamento dei disturbi della coagulazione: <ul style="list-style-type: none"> • fattori della coagulazione derivati dal plasma • fattori della coagulazione ricombinanti (fabbricati con processi di tecnica genetica)
	Registrazione	Accettare se la malattia di base non lo vieta
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Disturbo della coagulazione Emofilia A e B Trasfusione di sangue



condiloma acuminato	Rinvio	Verruche genitali
Condizioni venose difficili	Nota bene	In caso di condizioni venose difficili, la donatrice o il donatore deve essere informato dettagliatamente sulla possibilità di un catetere venoso centrale.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Valutazione delle condizioni venose da parte dell'équipe adde- detta al prelievo di sangue. La decisione finale sul tipo di prelievo spetta al centro di prelievo.
	MC	Come CT / VT
Congiuntivite	Definizione	Infiammazione della congiuntiva dell'occhio
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 1 mese dopo guarigione completa e di 2 settimane dopo la fine di un'eventuale terapia antibiotica sistemica
	MC	Come CT / VT
Conizzazione	Rinvio	Carcinoma in situ della cervice uterina
Contatto con sangue estraneo	Definizione	Contatto con sangue estraneo tramite la pelle, le mucose o puntura con ago
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 1 mese dopo l'avvenimento
	MC	CIT di 2 mesi dopo l'avvenimento
	Vedere anche	Attività a rischio Epatite Situazione a rischio



Contracezione ormonale	Definizione	Contracezione tramite preparati contenenti estrogeni e/o progestinici.
	Registrazione	Accettare tranne in caso di stato post episodio tromboembolico o altro rischio trombotico costituzionale
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Trombofilia

Contusione cerebrale	Rinvio	Ferita alla testa, grave
-----------------------------	--------	--------------------------

Convulsione	Definizione	Evento provocato involontariamente che si manifesta con movimenti bruschi o simili a contrazioni
	Registrazione	Non accettare fintanto che la causa non è chiara Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Alcol Epilessia Ipoglicemia Pseudocrisi Tumore cerebrale, benigno

Corea di Huntington	Definizione	Anche malattia di Huntington. Malattia genetica neurodegenerativa incurabile del cervello con disturbi motori e psichici. Progressione sempre grave, provoca la morte in media dopo 15 anni.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID



Cornea, trapianto	Definizione	Trapianto della cornea, rischio di trasmissione di prioni, malattia di Creutzfeldt-Jakob
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Come registrazione , informazione al centro di trapianto
	MC	Come registrazione , Risk acceptance da parte del centro di trapianto
	Vedere anche	Creutzfeldt-Jakob, malattia di, rischio 1_Trapianto di tessuto umano
Coronaropatia	Rinvio	Malattia cardiovascolare
Correzione della vista, operazione di	Definizione	Correzione di miopia, presbiopia oppure astigmatismo
	Registrazione	Accettare anche se con procedura laser (LASIK / PRK / LA-SEK)
	CT / VT	CIT fino a guarigione completa
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Operazione_in generale_1
COVID-19	Rinvio	Infezione delle vie respiratorie superiori
Craniofaringioma	Definizione	Tumore disontogenetico, benigno, originato da un anormale sviluppo di residui cellulari del dotto ipofisario. Anche tumore di Erdheim.
	Registrazione	Non accettare anche se operato
	CT / VT	CID
	MC	CID
Creutzfeld-Jakob, malattia di, rischio 7_sog- giorno in Gran Bretagna	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare
	MC	Accettare



Creutzfeldt-Jakob, malattia di, confermata	Definizione	Malattia confermata o sospetto di affezione
	Registrazione	Non accettare se: <ul style="list-style-type: none"> • il donatore stesso è affetto • un parente di primo grado è affetto
	CT / VT	CID se: <ul style="list-style-type: none"> • il donatore stesso è affetto • un parente di primo grado è affetto • ≥ 2 persone nella parentela ulteriore sono affette
	MC	Come CT / VT
Creutzfeldt-Jakob, malattia di, rischio	Definizione	Rischio di trasmissione di prioni / vCJD (variant Creutzfeldt-Jacob Disease)
	Nota bene	Sempre porre la domanda: se sì, che cosa e perché?
Creutzfeldt-Jakob, malattia di, rischio 1_Trapianto di tessuto umano	Registrazione	Non accettare se: <ul style="list-style-type: none"> • trapianto di dura madre • trapianto a causa di malignità, epatite virale o malattia autoimmune • donatore ha subito un trattamento immunosoppressivo • donatore ha avuto un trapianto di un organo Prendere in considerazione la causa del trapianto!
	CT / VT	Come registrazione ; inoltre domanda su trapianto di cornea, sclera o altro tessuto oculare → informazione al centro di trapianto
	MC	Come CT / VT, inoltre -> accettazione del rischio da parte del centro di trapianto
	Vedere anche	Trasfusione di sangue
Creutzfeldt-Jakob, malattia di, rischio 2_Trasfusione di sangue	Rinvio	Trasfusione di sangue



Creutzfeldt-Jakob, malattia di, rischio 3_Operazione al cervello o midollo spinale	Registrazione	Non accettare se la malattia di base richiede un CIT Non accettare se trapianto di dura madre Trapanazione della calotta cranica e operazione di un'ernia discale sono accettabili
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Ernia discale/ED-operazione
Creutzfeldt-Jakob, malattia di, rischio 4_Trapianto di tessuto animale	Registrazione	Non accettare Unica eccezione: preparati d'origine bovina come Bio-Oss®, Bio-Gide®, Cerabone®, se nessuna patologia cronica o infezione recidivante
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Immunobioterapia Innesto endosseo e tendineo
Creutzfeldt-Jakob, malattia di, rischio 5_Trattamento con ormoni della crescita prima del 1.1.1986	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Creutzfeldt-Jakob, malattia di, rischio 6_iniezioni di ormoni a causa di sterilità prima del 1.1.1986	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Crohn, morbo di	Rinvio	Malattia autoimmune
Curakne	Rinvio	Medicamenti teratogeni



Cushing, sindrome di	Definizione	Eccesso di cortisolo nel sangue che provoca alterazioni fisiche. Le cause possono essere di origine centrale, surrenale, ectopica (paraneoplastica) o iatrogena.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID

Deficit del fattore V, congenito	Definizione	Paraemofilia, Malattia di Owren. Malattia ereditaria della coagulazione sanguigna molto raro, di trasmissione autosomica recessiva, che provoca un'emofilia (da non confondere con la mutazione del fattore V di Leiden)
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID

Deficit di biotidinas	Definizione	Malattia metabolica ereditaria autosomica recessiva causata da un difetto della biotinidasi che porta a una carenza di biotina. Curabile se diagnosi precoce (screening neonatale) con assunzione a vita di biotina.
	Registrazione	Accettare se: <ul style="list-style-type: none"> • è stato eseguito un accertamento (diagnosi) • il donatore assume la biotina come sostituzione e • non sussistono sequele d'una terapia inadeguata
	CT / VT	Come registrazione Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT



Deficit di immunoglobuline	Definizione	Concentrazione ridotta di una classe di immunoglobuline nel sangue. La classe più colpita sono le IgA.
	Registrazione	Non accettare ; si trasmetterebbe al ricevente un sistema immunitario potenzialmente malato.
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Deficit di IgA Immunodeficienza comune variabile, CVID

Deficit di IgA	Definizione	Forma più frequente di immunodeficienza primitiva. Molte persone interessate sono asintomatiche, mentre altre presentano un'elevata tendenza alle infezioni con sviluppo di infezioni recidivanti delle vie respiratorie e malattie autoimmuni. I valori IgG e IgM sono normali. Deficit parziale di IgA: valore IgA sotto la norma per l'età Deficit totale di IgA: IgA < 0.05 g/l
	Registrazione	Non accettare. Al ricevente potrebbe essere trasmesso un sistema immunitario potenzialmente patologico
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Deficit di immunoglobuline

Dengue (Febbre rossa), infezione	Definizione	Malattia dichiarata o confermata (Test NAT positivo)
	Nota bene	Informarsi se forma emorragica della febbre di Dengue !
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 4 mesi dopo la diagnosi o l'inizio di sintomi (rischio per il paziente) Informare il centro di trapianto del risultato positivo della NAT / della malattia. In occasione d'un caso molto urgente, il centro di trapianto può decidere di ridurre la durata del CIT, accettando il rischio, se il donatore è asintomatico -> vedi "Dengue, rischio di"
	MC	Come CT / VT
Vedere anche	Febbre emorragica virale	



Dengue (Febbre rossa), rischio di	Definizione	Soggiorno in una regione endemica per la dengue (vedi Allegato Art. 7, Travelcheck)
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Se di ritorno da > 1 mese , con o senza sintomi: <ul style="list-style-type: none">• accettare• senza CIT• senza test Se di ritorno da < 1 mese , senza sintomi: <ul style="list-style-type: none">• accettare• senza CIT• senza test Se di ritorno da < 1 mese , con sintomi: <ul style="list-style-type: none">• accettare per CT / VT• fare il test NAT, al più presto 5 giorni dopo il ritorno
	MC	Se di ritorno da > 1 mese , con o senza sintomi: <ul style="list-style-type: none">• accettare• senza CIT• senza test Se di ritorno da < 1 mese , con o senza sintomi: <ul style="list-style-type: none">• Accettare• fare il test NAT, al più presto 5 giorni dopo il ritorno
	Vedere anche	Febbre emorragica virale, contatto Lista dei paesi

Depressione	Nota bene	Accertare sempre lo stato psichico e la resistenza allo stress
	Registrazione	Accettare se: <ul style="list-style-type: none">• non assume più di 2 medicinali• non è sottoposto a terapia con litio e• psicologicamente stabile
	CT / VT	Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Valutazione dell'idoneità da parte di una medica



Dermatite	Definizione	Infiammazione della pelle. Determinare la causa (infezione, allergia, eczema, ecc.).
	Registrazione	Accettare in assenza di trattamento sistemico
	CT / VT	Accettare in assenza di trattamento sistemico e se il sito di punzione non è affetto
	MC	Come CT / VT
Desensibilizzazione	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Immunobioterapia
Desiderio di avere un figlio	Registrazione	Accettare
	CT / VT	La donatrice deve essere informata sul fatto che non dovrebbe rimanere incinta nei due mesi successivi alla donazione. Per il benessere del paziente (possibile seconda donazione) sarebbe auspicabile che questa latenza sia più lunga (4–6 mesi).
	MC	Come CT / VT
Diabete insipido	Definizione	Malattia congenita o acquisita caratterizzata da mancanza ormonale (mancanza o cattivo funzionamento dell'ormone antidiuretico ADH).
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID



Diabete mellito	Definizione	Suddivisione in diabete di tipo 1 / diabete di tipo 2 / diabete gestazionale.
	Registrazione	Accettare se sotto trattamento dietetico con o senza antidiabetici orali, ben controllato e stato generale sano Accettare in caso di diabete gestazionale se dopo la gravidanza la donna non è più insulino-dipendente Non accettare per il diabete di tipo 1 Non accettare se sotto trattamento insulinico
	CT / VT	Come registrazione Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT
Diatesi emorragica, disturbi congeniti	Definizione	Disturbi congeniti con mancanza dei fattori della coagulazione. I più frequenti sono: <ul style="list-style-type: none"> • emofilia A: mancanza del fattore VIII • emofilia B: mancanza del fattore IX • malattia di von Willebrand: mancanza o difetto strutturale del fattore di von Willebrand (fvW)
	Vedere anche	Emofilia A e B Von Willebrand, malattia di
Diatesi emorragica, disturbi acquisiti	Definizione	Tra cui: <ul style="list-style-type: none"> • carenza di vitamina K (funzionale nella terapia con antagonisti della vitamina K, difettosa sintesi in presenza di insufficienza epatica, malassorbimento, colestasi) • immunocoagulopatie (emofilie con inibitore, autoanticorpi contro fattori della coagulazione) • coagulazione intravasale disseminata (CID) • iperfibrinolisi sistemica (ad es. nell'ambito di patologie maligne. Operazioni ai polmoni e alla prostata, trombolisi)
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID



Dieta, iniezione di hCG	Definizione	Trattamento di riduzione del peso: iniezioni giornaliere di hCG abbinata a una dieta individuale ultra-ipocalorica (<500kcal/d), iperproteica, povera di carboidrati e di grassi – scopo di questa dieta sarebbe la perdita di adipese senza ridurre la massa muscolare
	Registrazione	Accettare 1 mese dopo il termine della dieta senza complicazioni
	CT / VT	Come registrazione e informazione al centro di trapianto
	MC	Come CT / VT
Difetto della vista	Rinvio	Disabilità fisica
Difetto interatriale (DIA)	Rinvio	Malattia cardiaca
Difterite	Definizione	Malattia infettiva acuta e contagiosa; infezione delle vie aeree superiori dovuta al <i>Corynebacterium diphtheriae</i> .
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 1 mese dopo guarigione completa
	MC	Come CT / VT
Dipendenza	Rinvio	Droga, consumo di



Disabilità fisica	Definizione	Limitazione fisica, anche cecità, sordità.
	Registrazione	Accettare se: <ul style="list-style-type: none"> • prelievo eseguibile • consenso informato possibile • nessun rischio elevato di trombosi <p>Nel compilare il questionario medico e il consenso informato occorre accertarsi che il donatore possa rispondere liberamente</p>
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Paraplegia / Tetraplegia
Displasia cervicale	Definizione	Stadio preliminare del carcinoma in situ della cervice uterina
	Registrazione	Accettare se sotto controllo periodico
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Carcinoma in situ della cervice uterina
Displasia fibromuscolare	Definizione	Proliferazione non infiammatoria del tessuto connettivo e della muscolatura liscia nella parete arteriosa. Insorge soprattutto nelle donne giovani con tutti i sintomi di vasocostrizione. Colpisce frequentemente: arterie renali > ipertensione, carotide interna > sintomi neurologici.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID



Distacco della retina	Definizione	Separazione della membrana più interna della retina dal tessuto sottostante
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Distrofia muscolare	Definizione	Gruppo di malattie muscolari ereditarie causate da produzione difettosa o mancata di una proteina nella muscolatura (ad es. distrofina); provoca debolezza muscolare e atrofia muscolare.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Vedere anche	Disabilità fisica
Disturbo affettivo bipolare	Definizione	Precedentemente malattia maniaca depressiva con oscillazioni contro-polari della motricità, del comportamento e dell'umore.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Disturbo del comportamento alimentare	Definizione	Tra cui: <ul style="list-style-type: none"> • anoressia • bulimia
	Registrazione	Non accettare tranne se guarigione completa e nessun residuo corporeo
		Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione



Disturbo della coagulazione	Definizione	Coagulopatia. Alterazione del meccanismo di coagulazione del sangue (plasmatica) che provoca diatesi emorragica elevata (emofilia) o trombofilia elevata (ipercoagulabilità). Congenita o acquisita.
	Vedere anche	Emofilia A e B Trombofilia Von Willebrand, malattia di

Disturbo di panico	Definizione	Disturbo di ansia caratterizzato da vari attacchi di panico al mese a cui sono legati ansia anticipatoria o evitamento e limitazioni quotidiane.
	Registrazione	Accettare se: <ul style="list-style-type: none">• sono ben note le situazioni di rischio• gli attacchi di panico possono essere controllati in modo tale che non sussista un rischio elevato di interrompere una donazione
	CT / VT	Come registrazione Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT

Diverticolite	Definizione	Infiammazione di diverticoli (estroflessioni della mucosa intestinale). Coinvolge più comunemente il sigma
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 3 mesi dopo la fine del trattamento
	MC	Come CT / VT

Diverticolosi	Definizione	Frequente insorgenza di diverticoli nel colon, tra cui il colon sigmoideo. Perlopiù asintomatica, sintomi solo quando progredisce in una diverticolite.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CI se sintomi
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Diverticolite



Dolore cronico	Definizione	Definizioni diverse: talvolta definito come dolore continuo o recidivante per oltre 6 mesi, spesso associato a situazioni di stress psichico
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Donazione di sangue, in generale	Nota bene	Si deve rinunciare a una donazione di sangue prima di una donazione di cellule staminali del sangue (soprattutto donazione di midollo osseo).
		Dopo una donazione di cellule staminali del sangue (compresa DLI), si deve aspettare un anno prima di donare nuovamente il sangue.
Drepanocitosi	Rinvio	Anemia falciforme
Droga, consumo di	Definizione	Droga = sostanza che influisce il sistema nervoso centrale (percezione, sentimenti, emozioni, motricità) e che può alterare la coscienza. Ne fanno parte l'alcol, il cannabis (canapa indiana, marijuana), la cocaina, l'eroina, medicinali, Ecstasy, le anfetamine, delle sostanze da sniffare, allucinogeni.
		I cannabidioli (CBD), derivati della canapa, sono autorizzati in Svizzera e sono acquistabili senza prescrizione. Sempre verificare la causa e la regolarità dell'assunzione.
Droga, consumo per endovena	Definizione	Consumo di droghe per endovena senza prescrizione medica.
	Registrazione	Accettare se: <ul style="list-style-type: none">• consumo > 10 anni fa
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Comportamento a rischio, sessuale e altro



Droga, consumo per via orale o per inalazione	Nota bene	Non accettare se dipendenza, ossia se sussiste il dubbio che il donatore non può smettere le sostanze almeno 2 settimane
	Registrazione	Accettare se prodotti cannabinoidi e se non vi sono indizi di scarsa compliance Non accettare se consumo di droghe regolare (più volte alla settimana)
	CT / VT	Non accettare se: <ul style="list-style-type: none">• consumo attuale regolare (più volte alla settimana) eccezione: accettare se prodotti cannabinoidi e se non vi sono indizi di scarsa compliance• la capacità d'intendere è compromessa/limitata a causa del consumo (consenso informato)• il donatore si trova in una cura di disassuefazione (per es Antabus) Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Droga, sostituzione
	<hr/>	
Droga, sostituzione	Registrazione	Accettare se: <ul style="list-style-type: none">• sostituzione con buprenorfina• stabile situazione di vita• uso da lungo tempo Non accettare se: <ul style="list-style-type: none">• sostituzione con metadone
	CT / VT	Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Droga, consumo per endovena



Dry Needling	Definizione	Anche “trigger point dry needling”, complemento alla terapia manuale dei Trigger Point. Applicazione su persone con dolori miofasciali cronici o anche acuti. Trattamento eseguito da medici, naturopati o fisioterapisti con corrispondente formazione (in CH).
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare se: <ul style="list-style-type: none"> • il Dry Needling è stato eseguito in Svizzera • non vi sono dubbi sulla tecnica lavorativa sterile e sull’impiego di materiale monouso • non vi sono segnali di un’infezione (batterica) <p>CIT di 1 mese se il Dry Needling è stato eseguito in un paese con elevato rischio di infezione</p>
	MC	Accettare 48 ore dopo il trattamento se <ul style="list-style-type: none"> • il Dry Needling è stato eseguito in Svizzera • non vi sono dubbi sulla tecnica lavorativa sterile e sull’impiego di materiale monouso • non vi sono segnali di un’infezione (batterica) <p>CIT di 2 mesi dopo il trattamento se il Dry Needling è stato eseguito in un paese con elevato rischio di infezione</p>
Duodart	Rinvio	Medicamenti teratogeni
Dura madre	Rinvio	Creutzfeldt-Jakob, malattia di, rischio 1_Trapianto di tessuto umano
Dutasterid	Rinvio	Medicamenti teratogeni
Ebola	Rinvio	Febbre emorragica virale



Echinococcosi	Definizione	Infezione da cestodi del genere Echinococcus (parassita intestinale, ad es. Echinococcus multilocularis). L'uomo è un ospite intermedio accidentale. Via di trasmissione: ingestione orale di uova tramite contatto con volpi, cani e gatti oppure ingestione di frutta o verdura contaminata da escrementi.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Eczema	Definizione	Malattia della pelle infiammatoria / reazione dermica infiammatoria non infettiva. Diversi fattori scatenanti. Gruppi principali: <ul style="list-style-type: none"> • eczema atopico • eczema da contatto allergico • eczema da contatto tossico
	Registrazione	Accettare se <ul style="list-style-type: none"> • i siti di punzione non sono colpiti • è sufficiente un trattamento topico
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Allergia Dermatite
	Ehlers-Danlos, sindrome di	Definizione
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID

Elmintiasi	Definizione	Malattia causata da vermi parassitari.
	Registrazione	Non accettare Eccezione: CIT fino a guarigione completa e fine del trattamento in caso di infezione non problematica: <ul style="list-style-type: none"> • ascaridiasi (ascaridiosi) • ossiuro (Enterobius vermicularis) • Taenia saginata • verme solitario (Taenia solium)
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Echinococcosi

Emangioma	Definizione	Tumore benigno dei vasi sanguigni. Insorge spesso nella pelle o nel fegato, ma può anche interessare tutto il corpo.
	Registrazione	Accettare se: <ul style="list-style-type: none"> • asintomatico • dimensione stabile del tumore • solitario Altrimenti attitudine da determinare dal medico
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come CT / VT

Embolia polmonare	Definizione	Ostruzione di un vaso sanguigno nei polmoni. Causata nell'80 per cento dei casi da un trombo nella vene profonde delle gambe o bacino.
	Nota bene	Il fattore G-CSF aumenta il rischio di trombosi
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID



Emicrania	Definizione	Mal di testa primario caratterizzato da dolori ricorrenti, a natura pulsante, perlopiù monolaterali, spesso accompagnati da sintomi supplementari quali nausea, vomito, fotofobia e fonofobia. Talvolta è preceduta dall'aura con disturbi visivi o sensoriali. Diversi fattori scatenanti tra cui ormoni, sonno, stress, alimenti, ambiente. Informarsi sui fattori scatenanti e sul grado di gravità!
	Registrazione	Accettare tranne se gli attacchi sono frequenti (1 – 2 volte al mese) e gravi o richiedono una terapia medicamentosa profilattica
	CT / VT	Come registrazione Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Cefalea a grappolo
Emocromatosi	Definizione	Emosiderosi / siderosi. <ul style="list-style-type: none"> Ereditarietà autosomica recessiva: assimilazione aumentata di ferro nel tratto superiore dell'intestino tenue. Danno agli organi dovuti a depositi di ferro. secondaria / acquisita (ad es. a causa di molte trasfusioni di sangue, emolisi di lunga durata)
	Registrazione	Accettare se predisposizione genetica senza danni agli organi sotto trattamento adeguato
	CT / VT	Accettare se non vi sono segni di danni agli organi (cuore, fegato, pancreas), altrimenti CID
	MC	Come CT / VT
Emofilia A e B	Definizione	Malattia ematica. Malattia con ereditarietà recessiva legata al cromosoma X, colpisce di più gli uomini. Emofilia A: carenza del fattore VIII Emofilia B: carenza del fattore IX
	Registrazione	Non accettare Le portatrici femminili possono essere accettate. Informare il centro di trapianto
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione



Emoglobinopatia	Definizione	Disordine della sintesi dell'emoglobina dovuto a difetto genetico. Rilevanza clinica differenziata, a seconda dell'ereditarietà, dominanza (eterozigosi, omozigosi) e localizzazione del difetto.
	Nota bene	Valutazione finale dell'attitudine da parte del medico, informare il centro di trapianto
	Vedere anche	Anemia falciforme Talassemia
Emorragia cerebrale at-traumatica	Rinvio	Malattia cerebrovascolare
Emorragia cerebrale dovuta a incidente	Definizione	Emorragia cerebrale (traumatica) dovuta a incidente, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> • emorragia subaracnoidea traumatica • emorragia epidurale traumatica • emorragia sottodurale traumatica
	Registrazione	CIT fino a guarigione completa Non accettare fintanto che sotto profilassi per l'epilessia e se presenza di conseguenze neurologiche tardive
	CT / VT	Come registrazione Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Creutzfeldt-Jakob, malattia di, rischio 3_Operazione al cervello o midollo spinale Epilessia Operazione grande_4 Operazione media_3
Emorroidi	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CI se sanguinamento forte
	MC	Come CT / VT



Emorroidi, cura chirurgica	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 1 mese dopo l'intervento
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Operazione piccola_2
Encefalite	Definizione	Infiammazione del cervello. Perlopiù dovuta a infezione, quasi sempre da virus, raramente da batteri, protozoi o funghi.
	Nota bene	Informarsi sempre sulle conseguenze tardive come convulsioni o epilessia, emicranie croniche o altri sintomi !
	Registrazione	Accettare se: <ul style="list-style-type: none"> • nessun danno permanente • l'agente patogeno non costituisce motivo di esclusione CIT di 12 mesi dopo guarigione completa Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Meningite
	Endocardite	Definizione
	Registrazione	Accettare se: <ul style="list-style-type: none"> • decorso privo di complicazioni • guarigione completa • senza aritmia cardiaca • non è necessaria alcuna profilassi dell'endocardite
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione



Endometriosi	Definizione	Malattia frequente benigna nella quale il tessuto uterino è presente anche in altri organi (generalmente nella zona addominale inferiore, nella zona pelvica, spesso nelle ovaie).
	Nota bene	Informarsi sulla localizzazione e sui sintomi
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CI se sintomatica Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT
Endoscopia	Definizione	Gastro- o coloscopia tramite un endoscopio flessibile. Rischio di trasmissione del VEB o VEC.
	Registrazione	Accettare se non c'è una condizione patologica
	CT / VT	Accettare se non c'erano complicazioni o un risultato patologico. Altrimenti CIT adeguata CIT di 1 mese dopo l'intervento
	MC	Accettare se non c'erano complicazioni o un risultato patologico. Altrimenti CIT adeguata CIT di 2 mesi dopo l'intervento
Enfisema	Rinvio	Enfisema polmonare
Enfisema polmonare	Definizione	Iperdilatazione irreversibile degli alveoli dei polmoni. Endpoint di diverse malattie polmonari croniche.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Vedere anche	BPCO



Epatite	Definizione	Infiammazione del fegato, non infettiva/infettiva, acuta/cronica, numerose cause
	Registrazione	Non accettare in caso di causa sconosciuta
	CT / VT	Accettare in caso di epatite concomitante con infezione virale dopo completa guarigione e normalizzazione dei valori epatici
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Epatite A Epatite B, acuta Epatite C Epatite E Herpes labiale Malattia mani-piedi-bocca Mononucleosi infettiva

Epatite A	Definizione	Infezione col virus dell'epatite A
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 3 mesi dopo guarigione completa
	MC	CIT di 4 mesi dopo guarigione completa

Epatite B, acuta	Registrazione	CIT di 2 anni dopo guarigione completa
	CT / VT	CIT di 2 anni Poi accettare se HBs-Ag negativo, Ac anti-HBc positivo, anti-HBs positivo et titolo anti-HBs > 100 IU/L, PCR VHB negativo
	MC	Come CT / VT



Epatite B, contatto domestico	Definizione	Convivente seropositivo per l'epatite B
	Registrazione	Accettare se il donatore è vaccinato
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Attività a rischio Epatite Epatite, attività a rischio, contatto
Epatite B, cronica	Definizione	Portatore cronico del virus, infezione persistente: HBs-Ag positivo e/o PCR VHB positivo, Ac anti-HBc positivo, anti-HBs negativo
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Epatite B, dichiarata o confermata	Registrazione	CIT di 2 anni dopo guarigione completa
	CT / VT	Accettare se: <ul style="list-style-type: none"> • Infezione risalente a > 2 anni, o asintomatica • HBs-Ag negativo, Ac anti-HBc positivo, anti-HBs positivo et titolo anti-HBs > 100 IU/L, PCR VHB negativo
	MC	Come CT / VT



Epatite B, partner sessuale	Definizione	Partner sessuale affetto da epatite B acuta o portatore cronico del virus
	Registrazione	Accettare se: <ul style="list-style-type: none"> • ultimo rapporto sessuale > di 12 mesi fa o • il donatore è vaccinato
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Attività a rischio Epatite Epatite, attività a rischio, contatto
Epatite C	Definizione	Infezione col virus dell'epatite C, acuta o cronica Test positivo per Ac anti-VHC e/o PCR VHC
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Vedere anche	Attività a rischio Comportamento a rischio, sessuale e altro Epatite Epatite, attività a rischio, contatto Situazione a rischio
Epatite C, partner sessuale	Definizione	Partner sessuale affetto da epatite C
	Registrazione	Accettare se ultimo rapporto sessuale > 12 mesi fa
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Comportamento a rischio, sessuale e altro Situazione a rischio



Epatite E	Definizione	<p>Infezione con il virus dell'epatite E. In Europa genotipi 3&4 - > Trasmissione dagli animali con il consumo di carne cruda o non sufficientemente cotta (maiale, caccia, molluschi). Trasmissione possibile da prodotti sanguigni.</p> <p>Infezione acuta di regola asintomatica (90%) / mite, delimitata. Tempo di incubazione 3-8 settimane. Evoluzione severa / cronica in pazienti che soffrono di malattie epatiche, che sono immunosoppressi, che sono stati trapiantati o in prematuri o neonati (gruppi a rischio).</p> <p>Dal 1.10.2018 tutti i donatori di sangue (rilevante per la liberazione del prodotto) e i donatori di cellule staminali del sangue (non rilevante per la liberazione del prodotto) sono sottoposti al test HEV.</p>
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	<p>CIT di 2 mesi se HEV NAT positiva, poi ripetere il Test NAT</p> <p>Il centro di trapianto può decidere di ridurre la durata del CIT, se donatore asintomatico</p>
	MC	Come CT / VT
Epilessia	Definizione	<p>Condizione neurologica caratterizzata da improvvisa perdita della coscienza e violenti movimenti convulsivi dei muscoli. Gli attacchi epilettici sono il risultato dell'attività eccessiva e anormale dei neuroni. Può essere di tipo idiopatico (nessuna causa verificabile o acquisita p.es. in seguito a un trauma cranico, un ictus, un tumore).</p> <p>Grand mal: crisi generalizzate, tipo tonico-cloniche Petit mal: attacchi tipo assenza, un'interruzione dello stato di coscienza per un breve periodo.</p>
	Registrazione	<p>Accettare se:</p> <ul style="list-style-type: none"> il trattamento con farmaci anticonvulsivanti è finito da 3 anni al minimo e in questo tempo non si è manifestato alcun attacco <p>Non accettare se il trattamento antiepilettico è sempre in corso</p>
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione



Erisipela	Definizione	Infezione batterica degli strati superficiali della pelle e dei vasi linfatici. Forte arrossamento ben delimitato. Causata perlopiù da streptococchi beta-emolitici del gruppo A, raramente da altri agenti patogeni come <i>Staphylococcus aureus</i> o <i>Klebsiella pneumoniae</i> . Nella maggior parte dei casi il punto d'ingresso è una piccola ferita.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 1 mese dopo la fine del trattamento antibiotico e guarigione completa
	MC	Come CT / VT
Eritema infettivo	Definizione	Malattia infettiva contagiosa causata da un Parvovirus e con decorso spesso asintomatico, solo una parte delle persone infette mostra la caratteristica eruzione cutanea.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 1 mese dopo guarigione
	MC	Come CT / VT
Erivedge	Rinvio	Medicamenti teratogeni
Ernia discale, operazione	Rinvio	Operazione media_3
Ernia iatale, operazione	Rinvio	Operazione media_3
Ernia inguinale	Rinvio	Operazione media_3
Eroina	Rinvio	Droga, consumo di



Esofagite	Definizione	<p>Infiammazione della mucosa dell'esofago. Locale/diffusa, acuta/cronica. Forma più frequente: malattia da reflusso esofageo (reflusso di succo gastrico).</p> <p>Altre cause: infezioni, fattore tossico-medicamentoso</p> <p>Rischio di degenerazione maligna della mucosa in caso di esofagite cronica.</p>
	Registrazione	<p>Non accettare se</p> <ul style="list-style-type: none"> • sintomatica • cronica • esistono segni di malignità
	CT / VT	Accettare se sotto trattamento, asintomatica e nessun segno di malignità
	MC	Come CT / VT
Esofagite da reflusso	Rinvio	Esofagite
Essudati cotonosi	Definizione	<p>Alterazioni biancastre dall'aspetto di fiocchi di cotone all'interno del globo oculare nell'ambito di malattie oculari (ad es. trombosi della vena retinica centrale) oppure di malattie generiche (ad es. diabete mellito, ipertensione, collagenosi, HIV).</p> <p>Causa: ostruzione capillare della retina, segni di infarti delle fibre nervose.</p>
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Estrazione dentale	Rinvio	Operazione piccola_2



Faringite	Definizione	Mal di gola, infiammazione della faringe
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 2 settimane dopo la fine del trattamento antibiotico e fino a guarigione completa
	MC	Come CT / VT Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
Febbre dei tre giorni, contatto	Rinvio	Malattie infantili, contatto
Febbre emorragica virale	Definizione	Febbre infettiva che si accompagna a sanguinamenti. Nella maggior parte dei casi causata da infezioni virali, spesso altamente contagiosa, con esito perlopiù severo o letale. Soggetto all'obbligo di notifica. Presente soprattutto in Africa, America del Sud e Sud-est asiatico. Febbre emorragiche virali sono molto rare in Europa centrale e America del Nord. Vi fanno parte ad es.: febbre di Lassa, febbre Congo-Crimea (CCHF), Ebola, febbre di Marburg, febbre di Dengue (forma emorragica).
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Febbre emorragica virale, contatto	Definizione	Tempo di incubazione generalmente di 2-21 giorni, nella maggior parte dei casi di 7-10 giorni
	Registrazione	CIT di 6 mesi dopo rientro dalla zona endemica / contatto con una persona ammalata e conclusi eventuali accertamenti
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Lista dei paesi
Febbre ghiandolare	Rinvio	Mononucleosi infettiva



Febbre gialla	Definizione	Malattia infettiva causata dal virus della febbre gialla (virus RNA appartenente alla famiglia Flaviviridae). Presente nelle zone tropicali e subtropicali dell'America meridionale e in Africa, trasmissione tramite zanzare. Tempo di incubazione 3–6 giorni. Se decorso grave, possibile esito letale. Vaccino efficace.
	Registrazione	CIT di 3 mesi dopo guarigione completa
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione

Febbre gialla, contatto	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 1 mese dopo il contatto
	MC	Come CT / VT

Febbre mediterranea familiare	Definizione	Polisierosite ricorrente familiare. Malattia genetica con febbre ricorrente e forti dolori, dovuti a un' infiammazione delle sierose (peritonite, pleurite, artrite). Spesso sono colpite le persone provenienti dalla zona mediterranea orientale
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione

Febbre Q	Definizione	Zoonosi causata dal batterio Coxiella burnetii con il quadro clinico di una polmonite.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID



Febbre reumatica	Definizione	Malattia reattiva in seguito a infezione da streptococchi del gruppo A (classificazione di Lancefield). Una-tre settimane dopo un'infezione insorge l'infiammazione abatterica di diversi organi.	
	Registrazione	Accettare se: <ul style="list-style-type: none">• guarigione completa• evento unico• nessuna malattia cardiaca rimanente• nessuna malattia renale rimanente Valutazione dell'idoneità da parte di una medica	
	CT / VT	Come registrazione	
	MC	Come registrazione	
<hr/>			
Febbre ricorrente	Definizione	Malattia infettiva causata da batteri del genere Borrelia e caratterizzata da attacchi di febbre ripetuti, detti appunto febbre ricorrente.	
	Registrazione	Accettare 2 anni dopo guarigione completa senza residui	
	CT / VT	Come registrazione	
	MC	Come registrazione	
<hr/>			
Ferita alla testa	Definizione	Lesione della testa dovuta a un impatto violento esterno, con o senza interessamento del cervello.	
	Nota bene	In seguito a una ferita alla testa che dall'esterno sembra innocua possono insorgere conseguenze gravi se l'effettiva entità passa inosservata. Osservare eventuali sintomi neurologici come mal di testa, vertigini, nausea, vuoti di memoria, perdita di coscienza.	
Nr: 1412	Name: DOK_Donor_Eligibility_Criteria-Blood_Stem_Cell_Donation_I	Version: 10.0	Gültig ab: 14.08.2026
			Seite: 77 von 187



Ferita alla testa, grave	Definizione	Ferita alla testa con lesione cranica/frattura cranica/trauma cranico. Tessuto cerebrale leso o alterato nella sua funzione: <ul style="list-style-type: none"> • commozione cerebrale • contusione cerebrale • compressione cerebrale Complicazioni: perdita di coscienza, pressione intracranica, ematoma epidurale o subdurale. Complicanze tardive neurologiche, ad es. epilessia.
	Registrazione	CIT fino a guarigione completa Non accettare se complicazioni tardive neurologiche Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Emorragia cerebrale dovuta a incidente Epilessia
Ferita alla testa, lieve	Definizione	Ferita alla testa con lacerazione/contusione o tumefazioni.
	Registrazione	CIT fino a guarigione completa
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
Ferita da morso di animale domestico / selvatico	Registrazione	CIT di 12 mesi dopo la vaccinazione antirabbica post-esposizione / vaccinazione passiva
	CT / VT	CIT di 2 settimane dopo la fine del trattamento antibiotico e fino a guarigione completa CIT di 12 mesi dopo la vaccinazione antirabbica post-esposizione / vaccinazione passiva
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Lista delle vaccinazioni
Ferroterapia	Rinvio	Anemia, carenza di ferro



Fibroadenoma al seno, ablazione	Rinvio	Operazione media_3
Fibromialgia	Definizione	Malattia cronica, dolorosa e non infiammatoria dell'apparato muscolo-scheletrico di eziologia sconosciuta. Sospetto processo autoimmune.
	Registrazione	Non accettare (problemi psichici dovuti allo stress persistente / dolori cronici)
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Vedere anche	Malattia autoimmune
Fibrosi cistica	Rinvio	Mucoviscidosi
Filariosi	Definizione	Infezione da Filarie (vermi cilindrici parassiti). Si manifesta a seconda del genere soprattutto nel sistema linfatico o nel tessuto connettivo superficiale o profondo. Trasmissione delle larve delle Filarie attraverso insetti ematofagi, in particolare nei Paesi tropicali.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Finacapil	Rinvio	Medicamenti teratogeni
Finasterid	Rinvio	Medicamenti teratogeni
Flebite	Rinvio	Tromboflebite / Flebite



Flebotrombosi	Definizione	Trombosi delle vene profonde
	Nota bene	La somministrazione di G-CSF è un ulteriore fattore di rischio. Pericolo di embolia in caso di formazione di trombi.
	Registrazione	CIT di 12 mesi dopo la fine del trattamento e guarigione completa se <ul style="list-style-type: none">• unico evento di trombosi provocato• nessuna malattia di base scatenante• nessuna familiarità
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione

Follicolite	Definizione	Infiammazione dei follicoli piliferi. Distinzione tra forme infettive e non infettive. La follicolite infettiva è di natura perlopiù batterica, può però anche essere causata da altri patogeni (virus, funghi o parassiti).
	Registrazione	Accettare in caso di lievi sintomi se: <ul style="list-style-type: none">• manifestazione limitata localmente• necessario soltanto un trattamento locale Non accettare in caso di indizi di immunodeficienza o alopecia cicatriziale cronica
	CT / VT	Come registrazione Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT

Forame ovale	Rinvio	Malattia cardiaca
---------------------	--------	-------------------

Foruncolo	Rinvio	Ascesso
------------------	--------	---------



Frattura ossea	Definizione	Frattura
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	<p>CI da valutare a seconda della situazione dopo trattamento chirurgico</p> <p>CIT di 1 mese dopo l'allontanamento del gesso</p> <p>In caso di frattura di femore, bacino, osso sacro o vertebra: ev. solo donazione di cellule staminali periferiche possibile, attitudine da determinare dal MDD</p> <p>Valutazione dell'idoneità da parte di una medica in caso di trattamento preventivo con anticoagulanti</p>
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	<p>Operazione grande_4</p> <p>Operazione media_3</p> <p>Operazione piccola_2</p>
Fuoco di Sant'Antonio	Rinvio	Herpes zoster
Gammopatia monoclonale di significato indeterminato (GMSI)	Definizione	Presenza di un'immunoglobulina monoclonale (paraproteina) nel sangue. Può essere lo stadio preliminare di una malattia linfoproliferativa maligna, ad es. di un mieloma multiplo, morbo di Waldenström oppure amiloidosi. Probabilità di una progressione circa 1-1.5% all'anno
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Gastrectomia	Rinvio	Operazione grande_4



Gastrite	Definizione	<p>Infiammazione dello stomaco. Acuta/cronica, diversi tipi</p> <p>Tipo A: malattia autoimmune con autoanticorpi contro le cellule parietali. Può causare una carenza di vitamina B12 con la distruzione delle cellule parietali -> fattore intrinseco ridotto -> riduzione dell'assorbimento della B12 -> anemia perniciososa</p> <p>Tipo B: infezione batterica, agente patogeno: Helicobacter pylori</p> <p>Tipo C: scatenata d'agenti chimici (succo biliare, medicinali come gli antireumatici non steroidei, diclofenac, ibuprofene), antibiotici</p> <p>Terapia: antiacidi (neutralizzatore della acidità dello stomaco)</p>
	Registrazione	<p>Accettare se lievi disturbi all'addome superiore alleviati con antiacidi</p> <p>Non accettare :</p> <ul style="list-style-type: none"> • se tipo A con o senza carenza di vitamina B12 • se gli antiacidi non alleviano la gastrite
	CT / VT	<p>Accettare se asintomatica sotto antacidi</p> <p>CIT di 2 settimane dopo la fine del trattamento antibiotico e fino a guarigione completa in caso di gastrite acuta</p> <p>CID se di tipo A</p>
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Ulcera gastrica / Ulcera duodenale
Gastroenterite	Rinvio	Malattia diarroica
Gastroenterite, contatto	Rinvio	Malattia diarroica, contatto
Gilbert, sindrome di	Rinvio	Gilbert-Meulengracht, sindrome di



Gilbert-Meulengracht, sindrome di	Definizione	Morbo di Gilbert, sindrome di Gilbert. Disordine ereditario del metabolismo della bilirubina. Provoca una lieve iperbilirubinemia, perlopiù asintomatica e innocua. Diffusa in tutto il mondo, non è necessaria una terapia.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CI in caso di itterizia
	MC	Come CT / VT
Glaucoma	Definizione	Malattia oculare che può provocare la perdita di fibre nervose e, in casi estremi, la cecità. Diverse cause, spesso però è legata a una pressione oculare elevata.
	Registrazione	Non accettare anche se operato
	CT / VT	CID
	MC	CID
Glomerulonefrite	Definizione	Infiemmazione bilaterale dei reni nella quale sono principalmente colpiti i glomeruli renali. Diverse cause, tra cui processi autoimmuni, infezioni, malattie del metabolismo, medicamenti. Può provocare una grave insufficienza renale.
	Nota bene	Accertare sempre la causa
	Registrazione	CIT di 5 anni dopo guarigione completa se la causa lo consente e non è presente una disfunzione renale Non accettare se: <ul style="list-style-type: none"> • associata a malattia autoimmune • glomerulonefrite cronica o secondaria
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
Glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), carenza di	Definizione	Carenza dell'enzima glucosio-6-fosfato deidrogenasi dovuta a trasmissione genetica ->distruzione accresciuta degli eritrociti -> anemia emolitica di diverso grado.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID

Gonorrhoea	Definizione	Blenorrhagia. Infezione genitale batterica, causata da un gonococco, la <i>Neisseria gonorrhoeae</i> . Diffusione mondiale, si manifesta solo nell' uomo, trasmissione per via sessuale.
	Registrazione	CIT di 12 mesi dopo la fine del trattamento del donatore e del partner sessuale
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
Gotta	Definizione	<p>Malattia del metabolismo delle purine, attacchi ricorrenti.</p> <p>Deposito di cristalli di acido urico nelle articolazioni periferiche (e tessuti) che provoca l'artrite (urica). Spesso colpisce la metatarso-falangea dell'alluce = podagra.</p> <p>Acuta (attacco di gotta) / cronica</p> <p>Possibile insufficienza renale a causa di un danno duraturo del rene.</p>
	Nota bene	L'attacco di gotta potrebbe essere scatenato dal G-CSF.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	<p>Accettare se malattia stabile e ben controllata</p> <p>Soltanto donazione di midollo osseo</p> <p>Valutazione dell'idoneità da parte di una medica</p>
	MC	Come CT / VT
	Gravidanza	Registrazione
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Aborto
Guillain-Barré, sindrome di	Rinvio	Malattia autoimmune
Haschisch	Rinvio	Droga, consumo di



Hashimoto, tiroidite di	Definizione	Infiammazione autoimmune della tiroide
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	Accettare se stabile e senza disturbi dopo almeno 3 mesi di terapia sostitutiva Soltanto donazione di midollo osseo, informazione al centro di trapianto Non accettare se: <ul style="list-style-type: none">• tiroidite attiva• assunzione di medicinali tireostatici
	MC	Come CT / VT Accettazione del rischio da parte del centro di trapianto
	Vedere anche	Patologia tiroidea

Herpes genitale	Definizione	Malattia infettiva a trasmissione sessuale, causata dal virus Herpes simplex (VHS).
	Registrazione	Accettare in assenza di altre malattie sessualmente trasmissibili all'anamnesi
	CT / VT	CI fino a guarigione delle lesioni e 2 settimane dopo la fine del trattamento, se l'anamnesi non rivela alcun'altra malattia sessualmente trasmissibile
	MC	Come CT / VT

Herpes labiale	Definizione	Manifestazione più frequente di un'infezione da virus Herpes simplex con formazione di vescicole alle labbra.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare
	MC	Accettare Informare il centro di trapianto se i sintomi sono presenti al momento della donazione



Herpes zoster	Definizione	Malattia virale scatenata dal virus varicella-zoster (VZV, un virus della famiglia Herpesviridae). Riattivazione endogena di una prima infezione precedente (perlopiù varicella nell'infanzia). Il virus rimane latente tutta la vita nelle cellule della glia dei gangli dorsali.
	Nota bene	Informare sempre il centro di trapianto
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 1 mese dopo guarigione completa (lesioni cutanee guarite)
	MC	CIT di 2 mesi dopo guarigione completa (lesioni cutanee guarite)
Herpes zoster, contatto	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Valutazione dell'idoneità da parte di una medica Informare il centro di trapianto
	MC	Come CT / VT, con serologia della varicella
HIV, infezione	Definizione	Infezione dal virus HIV, test positivo per il HIV
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
HTLV I/II, infezione	Definizione	Virus T-linfotropico dell'uomo. Un retrovirus oncogeno che infetta l'uomo ed altri primati e provoca la leucemia a cellule T dell'adulto e la paraparesi spastica tropicale. Trasmissione per via verticale / transplacentare, sessuale e per via ematica (trasfusione di prodotti sanguigni contaminati). Il virus è endemico in certe regioni dell'Africa subsahariana, dell'America del Sud, nei Caraibi, nel Giappone.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID



Ictus cerebrale Rinvio Malattia cerebrovascolare

Ileostomia Rinvio Stomia



Immunobioterapia	Definizione	<p>Forma di trattamento con la quale si influenza il sistema immunitario</p> <p>Diverse possibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stimolazione: vaccino attivo, somministrazione di immunostimolanti (immunoterapia attiva non specifica per malattie tumorali) • soppressione (somministrazione di immunosoppressori): in caso di malattie autoimmuni, dopo trapianto (di organo) • sostituzione: vaccinazione passiva con immunoglobuline, somministrazione di anticorpi monoclonali (ad es. m. di Crohn, immunoterapia specifica per malattie tumorali) • modulazione: iposensibilizzazione in caso di allergie, immunoassorbimento per eliminare autoanticorpi o immunocomplessi
	Registrazione	<p>Accettare in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vaccinazioni attive con termine di rinvio secondo la lista delle vaccinazioni (Allegato Art. 7, Vaccine Check) • Immunoprofilassi anti-D (Rhophylac®) (vedi anche termine di CIT gravidanza / aborto) • de/iposensibilizzazione in caso di allergie • preparati batterici (ad es. Broncho-Vaxom®, Buccalin® ecc), se nessuna patologia cronica o infezione recidiva • preparati di origine animale(ad es.preparati d'origine bovina comme Bio-Oss®, Bio-Gide®, Cerabone®), se nessuna patologia cronica o infezione recidivante <p>CIT di 12 mesi dopo l'interruzione della sieroterapia / immunobioterapia con preparati di origine umana (ad es. Cytolect®, Hepatect®, vaccinazione passiva antirabbica o anti-tetanica, Varitect®)</p> <p>Non accettare se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiego per il trattamento di malattie autoimmuni, malattie tumorali, patologie croniche o infezioni recidivanti
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Lista delle vaccinazioni



Immunodeficienza comune variabile, CVID	Definizione	Sindrome da immunodeficienza variabile, sindrome da carenza di anticorpi. Immunodeficienza congenita, malattia relativamente rara, ma causa genetica la più comune di un difetto immunitario sintomatico con carenza di IgG. Spesso anche IgA e IgM ridotti.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Immunosuppressione	Registrazione	Non accettare, tranne se terapia locale (ad es. crema cortisone)
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Creutzfeldt-Jakob, malattia di, rischio 1_Trapianto di tessuto umano Immunobioterapia Malattia autoimmune
Impianto dentale	Rinvio	Innesto endosseo e tendineo
Infarto cardiaco	Rinvio	Malattia cardiovascolare



Infezione delle vie respiratorie superiori	Definizione	Malattia infettiva acuta, per lo più virale, della mucosa del naso (con / senza seni paranasali), gola o bronchi
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare in caso di lievi sintomi di raffreddore e se disturbi in regressione CIT di 1 settimana in caso di febbre e pessimo stato di salute generale Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Accettare in caso di lievi sintomi di raffreddore e se disturbi in regressione CIT di 2 settimane in caso di febbre e pessimo stato di salute generale Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	Vedere anche	Sinusite (rinosinusite) acuta
Infezione delle vie urinarie	Definizione	Malattia infettiva del tratto urinario
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 2 settimane dopo la fine del trattamento antibiotico e fino a guarigione completa Valutazione dell'idoneità da parte di una medica in caso di infezione delle vie urinarie recidivante
	MC	Come CT / VT
Infezione micotica	Rinvio	Micosi
Infiammazione articolare	Rinvio	Artrite non infettiva
Infiammazione cutanea	Rinvio	Dermatite
Infiammazione della cistifellea	Rinvio	Colecistite
Influenza	Rinvio	Infezione delle vie respiratorie superiori



Influenza, contatto	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare
	MC	Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
Innesto endosseo e tendineo	Definizione	Anche incremento osseo.
	Registrazione	Non accettare: impianto dell'osso cranico e della dura madre Accettare l'impiego dei seguenti materiali: <ul style="list-style-type: none"> • Bio-Oss© (derivato dei componenti minerali dell'osso bovino) • Bio-Oss Collagen© (90% di Bio-Oss) • Bio-Gide© (membrana in collagene suino) • Cerabone® • Autoinnesto • Alloinnesto umano osseo o tendineo (eccetto osso cranico)
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Creutzfeldt-Jakob, malattia di, rischio 1_Trapianto di tessuto umano
Inoculazione, lesione da	Rinvio	Contatto con sangue estraneo
Insufficienza cardiaca	Definizione	Una delle malattie internistiche più frequenti (in Europa). L'80-90% dovuto a disfunzioni del miocardio. Possibili cause: frequenti: coronaropatia, ipertensione arteriosa, fibrillazione atriale più rare: cardiomiopatia, valvulopatia, malattia del pericardio Crescente prevalenza e incidenza con l'età
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID



Insufficienza renale acuta / cronica	Definizione	Ipofunzione di uno o entrambi i reni. Aumento della concentrazione nel sangue di sostanze escrete nell'urina. <ul style="list-style-type: none"> • Acuta (IRA): rapido peggioramento della funzione renale che interviene nell'arco di ore o giorni, generalmente reversibile. Causa pre-renale/renale/post renale • Cronica (IRC): perdita progressiva della funzione renale sul lungo tempo, generalmente irreversibile. Diverse cause, ad es. diabete, ipertensione, glomerulopatie, nefrite interstiziale
	Registrazione	Non accettare in caso di insufficienza renale cronica Altrimenti attitudine da determinare dal medico
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
Insufficienza surrenalica	Definizione	Ipofunzione surrenalica che se non trattata provoca una carenza di ormoni surrenali potenzialmente letale.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Insufficienza venosa cronica (IVC)	Definizione	Disturbo del microcircolo a seguito di un insufficiente ritorno venoso al cuore. Conseguenze: in parte gravi alterazioni venose e cutanee.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Interruzione di gravidanza	Rinvio	Aborto
Intolleranza al glutine	Rinvio	Celiachia



Intolleranza all'istamina	Definizione	Il consumo di alimenti ricchi di istamina (ad es. formaggio stagionato, salsiccia, vino rosso) provoca reazioni pseudoallergiche
	Registrazione	Accettare in caso di lievi sintomi con o senza trattamento Non accettare se: <ul style="list-style-type: none">• gravi disturbi• nota grave reazione circolatoria (ad es. shock)
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
Intossicazione alimentare	Rinvio	Malattia diarroica
Ipercolesterolemia	Definizione	Eccesso di colesterolo nel sangue. Fattore di rischio rilevante per l'arteriosclerosi / episodi cardiovascolari. Diverse cause: primitiva: malattia ereditaria (ipercolesterolemia familiare). secondarie: diabete, sovrappeso, alcolismo, ipotireosi, insufficienza renale, ecc.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CID se associato a malattia cardiovascolare
	MC	Come CT / VT
Iperidrosi	Definizione	Eccessiva sudorazione non fisiologica. Può essere generalizzata o locale (p. es. palmo della mano). Sottodivisione in iperidrosi primaria (causa non identificabile) e secondaria (causa identificabile, p. es. diabete mellito, tumore, malattia infettiva, disturbi endocrini o psichici).
	Registrazione	Accettare se: <ul style="list-style-type: none">• causa primaria• malattia pregressa per iperidrosi secondaria non è motivo di esclusione
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Botox, trattamento



Iperparatiroidismo	Definizione	Secrezione accresciuta di paratormone (PTH) da parte della paratiroide che influenza in modo determinante il metabolismo del calcio, provocando un ipercalcemia.
	Registrazione	Accettare se: <ul style="list-style-type: none">• trattamento chirurgico riuscito o forma lieve con o senza terapia medicamentosa• nessuna forma maligna• in premenopausa
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione

Iperplasia nodulare focale	Rinvio	Emangioma
-----------------------------------	--------	-----------

Iperplasia prostatica benigna (IPB)	Definizione	Ingrossamento benigno della prostata dovuto a un aumento del numero delle cellule prostatiche.
	Registrazione	Accettare tranne se sotto trattamento con medicinali teratogeni come Proscar®, Finasterid, Avodart®, Duodart® Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Medicamenti teratogeni

Iperplasia surrenale	Definizione	Disordine endocrino ereditario dovuto alla carenza di un enzima steroideo
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID



Ipertensione arteriosa	Definizione	Aumento della pressione nel sistema vascolare arterioso. Nella maggior parte dei casi soltanto sintomi non specifici. Definizione: $\geq 160/100$ (grado 2 secondo ESH European Society of Hypertension) Cause: fino al 95% primitive (ipertensione arteriosa essenziale): nessuna causa organica. Nel 5-15% dei casi ipertensione arteriosa secondaria dovuta a malattia di base, ad es. disturbi del sistema ormonale, sistema cardiocircolatorio e danni renali. Possibili danni conseguenti: coronopatia, insufficienza renale, ictus
	Registrazione	Accettare se sotto terapia antipertensiva consolidata e senza sintomi Non accettare finché in fase di chiarimento
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Bradycardia Malattia cardiovascolare

Ipertensione portale	Definizione	Pressione elevata nella vena porta.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID



Ipertermia maligna	Definizione	Miopatia autosomica dominante, subclinica, ereditaria. Disturbo funzionale potenzialmente letale dei muscoli scheletrici, innescato da anestetici inalatori sottoforma di gas e rilassanti muscolari depolarizzanti (ad es. alotano, succinilcolina) impiegati per la narcosi nelle stazioni di terapia intensiva. In caso di dubbio nella famiglia: accertamento del familiare potenzialmente interessato
	Registrazione	<p>Accettare se</p> <p>l'ipertermia maligna è nota nell'anamnesi della famiglia, il donatore è stato sottoposto ad accertamenti e l'ipertermia maligna è negativa (accertamento: biopsia muscolare e test di contrazione muscolare in vitro)</p> <p>Non accettare se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il donatore stesso è interessato • sono interessati familiari di $\leq 4^{\circ}$ grado (parenti più vicini o parimenti apparentati come bisnonni, prozii, cugini, pronipoti) e il donatore non è stato sottoposto ad accertamenti
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione

Ipertireosi	Rinvio	Patologia tiroidea
--------------------	--------	--------------------

Ipoacusia improvvisa	Definizione	Infarto auricolare. Perdita dell'udito improvvisa, perlopiù monolaterale senza fattori scatenanti o cause. Può essere di lieve entità o portare alla sordità. Può essere collegata a un disturbo dell'irrorazione sanguigna dell'orecchio interno.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID



Ipoglicemia	Definizione	Livello estremamente basso della glicemia. Diverse cause possibili.
	Registrazione	La causa deve essere accertata. La decisione dipende dalla malattia di base. Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Diabete mellito
Ipogonadismo	Definizione	Riduzione degli ormoni sessuali causata da una disfunzione delle gonadi (testicoli / ovaie) o una disfunzione centrale (ipofisi / talamo).
	Registrazione	Accettare se: <ul style="list-style-type: none"> • la causa non costituisce un criterio di esclusione • in assenza di osteoporosi • sotto terapia adeguata
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
Ipotensione	Definizione	Pressione sanguigna sistolica < 100 mmHg , diastolica < 50 mmHg
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
Ipotireosi	Rinvio	Patologia tiroidea
Isotretinoin	Rinvio	Medicamenti teratogeni
Isterectomia	Rinvio	Operazione media_3

Itterizia	Rinvio	Ittero
Itterizia, infettiva	Rinvio	Epatite
Ittero	Definizione	<p>Colorazione gialla degli occhi, della pelle e delle mucose come sintomo di un'elevata concentrazione di bilirubina nel corpo. Insorgenza di diverse malattie, tra cui del fegato o della cistifellea.</p> <p>Suddivisione secondo la causa o la localizzazione del disturbo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ittero emolitico (pre-epatico), ad es. ittero neonatale • Ittero epatocellulare (intra-epatico) • Ittero colestatico (post-epatico) <p>Spesso l'ittero viene equiparato all'epatite virale</p>
	Registrazione	Accettare in caso di anamnesi di una causa non infettiva senza attuale sintomatica
	CT / VT	Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	Vedere anche	Epatite
Kala-azar	Rinvio	Leishmaniosi
Klinefelter, sindrome di	Definizione	Anomalia cromosomica in cui un individuo di sesso maschile possiede un cromosoma X soprannumerario (XXY)
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare
	MC	Accettare
Lambiasi	Rinvio	Malattia diarroica



Laminectomia	Definizione	L'asportazione chirurgica parziale o totale della lamina di una o più vertebre ottenendo in tal modo un'apertura del canale vertebrale. Laminectomia decompressiva per decomprimere il midollo spinale in caso di stenosi o trauma. Fenestrazione
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare se: <ul style="list-style-type: none">operazione > 3 mesi fa, trattamento post-operatorio terminato e la donazione è possibile fisicamente
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Ernia discale/ED-operazione Operazione_media_3

Laringite	Definizione	Infiammazione della laringe
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 2 settimane dopo la fine del trattamento antibiotico e fino a guarigione completa Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT

Laser, trattamento oftalmologico	Definizione	Metodo del trattamento di disturbi visivi
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT fino a guarigione completa
	MC	CIT fino a guarigione completa
	Vedere anche	Correzione della vista, operazione di Distacco della retina Operazione_in generale_1



Lattosio, intolleranza al	Definizione	Alterazione della digestione del lattosio a causa di carenza di lattasi o malassorbimento del lattosio. Congenita, primitiva o secondaria.
	Registrazione	Accettare se asintomatica Non accettare in caso di forma secondaria se la malattia di base costituisce una controindicazione
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Allergia alimentare Intossicazione alimentare
Legamento, rottura di	Rinvio	Operazione piccola_2
Legatura delle tube	Rinvio	Operazione media_3
Legionellosi	Definizione	Malattia del legionario. Infezione causata da un batterio chiamato Legionella, l'agente patogeno più frequente (90-95 %) è la Legionella pneumophila. Polmonite potenzialmente letale causata da un'infezione trasmessa tramite flussi d'aerosol e/o d'acqua contaminata. In concomitanza sono possibili ferite infette, endocarditi e pielonefriti.
	Registrazione	Accettare dopo guarigione completa (nessun disturbo respiratorio residuo) e sempre che l'eventuale malattia di base lo consenta
	CT / VT	CIT di 1 mese dopo guarigione completa (nessun disturbo respiratorio residuo) e fine del trattamento e sempre che l'eventuale malattia di base lo consenta
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Pneumonia
Leiomioma dell'utero, rimozione, incl. enucleazione del mioma	Rinvio	Operazione media_3



Leishmaniosi	Definizione	<p>Malattia infettiva che colpisce in tutto il mondo uomini e animali e che è causata da protozoi parassiti intracellulari del <u>genere Leishmania</u>. Gli agenti patogeni sono presenti praticamente in tutti i paesi caldi.</p> <p>Trasmissione soprattutto tramite pappataci, spesso tramite cani infetti (area mediterranea).</p> <p>Forme di Leishmaniosi: viscerale / cutanea / mucocutanea, manifestazione a seconda dell'immunocompetenza dell'organismo infetto. Nella forma viscerale sono colpiti il fegato, la milza e il midollo osseo.</p>
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID

Leptospirosi	Definizione	<p>Infezione batterica da batteri della specie <i>Leptospira</i> (Spirochete). È presente nel suolo e nell'acqua, ma anche come parassiti di animali domestici e selvatici. Portatori soprattutto roditori (topi, ratti) anche suini e bovini (febbre dei porcai). Trasmissione all'uomo tramite contatto con urina, sangue, tessuti degli animali infetti o acqua inquinata (zoonosi soggetta all'obbligo di notifica).</p> <p>Forme: ad es. morbo di Weil, febbre da campo, febbre dei porcai.</p>
	Registrazione	CIT di 2 settimane dopo guarigione completa
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione



Lichen simplex (cronico)	Definizione	Neurodermite circoscritta. Malattia cutanea locale caratterizzata da infiammazione cronica a placche. Decorso con intermittenti esacerbazioni e intenso prurito.
	Registrazione	Accettare se <ul style="list-style-type: none">• la zona interessata dalle placche è piccola• i siti di punzione non presentano lesioni• il trattamento locale è sufficiente Antistaminici contro il prurito sono accettabili
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Eczema
Linfangite	Definizione	Infiammazione dei vasi linfatici della pelle e dell'ipoderma provocata principalmente da batteri o raramente da tossine.
	Registrazione	Accettare se la malattia di base lo consente
	CT / VT	Accettare 1 mese dopo guarigione completa e fine della terapia antibiotica
	MC	Come CT / VT
Linfogranuloma venereo	Definizione	Anche linfopatia venerea, linfogranuloma inguinale. Malattia sessualmente trasmissibile, diffusa nelle zone tropicali. Agente patogeno: sierotipi L1-L3 della Chlamydia trachomatis.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Vedere anche	Malattia sessualmente trasmissibile



Lipedema	Definizione	Disturbo causato da fattori genetici nella distribuzione del grasso che provoca nel corso del tempo un aumento patologico del tessuto adiposo sottocutaneo nelle gambe e nelle braccia. Sintomatica cronica dei disturbi con dolori al tatto e dolori alla pressione, dolori spontanei. Tendenza a formare edemi ed ematomi. Viene classificata in stadi I-III a seconda dell'alterazione della cute. Insorge quasi esclusivamente nelle donne.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione

Lipoma	Definizione	Tumore benigno del tessuto adiposo. Perlopiù localizzato nel tessuto sottocutaneo.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come CT / VT

Lista dei medicinali	Definizione	Allegato Art. 7, Mediliste, Termini di rinvio a causa / a seguito dell'assunzione di medicinali Prescrizioni di Trasfusione CRS Svizzera
-----------------------------	-------------	---

Lista dei paesi	Definizione	Allegato Art. 7, Vaccine Check, Elenco dei paesi con un elevato rischio di infezione virale o parassitaria Prescrizioni di Trasfusione CRS Svizzera
------------------------	-------------	--

Lista delle vaccinazioni	Definizione	Allegato Art. 7, Vaccine Check, Termini di rinvio dopo una vaccinazione Prescrizioni di Trasfusione CRS Svizzera
---------------------------------	-------------	---



Litio, terapia	Definizione	Medicamento per il trattamento di disturbi bipolari, mania, depressione. Medicamento teratogeno.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Vedere anche	Malattia psichiatrica Medicamenti teratogeni
Long Covid (Post Covid Syndrom)	Definizione	Sindrome con diverse manifestazioni, senza che allo stato attuale delle conoscenze si conosca un correlato fisiopatologico uniforme.
	Nota bene	A causa della fisiopatologia poco chiara, si applicano i periodi di rifiuto dei singoli sintomi: vedi pneumonia/ problemi respiratori; mal di testa; bronchite/tosse; depressione; ecc. Attitudine da determinare dal medico
	Vedere anche	Anosmia/ Parosmia / Ageusia Depressione Mal di testa Pneumonia
Lupus eritematoso sistemico (LSE)	Rinvio	Malattia autoimmune
Lyme, malattia di	Rinvio	Borreliosi



Mal di testa	Nota bene	Informarsi sempre sulla durata, la frequenza, le possibili cause o i fattori scatenanti !
	Registrazione	Accettare se solo mal di testa sporadici e il donatore si sente generalmente bene Valutazione dell'idoneità da parte di una medica se il mal di testa ricorre spesso e/o regolarmente
	CT / VT	Come registrazione Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Cefalea a grappolo Emicrania
Malaria, anamnesi positiva	Definizione	Infezione confermata, patogeno: parassita del genere Plasmodium
	Registrazione	Accettare se: <ul style="list-style-type: none"> • malattia > 3 anni fa e senza sintomi della malattia da allora
	CT / VT	Accettare se: <ul style="list-style-type: none"> • malattia > 3 anni fa • donatore ha avuto trattamento ed è asintomatico da allora • eseguire test di malaria (anticorpi & NAT)
	MC	Come CT / VT Ripetere il test al Medical CheckUp, anche se il risultato era negativo al CT
Malaria, profilassi	Rinvio	Malaria, rischio di



Malaria, rischio di	Definizione	Soggiorno in una zona malaria: vedi Allegato Art. 7, Travel-check Tempistiche applicabile: <ul style="list-style-type: none"> In caso di soggiorno corto: entro gli ultimi 12 mesi In caso di soggiorno lungo > 6 mesi consecutivi: nel corso della vita
	Nota bene	In ogni caso il centro di trapianto è informato da SBSC -> la decisione sull'accettabilità del donatore è presa secondo la situazione
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 3 mesi dopo il ritorno di una zona malarica Successivamente accettare senza test di malaria al momento del CT (il test è eseguito durante il MC): <ul style="list-style-type: none"> Soggiorno corto (< 6 mesi) senza febbre / altri sintomi durante o dopo il soggiorno Accettare con test di malaria al momento del CT: <ul style="list-style-type: none"> Soggiorno corto (< 6 mesi) con febbre / altri sintomi durante o dopo il soggiorno Soggiorno lungo (> 6 mesi) con o senza febbre / altri sintomi durante o dopo il soggiorno Anamnesi positiva di malaria--> andare a: Malaria, anamnesi positiva <p>Test di malaria = Sierologia Anti-malarica e NAT!</p>



MC

Sempre domandare se soggiorno in una zona malarica nel corso degli ultimi 12 mesi

In tutti i gruppi a rischio:

- CIT di 4 mesi dopo il ritorno di una zona malarica
- soggiorno confermato in una zona malarica nel corso degli ultimi 12 mesi: richiedere un test di malaria
- In ogni caso: se test fatto al momento del CT, ripeterlo al momento del Medical CheckUp
- Non accettare se test di malaria attuale positivo (NAT e/o anticorpi). In caso di risultati borderline, consultare una specialista.

Test di malaria: Sierologia Anti-malarica e NAT!

Misura eccezionale:

In casi molto urgenti, il centro di trapianto può decidere di abbreviare il CIT di 4 mesi, accettando il rischio:

- CIT di **al minimo 3 settimane** dopo il ritorno, poi fare il test NAT e anticorpi
- **Se test negativo:** Accettare e ripetere la NAT il giorno del prelievo
- Se NAT negativa il giorno del prelievo: Documentare il risultato e informare il centro di trapianto

Nr: 1412	Name: DOK_Donor_Eligibility_Criteria-Blood_Stem_Cell_Donation_I	Version: 10.0	Gültig ab: 14.08.2026
			Seite: 107 von 187



Malattia autoimmune	Definizione	<p>Reazione eccessiva del sistema immunitario contro tessuti del proprio organismo. La reazione può aggravarsi / insorgere con G-CSF.</p> <p>Questo concerne le seguenti patologie, ad.es.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sangue: anemia emolitica autoimmune • malattie reumatiche infiammatorie croniche (ad es. spondilite anchilosante / m. Bechterew, sindrome di Reiter) • malattie intestinali infiammatorie croniche (ad es. m. Crohn, colite ulcerosa, vedere anche celiachia) • pelle e capelli: lichen sclerosus, sclerodermia, pemfigo, alopecia areata, sindrome di Sjögren) • reni: glomerulonefrite • tiroide: vedi tiroidite di Hashimoto / malattie tiroidee • SNC: sindrome di Guillain-Barré, sclerosi multipla, miastenia gravis • Malattie sistemiche: sarcoidosi, lupus eritematoso sistemico (LES)
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Vedere anche	<p>Celiachia</p> <p>Hashimoto, tiroidite di</p> <p>Patologia tiroidea</p>
Malattia cardiaca	Vedere anche	<p>Aritmia</p> <p>Cardiomiopatia</p> <p>Cardiopatìa congenita</p> <p>Endocardite</p> <p>Insufficienza cardiaca</p> <p>Pericardite / Versamento pericardico</p> <p>Valvulopatia</p>



Malattia cardiovascolare	Definizione	Malattie a carico dei vasi sanguigni e/o del cuore. Vi fanno parte: <ul style="list-style-type: none"> • coronaropatia / Angina pectoris • infarto (trombosi coronarica) • arteriopatia obliterante periferica / Claudicatio intermittens • aneurisma, ad es. aneurisma aortico • stato post impianto di stent / operazione di by-pass
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Vedere anche	Ipertensione arteriosa
Malattia cerebrovascolare	Definizione	Gruppo di malattie che colpiscono i vasi sanguigni del cervello, ossia le arterie cerebrali o le vene cerebrali, e che comprendono: <ul style="list-style-type: none"> • angiodisplasia • emorragia cerebrale • vasculopatia cerebrale • ictus / stroke / colpo apoplettico • attacco ischemico transitorio (TIA) • trombosi della vena retinica centrale
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Vedere anche	Emorragia cerebrale dovuta a incidente
Malattia del sonno	Vedere anche	Encefalite Narcolessia Tripanosomiasi africana
Malattia di Owren	Rinvio	Deficit del fattore V, congenito



Malattia di Raynaud	Definizione	Sindrome di Raynaud. Fenomeno di Raynaud. Riduzione del flusso di sangue delle dita delle mani e dei piedi a causa di vasocostrizioni (dita bianche). Manifestazione primitiva / idiopatica (senza causa riconoscibile), secondaria in relazione con una malattia autoimmune (ad es. malattia da agglutinine fredde, lupus eritematoso, sclerodermia, ecc.), malattie vascolari, trauma, medicinali. Fattori scatenanti endogeni (ormoni) o esogeni (freddo, stress).
	Registrazione	Accettare tranne se in relazione con una malattia autoimmune sistemica Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
Malattia di Refsum	Definizione	Detta anche Malattia di Refsum classica, Heredopathia atactica polyneuritiformis. Fa parte delle neuropatie ereditarie motrici e sensitive. Malattia del metabolismo a carattere autosomico recessivo, con sovraccumulo di acido fitanico nei tessuti. Manifestazioni caratteristiche: retinite pigmentosa con emeralopia (cecità notturna), polineuropatia periferica, atassia cerebellare, deficit uditivo.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Vedere anche	Retinite pigmentosa



Malattia diarroica	Definizione	Possibili agenti patogeni: Batteri: ad es. E.coli enterotossico, Vibrio cholerae (colera), Salmonella enteritidis (salmonellosi), Yersinia enterocolitica, Shigella, Campylobacter, Clostridium difficile, Salmonella typhi (tifo, paratifo) Virus: rotavirus, norovirus Parassiti intestinali: vermi o protozoi, Giardia lamblia (lambliasi)
	Nota bene	Informarsi sulla frequenza e sulla durata, accertare la causa
	Registrazione	Accettare se non sussistono cause autoimmuni o infiammatorie croniche
	CT / VT	CI fino a guarigione completa e 2 settimane dopo la sospensione di eventuali antibiotici CIT di 3 mesi dopo guarigione completa in caso di colera CIT di 6 mesi dopo guarigione completa in caso di Shigellosi, Yersiniosi
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Allergia alimentare Tifo/Paratifo
Malattia diarroica, contatto	Definizione	Contatto con una persona affetta da malattia diarroica infettiva
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 2 settimane dopo il contatto in caso di altre malattie diarroiche CIT di 2 mesi in caso di contatto con persone affette da tifo / paratifo CIT di 3 mesi in caso di contatto con persone affette da infezioni da vermi e protozoi (amebe, Giardia lamblia, Cryptosporidium, microsporidi, ecc.)
	MC	Come CT / VT
Malattia diarroica, infiammatoria cronica	Rinvio	Malattia autoimmune



Malattia ematica auto-immune	Rinvio	Malattia autoimmune
Malattia ematica maligna	Definizione	Tra cui tutte le leucemie, linfoma di Hodgkin e linfoma non Hodgkin, neoplasie mieloproliferative.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Malattia ematica non maligna	Vedere anche	Anemia Diatesi emorragica, disturbi congeniti Diatesi emorragica, disturbi acquisiti Trombofilia
	Definizione	Malattie infettive con un elevato tasso di diffusione e una capacità di trasmissione, che tipicamente lasciano immuni per tutta la vita e insorgono prevalentemente nei bambini.
	Vedere anche	Eritema infettivo Herpes zoster Morbilli Orecchioni Poliomielite Rosolia
	Malattia infettiva	Nota bene
	Registrazione	Non accettare se infezione cronica
	CT / VT	CI se infezione acuta, durata a seconda dell'infezione e stato di guarigione del donatore Generalmente CIT di 2 settimane dopo la fine del trattamento antibiotico e fino a guarigione completa Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT



Malattia infettiva, contatto	Definizione	Contatto diretto con una persona malata senza essere malati se stessi.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare o CI a seconda della malattia di base Accettare, se esisite immunità (malattia già passata, donatore vaccinato) Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Accettare, se esisite immunità (malattia già passata, donatore vaccinato) CIT di 1 mese dopo l'ultimo contatto a seconda della malattia d base Valutazione dell'idoneità da parte di una medica

Malattia mani-piedi-bocca	Definizione	Infezione virale altamente contagiosa. Diffusa in tutto il mondo, colpisce soprattutto i bambini, può anche colpire gli adulti. Agenti patogeni soprattutto Enterovirus, tra cui Coxsackie virus, Enterovirus umani. Trasmissione tramite contatto diretto con liquidi corporei (saliva, goccioline, secreto di vesciche) od oro-fecale. Indirettamente tramite superfici contaminate. Immunità soltanto contro l'agente patogeno scatenante.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT fino a guarigione completa
	MC	Come CT / VT

Malattia otorinolaringoiatrica	Definizione	Malattie / disfunzioni nelle zone di tutte le strutture e organi della testa e della gola, ad eccezione del cervello e degli occhi. Si tratta spesso di malattie infiammatorie / infettive.
	Vedere anche	Faringite Laringite Mastoidite Otite media acuta Otite media cronica Tonsillite acuta Tonsillite cronica / recidivante



Malattia psichiatrica

Vedere anche

Borderline
Depressione
Disturbo affettivo bipolare
Disturbo del comportamento alimentare
Litio, terapia
Neurosi
Psicosi
Schizofrenia

Malattia sessualmente trasmissibile

Vedere anche

Clamidiosi
Comportamento a rischio, sessuale
Epatite B, acuta
Epatite B, cronica
Epatite C
Gonorrea
Herpes genitale
HIV, infezione
HTLV I/II, infezione
Linfogranuloma venereo
Papilloma Virus Umano o HPV
Sifilide
Ulcera venerea
Verruche genitali



Malattia vascolare arteriosa	Definizione	Malattia perlopiù ostruttiva in cui i vasi sanguigni vengono bloccate da placche sulle pareti (aterosclerosi) e / o processi infiammatori con conseguente approvvigionamento minore o interrotto di ossigeno agli organi o ai tessuti a valle. Tra cui: <ul style="list-style-type: none">• arteriopatia obliterante periferica• occlusione vascolare acuta• aneurisma arterioso• vasculite• tromboangioite obliterante• arteriosclerosi• malattia coronarica
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Vedere anche	Malattia cardiovascolare Malattia cerebrovascolare

Malattia vascolare venosa	Definizione	Varicosi o trombosi
	Vedere anche	Emorroidi Flebotrombosi Insufficienza venosa cronica (IVC) Ipertensione portale Tromboflebite / Flebite Trombosi del seno venoso Varici, gambe



Malattie infantili, contatto	Definizione	Contatto diretto con una persona affetta da una malattia infantile.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare
	MC	Accettare se immunità presente (malattia fatta / vaccinata) CIT di 1 mese dopo l'ultimo contatto, a seconda della malattia di base Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
Marfan, sindrome di	Definizione	Patologia autosomica dominante ereditaria che colpisce il tessuto connettivo. Sono interessati soprattutto il sistema scheletrico e cardiovascolare, gli occhi, di espressione variabile. Caratteristiche ad es.: scheletro: struttura corporea lunga e magra (eccessiva altezza) con evidenti estremità e dita lunghe (aracnodattilia). Cardiaco: tra cui dilatazione della radice aortica, prollasso valvolare mitralico, insufficienza valvolare. Occhi: lussazione del cristallino, miopia.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Marker di malattie infettive positivi, non specifici	Nota bene	Procedere in conformità alle Policies SBSC e prescrizioni di STS, descritti in - POL_003, Pt. 3.1 e 4.1 - Chapitre 11A_Qualification biologique du don: marqueurs infectieux
	CT / VT	Accettare, se un test di screening è positivo e il test di conferma è negativo. Registrare il risultato come negativo, documentando come annotazione il test di screening positivo. Se necessario, test NAT supplementare
	MC	Come CT / VT



Mastocitosi	Definizione	Sovrapproduzione, probabilmente da causa genetica, di mastociti nel corpo. Si divide in mastocitosi cutanea (aumento del numero di mastociti nei tessuti) e nella mastocitosi sistemica (aumento del numero di mastociti negli organi e nel midollo osseo). Mastociti atipiche con regolazione disturbata dell'attivazione dei mastociti Stadi della mastocitosi sistemica: indolente → aggressiva → leucemia mastocitaria.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione

Mastoidectomia	Rinvio	Operazione media_3
-----------------------	--------	--------------------

Mastoidite	Definizione	Infiammazione della prominenza dell'osso temporale posta dietro l'orecchio. La mastoidite è una complicazione dell'otite media acuta.
	Registrazione	Accettare dopo guarigione completa e fine del trattamento
	CT / VT	CIT di 2 mesi dopo guarigione completa e fine del trattamento
	MC	Come CT / VT

Medicamenti	Rinvio	Trattamento medicamentoso
--------------------	--------	---------------------------



Medicamenti teratogeni	Definizione	Medicamenti che possono provocare malformazioni nell'embrione. Oggi piuttosto detti «tossici per la riproduzione» – ossia quei medicinali: a) con effetti sul metabolismo ormonale maschile / fertilità e con emivita (rel.) breve b) che possono compromettere la fertilità e danneggiare il feto (effetto teratogeno)
	Nota bene	Informazione al centro di trapianto dell'assunzione
	Registrazione	Accettare se il medicamento può essere interrotto nell'ambito della donazione secondo i termini di CIT.
	CT / VT	I termini di CIT si basano sul grado di tossicità per la riproduzione e sull'emivita dei medicinali. Emivita = tempo nel quale la concentrazione di un medicamento nel sangue scende alla metà del suo valore iniziale (50%). Termini di CIT: a) medicinali con effetti sul metabolismo ormonale maschile / fertilità ed emivita (rel.) breve: <ul style="list-style-type: none">• Nessun CIT: Alocapil®, Finacapil®, Finasterax®, Andropecia Biorga®, Propecia® oder Proscar® (principio attivo: finasteride)• 6 mesi: Avodart®, Duodart® (principio attivo: dutasteride) b) medicinali con grave tossicità per la riproduzione: <ul style="list-style-type: none">• 1 anno: Acicutan®, Neotigason (principio attivo: acitretina)• 2 anni: Erivedge® (principio attivo: vismodegib) Un'eventuale riduzione dei termini di CIT per i suddetti medicinali deve essere determinata nel caso concreto dal medico. In caso di assunzione di altri medicinali teratogeni, attitudine da determinare dal medico



MC

Termini di CIT:

a) medicinali con effetti sul metabolismo ormonale maschile / fertilità ed emivita (rel.) breve:

- 1 mese: Alocapil®, Finacapil®, Finasterax®, Andropecia Biorga®, Propecia® oder Proscar® (principio attivo: finasteride)
- 6 mesi: Avodart®, Duodart® (principio attivo: dutasteride)

b) medicinali con grave tossicità per la riproduzione:

- 1 anno: Acicutan®, Neotigason (principio attivo: acitretina)
- 2 anni: Erivedge® (principio attivo: vismodegib)

Un'eventuale riduzione dei termini di CIT per i suddetti medicinali deve essere determinata nel caso concreto dal medico

In caso dell'assunzione di altri medicinali teratogeni, l'attitudine da determinare dal medico

Medicina naturopatica	Definizione	Medicina alternativa, ad es. omeopatia, agopuntura, medicina tradizionale cinese, ecc.
	Nota bene	Trattamento con rimedi naturali non è di per sé motivo di esclusione, ma è necessario osservare la malattia di base e il tipo di somministrazione (iv, sc, extracorporeo).
	Registrazione	Accettare se il motivo del trattamento lo consente
	CT / VT	Informarsi sul principio attivo, ev. sospendere il trattamento fino al prelievo Rispettare gli eventuali termini di rinvio (ad es. agopuntura)
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Agopuntura Puntura accidentale d'ago



Menière, malattia di	Definizione	Sindrome di Menière. Malattia dell'orecchio interno che provoca attacchi di vertigini, riduzione dell'udito e tinnito (acufeni). Classica triade.
	Registrazione	Accettare a seconda della gravità dei sintomi e la frequenza degli attacchi. I disturbi potrebbero aggravarsi con la donazione Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione

Meningite	Definizione	Infiammazione delle membrane che ricoprono l'encefalo e il midollo spinale, causata da virus, batteri, altri organismi o anche da cause non infettive. Può anche essere un fenomeno concomitante di un malattia generale infettiva. Sempre emergenza medica , la meningite batterica è in linea di massima potenzialmente letale. Agenti patogeni più frequenti: meningococchi, pneumococchi, Haemophilus influenzae
	Nota bene	Informarsi se il donatore ha sofferto di convulsioni durante l'episodio (epilessia)
	Registrazione	CIT di 3 mesi dopo guarigione completa senza sequele
	CT / VT	CIT di 6 mesi dopo guarigione completa senza sequele
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Encefalite Epilessia Meningoencefalite verno-estiva (MEVE)

Meningoencefalite	Rinvio	Encefalite
--------------------------	--------	------------



Meningoencefalite verno-estiva (MEVE)	Definizione	Malattia indotta dal Tick-Borne Encephalitis Virus (TBEV), meningoencefalite da zecche. Presenta sintomi simili all'influenza e in una parte dei pazienti una meningoencefalite, tuttavia nella gran parte dei pazienti con decorso asintomatico. Trasmissione dalle zecche.
	Registrazione	Accettare dopo guarigione completa senza residui neurologici
	CT / VT	CIT di 3 mesi dopo guarigione completa senza residui neurologici
	MC	Come CT / VT
Menisco, operazione del	Rinvio	Operazione media_3
Micosi	Definizione	Malattia infettiva causata da funghi. Funghi più ricorrenti: <ul style="list-style-type: none"> • dermatofiti: ifomiceti • lieviti (blastomiceti): ad es. Candida • muffe (ifomiceti): ad es. Aspergillus Suddivise in: <ul style="list-style-type: none"> • micosi superficiali: pelle, unghie, mucosa • micosi sistemiche: l'agente patogeno penetra nella circolazione sanguigna (perlopiù attraverso i polmoni) e colpisce gli organi interni -> normalmente solo nei pazienti con sistema immunitario indebolito, malattie gravi difficili da controllare. Possono avere decorso letale.
	Registrazione	Accettare tranne micosi di organi / micosi sistemica
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
Minkowski-Chauffard, malattia di-	Rinvio	Sferocitosi ereditaria



Mixedema	Definizione	Edema del sottocute dovuto ad accumulo di glicosamminoglicani, tipico dell' <u>ipotiroidismo</u> e di alcune forme di <u>ipertiroidismo</u> (mixedema pretibiale del <u>morbo di Graves-Basedow</u>).
	Registrazione	Accettare se la malattia di base non costituisce un criterio di esclusione
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Patologia tiroidea
Mononucleosi infettiva	Definizione	Infezione dal virus di Epstein-Barr. Molto frequente nella popolazione. Decorso spesso asintomatico. Trasmissione tramite saliva. Il virus infetta i linfociti B e rimane nel corpo per tutta la vita. Possibile riattivazione in caso di sistema immunitario indebolito (pazienti immunodepressi!) Altrimenti rare complicazioni.
	Registrazione	CIT di 6 mesi dopo guarigione completa
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
Morbillo	Definizione	Malattia infettiva altamente contagiosa che colpisce soprattutto i bambini. Virus a RNA della famiglia Paramyxoviridae. Possibili complicazioni potenzialmente letali come polmoniti ed encefaliti cerebrali.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 1 mese dopo guarigione completa
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Malattie infantili, contatto
Morbo celiaco	Rinvio	Celiachia



Morso di zecca	Definizione	Può trasmettere diverse malattie di zecche (ad es. borreliosi, meningoccefalite da zecca, babesiosi).
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare se: <ul style="list-style-type: none"> • evento occorso almeno 1 mese prima o in seguito a profilassi secondaria per borreliosi • nessun sintomo
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Babesiosi Borreliosi Meningoccefalite verno-estiva (MEVE)
Mucoviscidiosi	Definizione	Malattia ereditaria del metabolismo in cui le ghiandole esocrine producono muco viscoso, causando così complicazioni talvolta gravi
	Registrazione	Non accettare tranne se soltanto portatore
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
Mucoviscidiosi, stato di portatore	Definizione	Portatore di mucoviscidiosi
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
Narcolessia	Definizione	Ipersonnia dovuta a un disturbo centrale della regolazione sonno-veglia che insorge come forma cataplettica (classica) o non cataplettica (monosintomatica).
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione



Narcosi	Vedere anche	Operazione grande_4 Operazione media_3 Operazione piccola_2
Necrolisi epidermica tossica (TEN)	Rinvio	Sindrome di Lyell
Nefrectomia	Definizione	Asportazione del rene o di parte di esso. Accertare la causa e la funzione renale rimanente.
	Registrazione	Accettare se: <ul style="list-style-type: none"> • post trauma • post asportazione parziale per causa benigna (ad es. tumore incapsulato benigno) • post donazione di rene Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Operazione grande_4 Operazione media_3
Nefrite	Definizione	Malattia renale infiammatoria, acuta o cronica. Cause: infezioni, tossine, malattie autoimmuni, conseguenza di una malattia sistemica (come diabete, lupus eritematoso sistemico). Accertare la causa!
	Vedere anche	Glomerulonefrite Nefrite interstiziale Pielonefrite



Nefrite interstiziale	Definizione	Patologia renale infiammatoria che provoca la perdita funzionale dell'organo e nella maggior parte dei casi è legata a medicinali, infezioni o malattie sistemiche.
	Registrazione	Accettare <ul style="list-style-type: none"> • 6 mesi dopo guarigione completa • funzione renale normale
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
Nefropatia acuta	Vedere anche	Calcoli renali Colica renale Glomerulonefrite Insufficienza renale acuta / cronica Nefrite Pielonefrite
Nefropatia cronica	Definizione	Tra cui: <ul style="list-style-type: none"> • glomerulonefrite • nefrite • insufficienza renale • calcoli renali • cancro renale • tumore renale benigno • displasia fibromuscolare del rene
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
Nematodi	Rinvio	Elmintiasi



Neoplasia della cervice uterina	Definizione	Tumore del collo dell'utero
	Vedere anche	Cancro Carcinoma in situ della cervice uterina
Neotigason	Rinvio	Medicamenti teratogeni
Neurinoma acustico	Definizione	Tumore benigno originato da cellule della guaina dell'ottavo nervo cranico (nervo vestibolococleare, nervo stato-acustico) (cellule di Schwann), sinonimo: schwannoma vestibolare
	Registrazione	Accettare se completamente rimosso con chirurgia o radioterapia senza residui rilevanti
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Neurofibromatosi (NF)
Neurodermite	Definizione	Malattia cutanea cronica, non contagiosa, che si manifesta sempre più nell'infanzia e che spesso si risolve nella pubertà.
	Registrazione	Accettare, tranne se la sintomatica cronica persiste marcatamente nell'età adulta
	CT / VT	Come registrazione e fintanto che i siti di punzione non sono interessati
	MC	Come CT / VT
Neurofibromatosi (NF)	Definizione	Malattia ereditaria, che può causare tra l'altro neurofibromi ed è legata a ereditarietà autosomica-dominante. Tipo 1 (malattia di von Recklinghausen): NF periferica Tipo 2: NF centrale
	Registrazione	Non accettare se segni di NF centrale e/o degenerazione maligna Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione



Neurosi	Definizione	Termine anziano che indica lievi disturbi psichici scaturiti da un conflitto.
	Registrazione	Accettare se senza terapia medicamentosa, altrimenti stabilire la diagnosi precisa ed agire di conseguenza
	CT / VT	Come registrazione Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Borderline Depressione Litio, terapia Psicosi Schizofrenia
Nevralgia del trigemino	Definizione	Intenso dolore al volto a livello del nervo trigemino, perlopiù unilaterale, che insorge improvvisamente e di breve durata. Idiopatico o sintomatico ad es. come conseguenza di un processo infiammatorio o di un tumore.
	Registrazione	Accettare, se episodio unico e isolato
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
Norovirus	Rinvio	Malattia diarroica
Omosessualità	Definizione	Omosessualità per se non richiede un CIT o CID. vedi 1415_DOK_Classification_Risk_Behaviour_I
	Vedere anche	Comportamento a rischio, sessuale
Operazione della cartilagine	Rinvio	Operazione media_3
Operazione dentale	Rinvio	Operazione media_3



Operazione grande_4	Definizione	Durata indicativa dell'operazione: > 60 min <ul style="list-style-type: none"> • operazioni di emergenza post politrauma • qualsiasi apertura craniale • operazioni toraciche aperte • operazioni addominali aperte, incl. cesareo • operazione della colonna vertebrale, tranne operazione dell'ernia discale lombare • sostituzione parziale del bacino, incl. resezione parziale dell'osso sacro • operazione del femore, incl. endoprotesi dell'anca • sostituzione di endoprotesi
	Registrazione	Accettare 1 anno dopo l'operazione, se: <ul style="list-style-type: none"> • la malattia di base non costituisce un criterio di esclusione • decorso senza complicazioni • trattamento terminato Altrimenti attitudine da determinare dal medico
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Creutzfeldt-Jakob, malattia di, rischio 3_Operazione al cervello o midollo spinale



Operazione media_3	Definizione	Durata indicativa dell'operazione: 15-60 min. Esempi: <ul style="list-style-type: none"> • qualsiasi operazione ossea del cranio senza apertura craniale, incl. correzione della deviazione del setto nasale • interventi laparo / artroscopici • amputazioni di dita delle mani e del piede • operazione di ernia discale lombare • intervento di ernia inguinale • operazione ortopedica di grandi ossa lunghe, tranne femore (tibia, omero, radio, ulna), incl. endoprotesi del ginocchio e rimozione di materiale • grande sbrigliamento di ferita • operazione delle varici >1 varice
	Registrazione	Accettare 3-6 mesi dopo l'operazione, se: <ul style="list-style-type: none"> • la malattia di base non costituisce un criterio di esclusione • decorso senza complicazioni • trattamento terminato Altrimenti attitudine da determinare dal medico
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione



Operazione piccola_2	Definizione	<ul style="list-style-type: none"> Durata indicativa dell'operazione: <15 min. <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> piccolo intervento dermatologico e oftalmologico, incl. operazione alla cataratta punzioni diagnostiche / terapeutiche, ad es. artroscopia piccola operazione delle varici (1 varice)
	Registrazione	<p>Accettare 1 mese dopo l'operazione se:</p> <ul style="list-style-type: none"> la malattia di base non costituisce un criterio di esclusione decorso senza complicazioni trattamento terminato <p>Altrimenti attitudine da determinare dal medico</p>
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione

Operazione_in generale_1	Definizione	<p>Accertare sempre la malattia di base.</p> <ul style="list-style-type: none"> Esclusione sempre in caso di malattia di base maligna tranne se basalioma e neoplasia della cervice uterina Il termine di rinvio si basa sulla portata dell'intervento In generale attitudine e periodo di sospensione da determinare dal medico, i termini di attesa per operazioni sono indicativi
	Vedere anche	<p>Operazione grande_4</p> <p>Operazione media_3</p> <p>Operazione piccola_2</p>



Orecchioni	Definizione	Parotite epidemica. Malattia infettiva acuta con infiammazione delle ghiandole salivari (parotidi) e altri organi. Classica malattia infantile, di regola immunità per tutta la vita. Complicazioni frequenti: meningite e orchite
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 1 mese dopo guarigione completa
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Malattie infantili, contatto

Ormone della crescita	Definizione	Usato come medicamento in caso di insufficiente produzione da parte dell'ipofisi.
	Vedere anche	Creutzfeldt-Jakob, malattia di, rischio 5_Trattamento con ormoni della crescita prima del 1.1.1986

Orticaria	Definizione	Formazione di ponfi con diverse cause (ad es. allergia, freddo, raggi UV).
	Registrazione	Accettare se <ul style="list-style-type: none">• fattore scatenante noto e non costituisce un criterio d'esclusione• evento unico, anche se fattore scatenante non noto Tener conto della frequenza e dell'intensità !
	CT / VT	Come registrazione Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Allergia



Orticaria fittizia	Definizione	Urticaria fisica il cui fattore scatenante può essere uno sfregamento o una pressione fisica sulla pelle.
	Registrazione	Non accettare, se la «pressione fisica sulla pelle» è il fattore scatenante
	CT / VT	Come registrazione Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT
Orzaiolo	Definizione	Infiammazione /ascesso acuto, purulento della rima palpebrale (infiammazione delle ghiandole sebacee o delle ghiandole sudoripare apocrine). Si risolve normalmente senza trattamento specifico.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CI fino a quando l'infezione non è diminuita
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Blefarite
Osteomielite / Osteite	Definizione	Infiammazione acuta o cronica dell'osso / del midollo osseo causata da infezione.
	Registrazione	CIT di 2 anni dopo guarigione e fine della terapia antibiotica (se evento unico e senza recidiva) Accertare la causa! Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
Osteoporosi	Definizione	Perdita di densità ossea in seguito a uno squilibrio tra aumento e riduzione del tessuto osseo in cui è preponderante la perdita ossea.
	Registrazione	Non accettare in caso di diagnosi esplicita di osteoporosi
	CT / VT	Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT



Otite media acuta	Definizione	Forma di infiammazione dell'orecchio medio che si manifesta improvvisamente e dovuta a infezione.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT fino a guarigione completa
	MC	Come CT / VT
Otite media cronica	Definizione	Malattia cronica dell'orecchio medio che si manifesta con infiammazioni purulente della mucosa o dell'osso.
	Registrazione	Non accettare tranne dopo intervento chirurgico riuscito e fine della terapia antibiotica
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Operazione media_3
Otosclerosi	Definizione	Alterazione delle strutture ossee nella zona dell'orecchio medio e interno con deficit uditivo progressivo. Cause in discussione: infezioni virali, reazioni autoimmuni, fattori ereditari e influenze ormonali.
	Registrazione	Accettare in caso di otosclerosi asintomatica od oligosintomatica Non accettare in caso di malattia progressiva
	CT / VT	Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
Pacemaker	Definizione	Stimolatore cardiaco
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Pancreas, pseudocisti	Rinvio	Pancreatite cronica



Pancreatite acuta	Definizione	Infiammazione acuta del pancreas provocata nel 60-70% dei casi da un ingorgo biliare, generalmente dovuto a malattie del dotto biliare, nel 30% da un abuso di alcol.
	Registrazione	Accettare se causa <ul style="list-style-type: none">• biliare• virale (Orecchioni)• traumatica• iatrogena altrimenti CID
	CT / VT	Come registrazione e CIT fino a 3 mesi dopo guarigione completa
	MC	Come CT / VT

Pancreatite cronica	Definizione	Infiammazione persistente del pancreas con perdita duratura della funzione esocrina e con il tempo anche della funzione endocrina. Insufficienza pancreatica. Pseudocisti. Causa: > 70% dovuto al abuso di alcol, anche ipercalcemia od ostruzione dei dotti biliari.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID



Papilloma Virus Umano o HPV	Definizione	Virus a DNA, che infetta la pelle e le mucose tramite contatto diretto (sessuale, orale e cutaneo). Può provocare tumori benigni come il condiloma genitale (contaminazione sessuale) o le verruche cutanee (contaminazione cutanea). Il virus è estremamente diffuso, l'infezione è asintomatica nella maggior parte dei casi. Certi genotipi sono associati a modificazioni cancerose, in particolare al carcinoma della cervice uterina. Il virus può rimanere inattivo dopo l'infezione, e si manifesta solo alcuni mesi più tardi. Vaccinazione preventiva possibile.
	Registrazione	Accettare in assenza di altre malattie sessualmente trasmissibili all'anamnesi
	CT / VT	Come registrazione e informazione al centro di trapianto se sintomatico
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Comportamento a rischio, sessuale

Paraemofilia	Rinvio	Deficit del fattore V, congenito
---------------------	--------	----------------------------------

Paralisi centrale del nervo facciale	Definizione	Paralisi nel passaggio del nervo facciale causata da un danneggiamento del nervo nel suo decorso centrale (fascio cortico-nucleare).
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID

Paralisi periferica del nervo facciale	Definizione	Paralisi nel passaggio del nervo facciale causata da un danneggiamento del nervo nel suo decorso periferico.
	Registrazione	CIT di 3 mesi dopo l'inizio dei sintomi, in seguito accettare se i sintomi regrediscono palesemente
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Herpes zoster



Paraplegia / Tetraplegia	Definizione	Paralisi risultante dal danneggiamento della sezione del midollo spinale con perdita delle funzioni motorie, sensitive o vegetative.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Parkinson, sindrome di	Definizione	Anche morbo di Parkinson. Malattia neurodegenerativa a lenta progressione che presenta sintomi motori e cognitivi.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Patologia tiroidea	Definizione	Malattia della tiroide con o senza disfunzione ormonale (iper-/ ipotireosi)
	Registrazione	Accettare se i valori degli ormoni tiroidei sono normali (euti-reosi) con o senza terapia sostitutiva, tranne: <ul style="list-style-type: none"> • in caso di patologia tiroidea in accertamento • neoplasie maligne (carcinoma della tiroide) • malattie di Basedow = m. di Graves Accettare se eziologia sconosciuta e al momento nessun segno di malattia autoimmune (anche in caso di stato post tiroidectomia)
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Hashimoto, tiroidite di



Pelle, cancro della	Definizione	Alterazione maligna della pelle. Ad es. melanoma maligno, micosi fungoide, fibrosarcoma, angiosarcoma
	Registrazione	Non accettare. Eccezione: basalioma
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Vedere anche	Basalioma
Pemfigo	Rinvio	Malattia autoimmune
Perdita di coscienza	Definizione	Diverse cause, ad.es.collasso circolatorio.
	Nota bene	Comprendere / accertare sempre la causa di uno svenimento.
	Registrazione	Non accettare se: <ul style="list-style-type: none">• la persona è propensa a svenimenti• la malattia di base non permette la registrazione• la causa non è nota Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Epilessia Ferita alla testa, grave Ipoglicemia Ipotensione Malattia cardiaca Malattia cardiovascolare



Pericardite / Versamento pericardico	Definizione	<p>Infiammazione del pericardio. Si suddivide in acuta / cronica, Forma speciale: pericardite costrittiva.</p> <p>Cause: infezioni (batteriche, virali, micotiche, parassitarie), nell' ambito di malattie sistemiche (come malattie autoimmuni, collagenosi, sarcoidosi, malattie endocrinologiche), paraneoplastiche, post-traumatiche, idiopatiche.</p>
	Registrazione	Non accettare, tranne nello stato post trauma o malattia virale e recupero completo senza terapia.
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
Peritonite	Definizione	<p>Infiammazione della membrana sierosa (peritoneo). Locale / diffusa. Malattia raramente autonoma, perlopiù sintomo cardinale. Cause possibili:</p> <p>Locale: il più spesso nel caso di appendicite acuta perforata, colecistite</p> <p>Diffusa: tra cui a causa di diverticolite, ostruzione intestinale, infarto mesenterico, lesione intestinale perforante, salpingite, carcinosi peritoneale</p>
	Registrazione	Accettare dopo guarigione completa sempre che la malattia di base consenta una donazione
	CT / VT	<p>CIT fino a guarigione completa e 4 settimane dopo il completamento del trattamento, se la malattia sottostante permette la donazione</p> <p>CID in caso di processo maligno</p>
	MC	Come CT / VT
Peritonsillite	Rinvio	Tonsillite acuta
Personale ospedaliero	Rinvio	Attività a rischio



Perthes, morbo di	Definizione	Necrosi ossea idiopatica asettica a carico della testa del femore che insorge nell' infanzia.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	Accettare, purché non sussistano disturbi o limitazioni nella vita quotidiana Solo donazione di PBSC Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT
Pertosse	Definizione	Tosse canina. Infezione causata dal batterio Bordetella pertussis. Altamente contagiosa. Piuttosto conosciuta come malattia infantile, però colpisce anche gli adulti.
	Registrazione	CIT di 1 mese dopo guarigione completa
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
Pertosse, contatto	Rinvio	Malattie infantili, contatto
Peso corporeo	Registrazione	Non accettare se peso < 50 Kg oppure BMI ≥ 40
	CT / VT	CID : se BMI ≥ 40 Non accettare se peso < 50 Kg
	MC	Come CT / VT
Piccolo male	Rinvio	Epilessia
Pielonefrite	Definizione	Infiammazione perlopiù monolaterale della pelvi renale con coinvolgimento del parenchima renale causata in gran parte da un'infezione batterica.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CI di 4 settimane dopo guarigione completa e fine della terapia antibiotica
	MC	Come CT / VT



Pitiriasi rosea di Gilbert	Definizione	Esantema transitorio non contagioso.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare se guarita completamente
	MC	Come CT / VT

Pitiriasi versicolor	Definizione	Infezione cutanea superficiale causata da funghi, molto comune.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare se il sito di punzione non è affetto
	MC	Come CT / VT

Pleurite	Definizione	Inflammatione della pleura (viscerale / parietale) con dolori toracici legati alla respirazione tipicamente forti. Perlopiù conseguenza di una polmonite primitiva o secondaria (inflammata localmente, ischemica, infettiva, maligna, autoimmune).
	Registrazione	Accettare se la malattia di base lo consente CIT di 4 settimane dopo guarigione completa e fine del trattamento (più a lungo in caso di una tubercolosi pleurica) Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione

Pneumonia	Definizione	Polmonite
	Registrazione	Accettare dopo guarigione completa (nessun disturbo respiratorio residuo) e se la malattia di base lo consente
	CT / VT	CI fino a 4 settimane dopo guarigione completa (nessun disturbo respiratorio residuo) e trattamento terminato e sempre che la malattia di base lo consenta
	MC	Come CT / VT



Pneumotorace	Definizione	Insorgenza spesso acuta di aria nel cavo pleurico -> Impedimento della distensione del lobo polmonare -> Collasso parziale o totale del lobo polmonare interessato. Può avere esito letale. <ul style="list-style-type: none"> • Pneumotorace spontaneo: causa sconosciuta (colpisce spesso gli uomini giovani e magri) • Pneumotorace traumatico: ferita diretta o indiretta del torace e dei suoi organi
	Registrazione	Accettare se pneumotorace spontaneo o traumatico dopo la fine del trattamento e guarigione completa
	CT / VT	Come registrazione Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Operazione media_3 Operazione piccola_2

Poliartrite	Rinvio	Artrite non infettiva
--------------------	--------	-----------------------

Policitemia vera	Definizione	Malattia rara mieloproliferativa con moltiplicazione di tutti e tre i componenti del sangue causata da una mutazione di una cellula staminale mieloide.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Vedere anche	Malattia ematica maligna



Poliomielite	Definizione	Malattia infettiva causata dal poliovirus, che colpisce il motoneurone e provoca paralisi permanenti, ma nel >90% ha un decorso asintomatico. Il coinvolgimento dei muscoli respiratori è letale.
	Registrazione	Accettare se completamente senza sintomi
	CT / VT	Come registrazione Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Disabilità fisica

Polipectomia intestinale	Definizione	Rimozione endoscopica di polipi dall'intestino crasso.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 1 mese dopo l'intervento o più a lungo a seconda del grado di gravità e di eventuali complicazioni Valutazione dell'idoneità da parte di una medica a seconda dell'esito istologico
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Endoscopia Operazione media_3 Operazione piccola_2 Poliposi familiare

Poliposi familiare	Definizione	Poliposi adenomatosa familiare (FAP). Malattia ereditaria autosomica dominante che presenta la formazione di polipi adenomatosi multipli nell'intestino crasso. Rischio di degenerazione del 70-100%
	Registrazione	Non accettare in caso di diagnosi confermata
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Vedere anche	Polipectomia intestinale



Poliposi intestinale	Definizione	Ammassi di polipi che si formano nella mucosa intestinale. Nel 95% dei casi si tratta di tumori benigni della mucosa, possibile degenerazione maligna.
	Registrazione	Accettare se nessuna forma familiare (ad es. poliposi giovanile), altrimenti CID
	CT / VT	Come registrazione e CIT in caso di sintomi
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Endoscopia Poliposi familiare

Politrauma	Definizione	Più lesioni subite contemporaneamente in diverse regioni del corpo, in cui una ferita o una combinazione di più ferite possono essere potenzialmente letali.
	Registrazione	Non accettare finché sotto trattamento Valutazione dell'idoneità da parte di una medica.
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Operazione grande_4 Operazione media_3 Trasfusione di sangue

Porfirie	Definizione	Un gruppo di malattie metaboliche accompagnate da un disturbo della sintesi dell'emoglobina. Causa: perlopiù genetica, raramente secondaria ad es. in seguito a disturbo della funzione epatica, intossicazione da piombo, emocromatosi, anemia emolitica, leucemia.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione



Porpora trombotica trombocitopenica	Definizione	Malattia acuta con decorso fulminante di trombocitopenia e anemia emolitica microangiopatica.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
Precancerosi	Definizione	Condizione che precede il tumore maligno o che può trasformarsi in un tumore maligno
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Vedere anche	Barrett, esofago di Basalioma Carcinoma in situ della cervice uterina
Pressione sanguigna bassa	Rinvio	Ipotensione
Pressione sanguigna elevata	Rinvio	Ipertensione arteriosa



Proctite	Definizione	<p>Infiammazione dolorosa della mucosa rettale che spesso coinvolge l'ano.</p> <p>La proctite infettiva insorge soprattutto nel contesto di malattie veneree, la causa frequente è un rapporto anale ricettivo non protetto. Può anche insorgere in concomitanza con malattie intestinali croniche infiammatorie.</p>
	Registrazione	<p>Accettare se :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertata • L'eventuale malattia di base lo consente
	CT / VT	Come registrazione e CIT fino alla diminuzione dell'infiammazione
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	<p>Comportamento a rischio, sessuale</p> <p>Malattia autoimmune</p> <p>Malattia sessualmente trasmissibile</p>

Professioni o hobby pericolosi	Definizione	<p>Disposizioni particolari possono applicarsi a proposito della ripresa del lavoro dopo una donazione a persone che praticano una professione che coinvolge una responsabilità maggiore per altre persone (pilota, conducenti di treni, di bus) o una professione pericolosa (autista di mezzi pesanti, manovratore di gru, copritetto, persone che esercitano una professione su scale o impalcature, subacqueo).</p> <p>Per i piloti ad es. un controllo medico supplementare oppure una liberazione può essere necessario da un servizio medico aeronautico.</p> <p>Tale disposizioni devono essere chiarificate prima della donazione.</p> <p>Per hobby come subacqueo, parapendio, volo motorizzato, scalata, corsa automobilistica e motociclistica: Un colloquio col centro di prelievo è raccomandato per determinare il termine di attesa dopo una donazione prima di riprendere l'attività.</p> <p>Agli atleti competitivi è raccomandato di interrompere l'allenamento per almeno una settimana.</p>
---------------------------------------	-------------	--

Prolasso uterino, operazione	Rinvio	Operazione media_3
-------------------------------------	--------	--------------------



Prolattinoma	Definizione	Tumore benigno (adenoma) della regione laterale del' <u>ipofisi</u> anteriore che causa un aumento della secrezione di <u>prolattina</u> → iperprolattinemia
	Registrazione	Non accettare anche se trattato / operato
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
Propecia	Rinvio	Medicamenti teratogeni
Proscar	Rinvio	Medicamenti teratogeni
Prostatectomia	Vedere anche	Operazione grande_4 Operazione media_3
Prostituzione	Definizione	Rapporti sessuali in cambio di denaro, droga o medicinali
	Nota bene	vedi 1415_DOK_Classification_Risk_Behaviour_I
	Vedere anche	Comportamento a rischio, sessuale
Protesi del ginocchio	Rinvio	Operazione media_3
Protesi dell'anca	Rinvio	Operazione media_3
Pseudocrisi	Definizione	Cambiamento repentino di comportamento
	Registrazione	Accertare la causa e la stabilità psichica
	CT / VT	Accertare la causa e la stabilità psichica Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT



Pseudoxantoma elastico (PXE)	Definizione	Sindrome di Grönblad-Strandberg. Malattia ereditaria in forma autosomica dominante o recessiva nella quale le fibre elastiche del tessuto connettivo vengono modificate dalla deposizione di calcio. Le fibre si fragilizzano e si riducono in brevi frammenti. Sono colpiti gli occhi, la pelle, il sistema cardiovascolare e il tratto gastrointestinale. Complicazioni: elevato rischio di emorragia
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Vedere anche	Strie angioidi

Psicosi	Definizione	Grave disturbo psichico acuto che si manifesta con una temporanea perdita, talvolta marcata, del contatto con la realtà.
	Registrazione	Accettare, 5 anni dopo la conclusione del trattamento medicamentoso in caso di unico episodio. Non accettare se due o più episodi.
	CT / VT	Come registrazione Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Litio, terapia Neurosi Schizofrenia



Psoriasi	Definizione	Malattia infiammatoria cronica della pelle e in parte anche di altri organi, tra cui le articolazioni (artrite psoriasica). Predisposizione perlopiù ereditaria, malattia autoimmune. Può peggiorare / essere provocata da G-CSF
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	Accettare se forma lieve (soltanto trattamento topico) e siti di punzioni non interessati Soltanto donazione di midollo osseo, informazione al centro di trapianto Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT, accettazione del rischio da parte del centro di trapianto
	Vedere anche	Malattia autoimmune
Puntura accidentale d'ago	Definizione	Ferita con un ago da puntione o da iniezione potenzialmente contaminato, soprattutto in ambito medico.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare solo se nessun segno d'infezione e non si sono verificate complicazioni CIT di 1 mese dopo l'avvenimento CIT di 12 mesi, se somministrazione de immunoglobuline anti-epatite B dopo una puntura accidentale d'ago
	MC	Accettare solo se nessun segno d'infezione e non si sono verificate complicazioni CIT di 2 mesi dopo l'avvenimento CIT di 12 mesi se somministrazione de immunoglobuline anti-epatite B dopo una puntura accidentale d'ago
	Vedere anche	Agopuntura Tatuaggio , piercing, make-up (se-mi)permanente, epilazione elettrica, microblading
Raffreddore	Rinvio	Infezione delle vie respiratorie superiori



Raffreddore da fieno	Definizione	Infiemmazione allergica della mucosa nasale dovuta al polline (rinite), pollinosi.
	Nota bene	Informare il centro di prelievo e il centro di trapianto in caso di allergie
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CI se sintomi gravi durante la stagione dei pollini Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Allergia
Ragade anale	Definizione	Lacerazione dolorosa della pelle o della mucosa dell'ano, può insorgere in forma acuta o cronica.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CI in caso di infiammazione florida
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Operazione piccola_2 Proctite
Rapporti sessuali, nuovi partner	Rinvio	Comportamento a rischio, sessuale e altro
Rene atrofico	Rinvio	Cirrosi renale
Rene policistico	Definizione	Gruppo di malattie renali perlopiù ereditarie caratterizzate dalla formazione di numerose sacche contenenti materiale liquido (cisti) e accompagnate dalla progressiva perdita della funzione renale.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID



Retinite pigmentosa	Definizione	Degenerazione della retina con progressiva distruzione dei fotorecettori. Alterazione ereditaria o spontanea.
	Registrazione	Accettare, a meno che non sta in relazione con un altro sindrome (p.es. malattia di Refsum)
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Disabilità fisica Malattia di Refsum
Revisione della cavità uterina	Definizione	Raschiamento dell'endometrio dell'utero.
	Registrazione	Accettare se nessuna malattia maligna
	CT / VT	CID se malattia maligna Durata della CIT a seconda del motivo dell'intervento
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Aborto
Rinite	Vedere anche	Allergia Sinusite (rinosinusite) acuta Sinusite (rinosinusite) cronica
Rinorragia	Definizione	Epistassi. Causa perlopiù locale e non pericolosa, ma può essere anche sintomo di una malattia generale ed essere grave / potenzialmente letale.
	Registrazione	Accettare , tranne se ricorre regolarmente in modo grave e non è accertata
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
Roaccutan	Rinvio	Medicamenti teratogeni

Rosacea	Definizione	Dermatosi frequente e cronica con arrossamento della pelle, papule e pustole sul volto. In casi gravi il quadro della malattia è aggravato da iperplasie del tessuto connettivo e delle ghiandole sebacee (fimatosi). Cause multifattoriali, tra cui infiammazione neurogenica, disturbo della regolazione della vascolarizzazione, disturbo del sistema immunitario. Diversi fattori scatenanti.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Rosolia	Definizione	Malattia infettiva contagiosa causata dal Rubivirus e che lascia immuni per tutta la vita, appartenente alle malattie infantili.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 1 mese dopo guarigione completa e fine del trattamento
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Malattie infantili, contatto
Rotavirus	Rinvio	Malattia diarroica
Salmonella typhi e paratyphi	Rinvio	Tifo/Paratifo
Salmonellosi, contatto	Rinvio	Malattia diarroica, contatto
Salpingite	Definizione	Infiammazione di una o entrambe le tube di Falloppio.
	Registrazione	CIT di 2 settimane dopo guarigione completa e fine del trattamento
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione



Sanguisughe, terapia delle	Definizione	Nella terapia delle sanguisughe si utilizzano sanguisughe mediche per il trattamento locale. Le sanguisughe hanno proprietà antinfiammatorie, analgesiche e anticoagulanti.
	Registrazione	Accettare se la malattia di base lo consente
	CT / VT	CIT di 2 mesi dopo la terapia delle sanguisughe
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Malattia vascolare venosa

Sarcoidosi	Definizione	Infiammazione granulomatosa, può colpire qualsiasi organo, ma molto spesso sono coinvolti i polmoni.
	Vedere anche	Malattia autoimmune

Scarlattina	Definizione	Malattia batterica acuta che insorge soprattutto nei bambini tra i quattro e i sette anni. Possibili complicazioni: febbre reumatica, glomerulonefrite, endocardite.
	Registrazione	CIT fino a guarigione completa
	CT / VT	CIT di 2 mesi dopo guarigione completa
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Endocardite Febbre reumatica Glomerulonefrite

Scarlattina, contatto	Registrazione	Accettare dopo il contatto
	CT / VT	CIT di 2 settimane
	MC	Come CT / VT

Schistosomiasi	Rinvio	Bilarziosi
-----------------------	--------	------------



Schizophrenia	Definizione	Gruppo di quadri clinici gravi di alterazione della percezione, del pensiero, del funzionamento dell'io, della volontà, dei sentimenti, dell'emotività, degli stimoli e della psicomotricità.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Sclerosi laterale amiotrofica, SLA	Definizione	Malattia incurabile degenerativa del sistema nervoso motorio.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Sclerosi multipla	Rinvio	Malattia autoimmune
Sferocitosi ereditaria	Definizione	Anemia emolitica di carattere ereditario dovuta a un difetto strutturale degli eritrociti.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Vedere anche	Anemia emolitica
Shigellosi	Definizione	Malattia diarroica batterica, causata dalla Shigella.
	Registrazione	CIT di 6 mesi dopo guarigione completa.
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Malattia diarroica
Shigellosi, contatto	Rinvio	Malattia diarroica, contatto



Shunt cerebrale	Definizione	Shunt VA / VP. Derivazione (catetere / drenaggio) dalle camere ventricolari del cervello verso la cavità addominale (DVP) o verso il cuore (derivazione ventricolo-atriale DVA) per il drenaggio permanente del liquido cerebrale in caso di idrocefalo o di pressione intracraniale elevata (primaria o secondaria).
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
SIDA / AIDS	Rinvio	HIV, infezione
Sifilide	Definizione	Malattia infettiva a prevalente trasmissione sessuale, causata da un batterio, il Treponema pallidum.
	Registrazione	Accettare se trattamento completo e riuscito
	CT / VT	Accettare se trattamento completo ed esclusione confermata dal laboratorio di un'infezione in corso Attitudine da determinare dal medico
	MC	Come CT / VT Attitudine da determinare dal medico
	Vedere anche	Comportamento a rischio, sessuale
Sifilide, contatto sessuale	Registrazione	CIT di 12 mesi dopo l'ultimo contatto con partner infettato/a
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
Sincope	Rinvio	Perdita di coscienza
Sindrome da ipermobilità	Rinvio	Ehlers-Danlos, sindrome di



Sindrome da tachicardia posturale ortostatica (POTS)	Definizione	Incremento anomalo della frequenza cardiaca quando si passa alla posizione eretta, con pressione arteriosa pressoché invariata. Può causare forti capogiri e svenimenti. Riguarda soprattutto le donne.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Sindrome dell'intestino irritabile	Definizione	Anche sindrome del colon irritabile. Disordine della funzione intestinale, insorge frequentemente, senza causa organica riconoscibile (esclusione!).
	Registrazione	Accettare se i disturbi sono controllabili
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione Attitudine da determinare dal medico
Sindrome dell'ovaio policistico (SOPC)	Definizione	PCOD : polycystic ovarian disease. Forma particolare delle ciste ovariche. Squilibrio ormonale che risulta in una disfunzione ovarica con oligo- o amenorrea, obesità e iperandrogenismo. Importante: escludere un tumore in caso di ipertestosteronemia o iperprolattinemia (prolactinoma).
	Registrazione	Accettare se non ci sono complicazioni, anche sotto terapia (Metformin)
	CT / VT	CIT fino a guarigione completa se ci sono delle complicazioni
	MC	Come CT / VT Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	Vedere anche	Cisti ovarica



Sindrome delle gambe senza riposo	Definizione	Sensazione di fastidio o irrequietezza alle gambe con il bisogno impellente di muoverle, spesso con movimenti involontari. Fa parte delle ipercinesie extrapiramidali. Malattia neurologica, predisposizione familiare, secondaria in diverse malattie di base o alterazioni metaboliche (ad es. anemia, gravidanza, insufficienza renale, ipotiroidismo e ipertiroidismo)
	Registrazione	Accertare il grado di gravità, informarsi sulle limitazioni nella vita di tutti i giorni. Accettare, se forma leggera senza limitazioni con o senza medicinali
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
Sindrome di Asperger	Definizione	Disturbo pervasivo dello sviluppo e disturbo dello spettro autistico con compromissione dell'interazione sociale e dell'empatia in particolare. Da normale a elevato QI, abilità particolari in settori specifici, sviluppo normale, spesso precoce, del linguaggio.
	Registrazione	Accettare se: <ul style="list-style-type: none"> • il donatore è capace di discernimento e di dare il proprio consenso informato e • comprende il processo della donazione • lo stato del donatore è stabile (indipendentemente dal trattamento medicamentoso) Importante: informarsi sulla situazione lavorativa, limitazioni nella vita di ogni giorno
	CT / VT	Come registrazione , nuova valutazione dello stato ed eventuali limitazioni Attitudine da determinare dal medico
	MC	Come CT / VT Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
Sindrome di Flammer	Definizione	Disregolazione vascolare sporadica, focale o generalizzata.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione



Sindrome di Lyell	Definizione	Epidermolisi acuta tossica, necrolisi epidermica tossica, TEN. «Sindrome della pelle bruciata». Alterazione cutanea rara, acuta con distacco bolloso dell'epidermide. Dermatosi potenzialmente letale, tasso di mortalità del 25 –70%, a seconda del grado. 2 forme: - indotta da farmaci: effetti collaterali allergici gravi di farmaci, tra cui di antibiotici (sulfonamidici), antiepilettici (fenitoina), analgesici, FANS (metamizolo, ibuprofen, diclofenac), allopurinolo. - indotta da Stafilococco: indotta da esotossina dello Staphylococcus aureus, colpisce soprattutto i lattanti nei primi tre mesi di vita o gli adulti immunocompromessi. Impetigine spesso all'inizio localizzata. TEN è la forma più grave dell'epidermolisi tossica, lo «stadio preliminare» è la sindrome di Stevens-Johnson (SJS).
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Sindrome di Stevens-Johnson

Sindrome di Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH)	Definizione	Malformazione congenita del genitale femminile presumibilmente causata da anomalia cromosomica con aplasia della vagina con o senza aplasia dell'utero. La funzione ovarica è mantenuta per cui il normale sviluppo delle caratteristiche sessuali secondarie è possibile. Frequenza: ca. 1:5000 Complicazione: eventuale malformazione concomitante dei reni o delle vie urinarie, oppure malformazione scheletrica (colonna vertebrale)
	Registrazione	Accettare se la funzione renale è normale e non vi è malformazione scheletrica
	CT / VT	Come registrazione Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT



Sindrome di Mondor	Definizione	Infiammazione indurativa subacuta delle vene superficiali nella zona del torace e delle braccia (parte superiore); forma speciale: malattia di Mondor peniena. Può insorgere come sintomo concomitante di un'afezione cancerosa quindi accertamento di affezioni tumorali (carcinoma mammario dalle donne). Donne colpite con maggiore frequenza, il 75 % è di mezza età
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Sindrome di Proteo	Definizione	Rarissima malattia genetica caratterizzata all'inizio da gigantismo regionale (cranio, estremità, piante del piede) e successivamente da una formazione di tumori multipli. Inoltre malformazioni vascolari, seguite da embolie polmonari e trombosi venose profonde. Complicazioni: rischio elevato di trombosi
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Sindrome di Reiter	Definizione	Malattia infiammatoria di origine infettiva batterica che coinvolge le articolazioni, caratterizzata da una triade di processi infiammatori quali artrite, congiuntivite/uveite e uretrite.
	Vedere anche	Malattia autoimmune
Sindrome di Sjögren	Definizione	Malattia autoimmune cronica che causa un'infiammazione delle ghiandole salivari o sierose della testa e della gola.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Vedere anche	Malattia autoimmune



Sindrome di Stevens-Johnson	Definizione	SJS. Una forma dell'eritema essudativo multiforme. Reazione cutanea (allergica) rara mediata dalla cellula T che provoca il distacco della pelle, scatenata da medicinali (ca. 50%), infezioni (micoplasmici, batteri, virus) o processi maligni. Porta alla necrosi dei cheratinociti. Sempre interessamento (d'obbligo) della mucosa. Letalità circa 6%. Diversi gradi di gravità: • interessamento fino al 10% della superficie del corpo: SJS • interessamento del 10-30%: forma transitoria SJS – TEN • interessamento > 30%: TEN (TEN = necrolisi epidermica tossica, sindrome di Lyell)
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Sindrome di Lyell
Sindrome dolorosa regionale complessa, (Complex regional pain syndrome, CRPS)	Definizione	Complicazione di una lesione od operazione delle estremità. Sindrome dolorosa post-traumatica con dolori sproporzionati per intensità o durata, disturbi circolatori, limitazione motoria e disturbi della crescita. Infiammazione dei neuroni, che porta a distrofia e atrofia degli arti (precedentemente: sindrome di Sudeck)
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Sindrome post-polio	Definizione	Manifestazione conseguente di una poliomielite con crescente stanchezza, dolori muscolari e articolari nonché debolezza muscolare che insorge diversi decenni dopo l'infezione.
	Vedere anche	Disabilità fisica
Sindrome secca	Rinvio	Malattia autoimmune



Sinusite (rinosinusite) acuta	Definizione	Alterazione infiammatoria della mucosa dei seni paranasali (sinusite) e delle vie aeree nasali (rinite) che dura meno di 12 settimane.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CI di 2 settimane dopo guarigione completa e fine della terapia antibiotica
	MC	Come CT / VT
Sinusite (rinosinusite) cronica	Definizione	Alterazione infiammatoria della mucosa dei seni paranasali (sinusite) e delle vie aeree nasali (rinite) che dura più di 12 settimane.
	Registrazione	CIT fino a 3 mesi dopo guarigione completa
	CT / VT	Come registrazione Non accettare se forma cronica recidivante e / o se necessario trattamento antibiotico
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Operazione media_3 Operazione piccola_2
Siringomielia	Definizione	Formazione anomala di una o più cisti o di cavità di liquido nella sostanza grigia del midollo spinale, soprattutto midollo cervico-toracico, congenita (spesso ulteriori anomalie) o acquisita (da tumori, dopo un trauma).
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Situazione a rischio	Definizione	Situazione nella quale esiste un rischio elevato di contrarre una malattia /infezione trasmissibile dal sangue (ad.es. VEB, VEC, HIV)
	Vedere anche	Comportamento a rischio, sessuale e altro Endoscopia Puntura accidentale d'ago



Soffio al cuore	Definizione	Rumore perlopiù patologico nel cuore o al cuore rilevabile all'auscultazione.
	Registrazione	Accettare se asintomatico e accertato dal medico
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione Medical CheckUp con accertamento cardiologico
Soggiorno all'estero	Vedere anche	Creutzfeld-Jakob, malattia di, rischio 7_soggiorno in Gran Bretagna Lista dei paesi
	Rinvio	Creutzfeld-Jakob, malattia di, rischio 7_soggiorno in Gran Bretagna
Spina bifida	Definizione	Chiusura difettosa della colonna vertebrale nell'embrione. I sintomi variano a seconda dell'entità del difetto di chiusura. In alcuni casi i sintomi sono lievi o non vi sono sintomi, in altri insorgono gravi deficit neurologici al di sotto della lesione. Si distingue tra spina bifida occulta e spina bifida aperta.
	Registrazione	Accettare : Spina bifida occulta, senza: <ul style="list-style-type: none"> • shunt duraturo • cateterismo della vescica • decubito Non accettare : Spina bifida aperta Attitudine da determinare dal medico
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Creutzfeldt-Jakob, malattia di, rischio 3_Operazione al cervello o midollo spinale



Splenectomia	Definizione	Asportazione chirurgica della milza.
	Registrazione	CIT di 6 mesi dopo l'operazione e fino a guarigione completa, qualora di origine traumatica o la cui causa non costituisce un criterio di esclusione
	CT / VT	Come registrazione Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Operazione grande_4

Spondilite anchilosante	Definizione	M. Bechterew. Malattia sistemica reumatica, infiammatoria, cronica e sieronegativa con dolori e irrigidimento di articolazioni. Interessamento in particolare delle articolazioni della colonna vertebrale e delle articolazioni sacroiliache. Spesso associata all'HLA B-27. Malattia autoimmune
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Vedere anche	Malattia autoimmune

Spondilodesi, operazioni	Rinvio	Operazione grande_4
---------------------------------	--------	---------------------



Sterilità	Definizione	Infertilità. Informarsi sempre sulla causa.
	Registrazione	Non accettare se <ul style="list-style-type: none"> • in accertamento • sotto trattamento medicamentoso con tamoxifene • trasferimento di ovuli o embrioni da donatori estranei • trattamento ormonale di origine umana prima del 1986 • la causa costituisce una controindicazione alla donazione Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Clomid®
	<hr/>	
Sterilizzazione	Vedere anche	Operazione media_3 Operazione piccola_2
<hr/>		
Stomatomicosi	Rinvio	Candidosi
<hr/>		
Stomia	Definizione	Operazione con la quale si crea un'apertura tra un organo cavo e la pelle esterna (ad es. ileostomia, tracheostomia).
	Registrazione	Non accettare, tranne dopo un impianto transitorio e se la malattia di base non costituisce un criterio di esclusione
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Operazione grande_4 Operazione media_3



Strie angioidi	Definizione	Dette anche strie Knapp. Sono alterazioni della membrana di Bruch (una membrana elastica della retina), bilaterali, dovuti a calcificazioni. Spesso associate a: pseudoxantoma elastico, sindrome di Ehlers-Danlos, morbo di Paget, anemia drepanocitica e altre immunoglobulinopatie
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Vedere anche	Anemia falciforme Ehlers-Danlos, sindrome di
Struma	Rinvio	Patologia tiroidea
Studi clinici	Definizione	Partecipazione a sperimentazioni cliniche allo scopo di rispondere a quesiti medico-scientifici e di migliorare il trattamento medico.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
Svenimento	Rinvio	Perdita di coscienza



Talassemia, alfa	Definizione	Anemia mediterranea. Difetto ereditario nella sintesi dell'emoglobina.
	Nota bene	Informare il centro di trapianto
	Registrazione	Accettare <ul style="list-style-type: none">• portatore• talassemia minor, se il donatore è in buona salute e i valori dell'emoglobina lo consentono Non accettare: <ul style="list-style-type: none">• talassemia major e intermedia
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione

Talassemia, beta	Definizione	Anemia mediterranea. Difetto ereditario nella sintesi dell'emoglobina.
	Nota bene	Informare il centro di trapianto
	Registrazione	Accettare <ul style="list-style-type: none">• portatore• talassemia minor, se il donatore è in buona salute e i valori dell'emoglobina lo consentono Non accettare: <ul style="list-style-type: none">• talassemia major e intermedia
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione



Tatuaggio , piercing, make-up (se-mi)permanente, epilazione elettrica, microblading	Definizione	Ferita con un ago da punzione o da iniezione potenzialmente contaminato
	Nota bene	Stare sempre attenti a una tecnica di lavoro sterile utilizzando aghi monouso, attenzione in caso di tatuaggio o piercing fatto in un paese a elevato rischio di infezioni (chiedere! -> informazione al centro di trapianto)
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare solo se nessun segno d'infezione e non si sono verificate complicazioni CIT di 1 mese dopo l'avvenimento
	MC	Accettare solo se nessun segno d'infezione e non si sono verificate complicazioni CIT di 2 mesi dopo l'avvenimento
	Vedere anche	Agopuntura Puntura accidentale d'ago

Tenia	Rinvio	Echinococcosi
--------------	--------	---------------

Terapia di ablazione delle vene	Definizione	Esistono vari metodi di ablazione delle vene in caso di insufficienza venosa cronica (soprattutto varici): chimici, termali, meccanici. Tra cui: <ul style="list-style-type: none"> • scleroterapia • ablazione con laser / luce / radiofrequenza • legature delle vene / delle perforanti • stripping • crossectomia
	Vedere anche	Operazione grande_4 Operazione media_3 Operazione piccola_2



Tifo/Paratifo	Definizione	Malattia infettiva sistemica soggetta all'obbligo di notifica causata dal batterio Salmonella typhi o Salmonella Paratyphi.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 1 settimana dopo la fine del trattamento e della guarigione completa
	MC	Come CT / VT
Tiroidite	Rinvio	Patologia tiroidea
Toctino	Rinvio	Medicamenti teratogeni
Tonsillectomia	Rinvio	Operazione media_3
Tonsillite acuta	Definizione	Angina tonsillare, infiammazione acuta delle tonsille.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CI di 2 settimane dopo la fine del trattamento antibiotico e fino a guarigione completa Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT
Tonsillite cronica / recidivante	Definizione	Infiammazione delle tonsille di una durata di > 12 settimane o cronica recidivante.
	Registrazione	CIT di 3 mesi dopo guarigione completa
	CT / VT	Come registrazione Non accettare se cronica recidivante e/o necessario trattamento antibiotico
	MC	Come CT / VT
Tosse canina	Rinvio	Pertosse



Toxoplasmosi	Definizione	Malattia infettiva causata da <i>Toxoplasma gondii</i> . Zoonosi, infestazione primaria da gatti, l'uomo è un ospite intermedio facoltativo. Infezione nelle persone immunocompetenti perlopiù asintomatica, nelle donne incinte può provocare malformazioni embrionali.
	Nota bene	In caso di esito positivo informare sempre il centro di trapianto.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 6 mesi in caso di infezione attuale evidenziata
	MC	Come CT / VT

Tracheite	Definizione	Reazione a stimoli infettivi, allergici, chimici o meccanici. Tracheite acuta spesso conseguenza di un'infezione virale delle aree respiratorie o combinata (ad es. rinotracheite, tracheobronchite).
	Registrazione	Accettare eccetto se malattia cronica con forte limitazione della respirazione
	CT / VT	CIT fino a guarigione completa in caso di sintomatica acuta CID in caso di malattia cronica con forte limitazione della respirazione
	MC	Come CT / VT



Transgender	Definizione	Transessuale, designazione per persone il cui sesso sociale diverge da quello biologico. Non si sentono di appartenere al sesso nel quale sono nati. Nessun rapporto con l'orientamento sessuale.
	Registrazione	Nella registrazione nella banca dati internazionale deve figurare il sesso biologico Utilizzare il nome con il quale il donatore si identifica Tenere conto degli eventuali trattamenti ormonali o del cambio medico / operativo di sesso
	CT / VT	Accettare se eventuali trattamenti ormonali o cambio medico / operativo di sesso non costituiscono criteri di esclusione <ul style="list-style-type: none"> • Informare i centri di prelievo e trapianto dello stato trans • Negli uomini trans (f --> h): anamnesi di gravidanze • Nelle donne trans (h --> f): prevalenza globale elevata di HIV Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT, in più: <ul style="list-style-type: none"> • in caso di donazione, tener conto dei parametri fisiologici (emoglobina, ferritina, volume sanguigno) • eventualmente test di gravidanza negli uomini trans
	Vedere anche	Comportamento a rischio, sessuale
Trapianto allogenico	Rinvio	Creutzfeldt-Jakob, malattia di, rischio 1_Trapianto di tessuto umano
Trapianto xenogenico	Rinvio	Creutzfeldt-Jakob, malattia di, rischio 4_Trapianto di tessuto animale



Trapianto, autologo	Definizione	Trapianto di tessuto di una persona a un altro posto del suo corpo.
	Registrazione	Accettare se trapianto di pelle, vasi sanguigni, capelli, osse (materiale osseo), ligamenti o cartilagine Non accettare : Trapianto autologo di cellule staminali del sangue Valutazione dell'idoneità da parte di una medica secondo la malattia di base
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione



Trasfusione di sangue	Definizione	Prodotti labili: CE, CP, PFC omologo Prodotti stabili: albumina, immunoglobuline e fattori della coagulazione estratti dal plasma. Fattori della coagulazione: prodotti del genio genetico.
	Nota bene	Sempre porre la domanda: Quando e dove è stata effettuata la trasfusione?
	Registrazione	CIT di 12 mesi dopo trasfusione in un paese con elevato rischio di HIV/AIDS, altrimenti accettare;a secondo dell'indicazione
	CT / VT	CIT di 1 mese o di più secondo la situazione / protezione del donatore dopo trasfusione in un paese senza elevato rischio di HIV/AIDS NB: se trasfusione in Gran Bretagna: accettare per il CT/VT, però sempre informare il centro di trapianto CIT di 12 mesi dopo trasfusione in un paese con elevato rischio di HIV/AIDS Se il partner sessuale a ricevuto una trasfusione in un paese con elevato rischio di HIV/AIDS, rinvio a "Comportamento a rischio, altro, B8/C8/D8" In caso di trasfusione di sangue in una zona a rischio di Chagas: sierologia per la malattia di Chagas al momento del CT
	MC	CIT di 2 mesi o di più secondo la situazione / protezione del donatore dopo trasfusione in un paese senza elevato rischio di HIV / AIDS NB: se trasfusione in Gran Bretagna: Medical CheckUp ok, però sempre informare il centro di trapianto CIT di 12 mesi dopo trasfusione in un paese con elevato rischio di HIV/AIDS Se il partner sessuale a ricevuto una trasfusione in un paese con elevato rischio di HIV/AIDS, rinvio a "Comportamento a rischio, altro, B8/C8/D8"
Vedere anche	Comportamento a rischio, altro, C8 Comportamento a rischio, altro, D8 Comportamento a rischio, sessuale e altro Operazione_in generale_1 Politrauma Situazione a rischio	



Trattamento laser	Definizione	Applicazione di un laser per scopi paramedici o cosmetici, ad es. eliminazione di macchie cutanee, rimozione di tatuaggi, depilazione. La superficie cutanea trattata deve essere intatta !
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare eccetto in caso di rimozione di tatuaggi --> CIT di 2 settimane dopo l'ultimo trattamento
	MC	Come CT / VT
Trattamento medicamentoso	Registrazione	Accettare se con la terapia medicamentosa prescritta dal medico il donatore si è ben adattato / si è stabilizzato (ad es. pressione sanguigna, diabete) Non accettare se il motivo della terapia è una grave malattia cronica Se assume taluni medicinali che contengono ad es. agenti teratogeni, il donatore deve essere disposto a / deve essere possibile interromperli per un determinato periodo di tempo in caso di donazione (ad es. derivati della vit. A, finasteride, vismodegib, ecc.) Verificare la causa della terapia Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Lista dei medicinali
	Trattamento ormonale	Definizione
	Nota bene	Sempre accertare la causa della terapia ormonale
	Registrazione	Accettare in caso di uso di ormoni sintetici o ricombinanti, se la malattia di base lo consente Non accettare in caso di uso di ormoni di origine umana
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione



Trauma cranico	Rinvio	Ferita alla testa, grave
Tretinac	Rinvio	Medicamenti teratogeni
Tripanosomiasi africana	Definizione	Malattia tropicale potenzialmente letale causata da protozoi e trasmessa dalla puntura della mosca tse-tse. È caratterizzata da uno stato di torpore e sonnolenza.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Trombocitemia primitiva / essenziale	Definizione	Trombocitosi. Appartiene alla forma delle neoplasie mieloproliferative. Forte aumento incessante dei trombociti nel sangue.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Trombocitopatia	Definizione	Anche trombopatia. Disfunzione dei trombociti che causa un aumento della predisposizione alle emorragie.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID



Trombocitopenia auto-immune (PTI)

Definizione	Porpora trombocitopenica idiopatica. Malattia autoimmune. Distruzione dei trombociti dovuta ad anticorpi liberi o legati alle piastrine → Piastrinopenia <ul style="list-style-type: none">• PTI acuta: colpisce soprattutto i bambini, nella maggior parte dei casi scompare spontaneamente• PTI cronica: colpisce soprattutto gli adulti (morbo Werlhof). Progressione quasi sempre cronica
Registrazione	Non accettare tranne in caso di episodio unico nell'infanzia con guarigione completa
CT / VT	Come registrazione
MC	Come registrazione



Trombofilia	Definizione	<p>Ipercoagulabilità. Anomalia genetica o acquisita che forma trombi all'interno dei vasi sanguigni (a seguito di una mutazione delle caratteristiche delle cellule ematiche, del plasma, del flusso sanguigno o delle pareti dei vasi sanguigni).</p> <p>Predisposizione ereditaria fino al 50%, i fattori della coagulazione sono alterati da mutazioni genetiche.</p> <p>Fattori di rischio (supplementari): fumo, sovrappeso, mancanza di movimento, medicinali, (soprattutto contraccettivi contenenti estrogeni), gravidanza, immobilità.</p> <p>I più frequenti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • resistenza all'APC (mutazione del fattore V di Leiden) • carenza di proteina C • carenza di proteina S • mutazione 20210 della protrombina • carenza di antitrombina • anticorpi antifosfolipidi / anticoagulante lupico • trombocitopenia indotta da eparina, tipo II <p>Altre forme d'intesa con il medico.</p>
	Registrazione	<p>Accettare in caso di trombofilia lieve (mutazione eterozigote del fattore V di Leiden, mutazione 20210 eterozigote della protrombina), se</p> <ul style="list-style-type: none"> • anamnesi blanda di eventi tromboembolici • non sono noti altri fattori di rischio di trombosi <p>Non accettare tutte le altre trombofilie</p>
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione



Tromboflebite / Flebite	Definizione	Infiammazione delle vene superficiali con o senza formazione di un trombo. Accertare sempre la malattia di base e i fattori di rischio!
	Nota bene	La somministrazione di G-CSF costituisce un fattore di rischio. Pericolo di embolia in caso di formazione di un trombo.
	Registrazione	Accettare dopo terapia conclusa per evento unico indotto e guarigione completa nonché in assenza di predisposizione familiare Non accettare in caso di eventi ripetuti Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	CT / VT	CI dopo terapia conclusa 1-6 mesi a seconda della gravità Come registrazione
	MC	Come CT / VT
Trombosi arteriosa	Rinvio	Malattia vascolare arteriosa
Trombosi coronarica	Rinvio	Malattia cardiovascolare
Trombosi del seno venoso	Definizione	Trombosi nei seni venosi durali, vasi che drenano il sangue venoso dal cervello.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Trombosi retinica	Definizione	Occlusione della vena nella retina.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Trombosi venosa profonda	Rinvio	Flebotrombosi



Trombosi venosa superficiale	Rinvio	Tromboflebite / Flebite
Trypanosoma Cruzi	Vedere anche	Chagas, infezione Chagas, rischio di
Tubercolosi	Definizione	Malattia infettiva batterica causata da diversi ceppi di micobatteri e che nell'uomo attacca solitamente i polmoni. Si trasmette quasi sempre per via aerea attraverso goccioline di saliva, molto raramente attraverso il sangue, trapianto di organi o altri secreti corporei.
	Registrazione	Accettare se: <ul style="list-style-type: none"> • -nessuna infezione acuta evidenziabile • trascorsi almeno 2 anni dalla fine del trattamento • nessuna ricaduta
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Tubercolosi latente
Tubercolosi latente	Definizione	Prova sierologica (ad es. Quantiferon®) o test di Mantoux di un'infezione da M. tuberculosis senza segni di una tubercolosi attiva o dopo la relativa esclusione.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	Valutazione dell'idoneità da parte di una medica; informazione centro trapianti
	MC	Valutazione dell'idoneità da parte di una medica; Accettazione del rischio da parte di centro trapianti



Tuberculosi, contatto	Definizione	Contatto con una persona malata di tubercolosi. Il rischio di infezione dipende da vari fattori: frequenza, durata e vicinanza del contatto, virulenza dell'agente patogeno e difese immunitarie dell'ospite.
	Registrazione	Accettare eccetto se contatto regolare e stretto con persone affette da tubercolosi aperta
	CT / VT	CIT di 2 mesi dopo l'ultimo contatto, in seguito test di screening
	MC	Come CT / VT
Tumore cerebrale, benigno	Definizione	Tumore benigno al cervello
	Registrazione	Accettare, se: <ul style="list-style-type: none">• Asportato completamente per via chirurgica• Nessuna sequela neurologica• Nessuna terapia farmacologica (ad es. preparati ormonali, farmaci antiepilettici)• Cure post-trattamento concluse Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
Tumore cerebrale, maligno	Definizione	Tumore maligno al cervello
	Registrazione	Non accettare, anche se rimosso
	CT / VT	CID
	MC	CID
Tumore renale benigno	Definizione	Tipico tumore renale benigno: tumore formato da tessuto adiposo e vasi sanguigni (angiomiolipoma).
	Registrazione	Accettare Ev. dopo escissione, se la funzione renale è ripristinata Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione



Tumorectomia	Definizione	Rimozione chirurgica conservativa di un piccolo tumore al seno
	Vedere anche	Cancro Operazione grande_4 Operazione media_3 Operazione piccola_2
	CT / VT	CIT di 1 mese dopo l'intervento e fino a guarigione completa
	MC	Come CT / VT

Tunnel carpale, sindrome del	Definizione	Sindrome da compressione del nervo mediano a livello del carpo. Terapia conservativa od operativa.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 1 mese dopo l'intervento e fino a guarigione completa
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Operazione piccola_2

Turner, sindrome di	Definizione	Monosomia gonosomica, cariotipo 45,X
	Registrazione	Accettare in assenza di insufficienze o disfunzioni cardiache o renali e consenso informato possibile
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Disabilità fisica



Ulcera gastrica / Ulcera duodenale

Definizione	Ulcera dello stomaco o del duodeno.
Nota bene	Esclusione di tumore dello stomaco
Registrazione	Accettare
CT / VT	CI : <ul style="list-style-type: none"> • in caso di sintomi acuti • di 1 mese dopo endoscopia e a seconda dell'esito • in caso di esito positivo all'<i>Helicobacter pylori</i> fino a eradicazione totale dello stesso Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
MC	CI : <ul style="list-style-type: none"> • in caso di sintomi acuti • di 2 mesi dopo l'endoscopia e a seconda dell'esito • in caso di esito positivo all'<i>Helicobacter pylori</i> fino a eradicazione dello stesso Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
Vedere anche	Endoscopia

Ulcera venerea

Definizione	Detta anche ulcera molle (o cancroide). Malattia sessualmente trasmissibile molto rara in Europa, presente soprattutto nei Paesi tropicali.
Registrazione	CIT di 12 mesi dopo la fine del trattamento (donatore e partner sessuale)
CT / VT	Come registrazione
MC	Come registrazione
Vedere anche	Comportamento a rischio, sessuale Malattia sessualmente trasmissibile



Uretrite	Definizione	Infiammazione dell'uretra
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT fino a guarigione completa e di 2 settimane dopo la fine del trattamento antibiotico, se acuta CID se cronica
	MC	Come CT / VT
Vaccinazione	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Accettare secondo Allegato Art. 7, Vaccine Check: Termini di controindicazione dopo una vaccinazione
	MC	Come CT / VT
Valvulopatia	Definizione	Disfunzione congenita o acquisita delle valvole cardiache; può colpire ognuna delle 4 valvole ed è caratterizzata da stenosi (restringimento), insufficienza (coaptazione imperfetta) o entrambi (vizio combinato). Lievi valvulopatie non causano sintomi, a seconda delle circostanze. In caso di vizi sintomatici è necessario nella maggior parte dei casi un intervento chirurgico (ricostruzione o sostituzione delle valvole).
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	CID
	MC	CID
Vaquez-Osler, malattia di	Rinvio	Policitemia vera
Varicella	Rinvio	Herpes zoster
Varici esofagee	Rinvio	Ipertensione portale



Varici, gambe	Definizione	Varicosi
	Registrazione	Accettare se: <ul style="list-style-type: none"> nessuna complicazione infiammatoria o trombotica stadio \leq C2 secondo la classificazione CEAP, ossia nessun edema o alterazione cutanea
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Flebotrombosi Ipertensione portale Terapia di ablazione delle vene
Varicosi	Rinvio	Varici, gambe
Vasectomia	Rinvio	Sterilizzazione
Vene varicose, rimozi- one	Rinvio	Terapia di ablazione delle vene
Verruche	Definizione	Frequenti escrescenze sullo strato superficiale della pelle, in certe circostanze contagiose, piccole, estremamente circoscritte e indotte dal virus Human Papilloma.
	Registrazione	Accettare se le verruche cutanee sono trattate solo localmente e la pelle è intatta
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Verruche genitali



Verruche genitali	Definizione	Condilome acuminata. Una delle più frequenti malattie sessualmente trasmissibili causata dal Papillomavirus umano.
	Registrazione	Accettare se l'anamnesi non presenta altre malattie sessualmente trasmissibili
	CT / VT	Come registrazione e informazione al centro di trapianto se sintomatica
	MC	Come CT / VT
	Vedere anche	Comportamento a rischio, sessuale Papilloma Virus Umano o HPV

Vertigini	Definizione	Sintomo di movimento illusorio con diverse possibili cause.
	Registrazione	CIT fintanto che sotto accertamento, altrimenti decisione a seconda della causa delle vertigini Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
	Vedere anche	Emicrania Malattia cerebrovascolare Menière, malattia di Neurinoma acustico

Virus West Nile, infezione da	Definizione	Malattia infettiva che si manifesta principalmente negli uccelli, può essere trasmessa all'uomo dalle zanzare. Nell'80% dei casi l'evoluzione è asintomatica o ha un decorso con sintomi simili all'influenza.
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 4 mesi dopo la diagnosi o l'insorgenza dei sintomi (rischio per il paziente). Informare il centro trapianti del risultato positivo/malattia. In un caso molto urgente, il centro di trapianto può decidere di abbreviare la durata del CIT, accettando il rischio, se il donatore è asintomatico -> vedi " Virus di West Nile , rischio di".
	MC	Come CT / VT



Virus West Nile, rischio	Definizione	Soggiorno in una regione a rischio (Allegato Art. 7, Travel-check). I test vengono generalmente eseguiti durante la stagione
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Se di ritorno da > 1 mese , con o senza sintomi: <ul style="list-style-type: none">• accettare• senza CIT• senza test Se di ritorno da < 1 mese , senza sintomi: <ul style="list-style-type: none">• accettare• senza CIT• senza test (il test è eseguito durante il MC) Se di ritorno da < 1 mese , con sintomi: <ul style="list-style-type: none">• Accettare per CT / VT• Fare il test NAT - non prima di 5 giorni dopo il ritorno
MC	<i>Termine MC nel periodo luglio – dicembre:</i> Eseguire il test NAT in ogni caso . In caso di viaggio, non prima di 5 giorni dal rientro dall'area a rischio . <i>Termine MC nel periodo gennaio – giugno:</i> Ritorno da > 1 mese , con o senza sintomi: <ul style="list-style-type: none">• accettare• nessun termine CIT• nessun test Ritorno da < 1 mese , con o senza sintomi: <ul style="list-style-type: none">• accettare• eseguire il test NAT – non prima di 5 giorni dopo il ritorno	



Virus Zika, infezione da	Definizione	Infezione virale trasmessa dalle zanzare con sintomi simili all'influenza, però in ca. 80% è asintomatica. Nelle donne incinte possono risultare gravi danni al feto. Infezione accertata (test NAT positivo)
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	CIT di 4 mesi dopo la diagnosi o l'inizio dei sintomi Informare il centro trapianti del risultato positivo NAT/malattia. In un caso urgente, il centro di trapianto può decidere di abbreviare la durata del CIT, accettando il rischio, se il donatore è asintomatico
	MC	Come CT / VT



Virus Zika, rischio	Definizione	Soggiorno in una regione a rischio virus Zika (vedi elenco dei paesi a rischio) o carta CDC.
	Nota bene	La diffusione attuale si vede sul sito del CDC (Centre for Disease Control and Prevention, USA): https://www.cdc.gov/zika/areasatrisk.html
	Registrazione	Accettare
	CT / VT	Se di ritorno da > 1 mese , con o senza sintomi: <ul style="list-style-type: none">• accettare• senza CIT• senza test Se di ritorno da < 1 mese , senza sintomi: <ul style="list-style-type: none">• accettare• senza CIT• senza test Se di ritorno da < 1 mese , con sintomi: <ul style="list-style-type: none">• Accettare per CT / VT• Fare il test NAT - non prima di 5 giorni dopo il ritorno
MC	Se di ritorno da > 1 mese , con o senza sintomi: <ul style="list-style-type: none">• accettare• senza CIT• senza test Se di ritorno da < 1 mese , con o senza sintomi: <ul style="list-style-type: none">• accettare• fare il test PCR, al più presto 5 giorni dopo il ritorno	

Vismodegib	Rinvio	Medicamenti teratogeni
-------------------	--------	------------------------



Vitiligne	Definizione	Dermatosi frequente, visibile esteticamente, caratterizzata da una perdita di pigmento a chiazze, causata dalla distruzione di melanociti nell' epidermide.
	Registrazione	Non accettare
	CT / VT	Accettare Soltanto donazione di midollo osseo, informazione al centro di trapianto Valutazione dell'idoneità da parte di una medica
	MC	Come CT / VT, accettazione del rischio da parte del centro di trapianto
von Recklinghausen, malattia di	Rinvio	Neurofibromatosi (NF)
Von Willebrand, malattia di	Definizione	Disturbo della coagulazione il più frequente a carattere autosomico dominante ereditario. Difetto strutturale o carenza del fattore di von Willebrand (vWF). Il vWF è la proteina vettrice del fattore VIII.
	Registrazione	Non accettare tranne se portatore del tipo 3
	CT / VT	Come registrazione
	MC	Come registrazione
Yersinia enterocolitica	Rinvio	Malattia diarroica