



Anhang zum Informationsschreiben der Vorschriftenänderungen SBSC, gültig ab 11.08.2025

Anpassungen der Spendetauglichkeitskriterien – Blutstammzellspende

1410 / 1411 / 1412_DOK_Donor_Eligibility_Criteria_Blood_Stem_Cell_Donation_D / F / I

In diesem Dokument werden die neuen und geänderten Kriterien aufgelistet. Bei den geänderten Kriterien sind die Änderungen markiert.

Allergie	Definition	Krankhafte Reaktion des Immunsystems auf Allergene (z.B. Medikamente, Nahrungsmittel, Bienen- /Wespenstich etc.)
		<u>Gradeinteilung für <i>akute Reaktionen</i>:</u>
		Grad 1: Juckreiz, Rötung, Urtikaria, Schwellung
		Grad 2: Grad 1, Rhinorrhö (Naselaufen) , Heiserkeit, Luftnot, Übelkeit, Erbrechen, Anstieg der Herzfrequenz, Blutdruckabfall, Rhythmusstörung
		Grad 3: Grad 1, Erbrechen, Schwellung der Atemwege, Bronchospasmus, Schock
		Grad 4: Grad 1, Erbrechen, Atemstillstand, Kreislaufstillstand.
	Zu beachten	Bei Allergie immer EZ und TZ informieren. Schwerwiegende Reaktionen auf Medikamente, v.a. Anästhetika, besonders beachten !!
	Registrierung	Akzeptieren bei Grad 1 mit / ohne Behandlung: <ul style="list-style-type: none"> nur lokale Behandlung/nur bei Anfall / nur Inhalationstherapie Nicht akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> Grad 2 - 4 Reaktionen regelmässige perorale Behandlung notwendig anaphylaktische Reaktion bekannt
	CT / VT	Akzeptieren bei Grad 2, wenn einmaliges Ereignis bei bekanntem Allergen, welches nicht kritisch ist für Mobilisierung/Entnahme Nicht akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> Grad 3 - 4 Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt
	MC	Wie CT / VT Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt
	Siehe auch	Arzneimittel-behandlung Asthma (bronchiale) Desensibilisierung Ekzem Heuschnupfen Nahrungsmittelallergie Urtikaria



Antikoagulation	Definition	Medikamentöse Hemmung der Blutgerinnung
	Zu beachten	Immer Ursache der Einnahme abklären
	Registrierung	Nicht akzeptieren solange Einnahme. Je nach zugrundeliegender Krankheit. ev. Registrierung nach Absetzen
	CT / VT	Nicht akzeptieren solange Einnahme. Akzeptieren je nach zugrunde liegender Krankheit oder wenn Einnahme prophylaktisch und wenn Absetzung bis zur Entnahme möglich Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt
	MC	Wie CT / VT
	Siehe auch	Kardiale Erkrankung Kardiovaskuläre Erkrankung Medikamentenliste Phlebothrombose Vaskuläre Erkrankung, arteriell
Autoimmunerkrankung	Definition	Überschiessende Reaktion des Immunsystems gegen körpereigenes Gewebe. Reaktion kann durch G-CSF verstärkt / ausgelöst werden. Dies betrifft beispielsweise folgende Erkrankungen: <ul style="list-style-type: none"> • Blut: Autoimmunhämolytische Anämie • chronisch entzündliche rheumatische Erkrankungen (z.B. Spondylitis ankylosans / M. Bechterew, Reiter-Syndrom) • chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (z.B. M. Crohn, Colitis ulcerosa, siehe auch Zöliakie) • Haut & Haare: Lichen sclerosus, Sklerodermie, Pemphigus, Alopecia areata, Sjögren-Syndrom • Nieren: Glomerulonephritis • Schilddrüse: siehe auch Hashimoto-Thyreoiditis / Schilddrüsenerkrankung • ZNS: Guillain-Barré-syndrom, Multiple Sklerose, Myasthenia gravis • Systemerkrankungen: Sarkoidose, Systemischer Lupus erythematodes (SLE)
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	Ausschluss
	MC	Ausschluss
	Siehe auch	Hashimoto Thyreoiditis Schilddrüsenerkrankung Zöliakie



Durchfallerkrankung	Definition	Mögliche Erreger: Bakterien: z.B. Enterotoxischer E.coli, Vibrio cholerae (Cholera), Salmonella <u>enteritidis</u> (Salmonellose Typhus), Yersinia enterocolitica, Shigellen, Campylobacter, Clostridium difficile, <u>Salmonella typhi</u> (Typhus, Paratyphus) Viren: Rotavirus, Norovirus Darmparasiten: Würmer oder Protozoen, Giardia lamblia (Lambliasis)
	Zu beachten	Nach Frequenz und Dauer fragen, Ursache abklären
	Registrierung	Rückweisung für 2 Wochen nach vollständiger Genesung und Absetzen der Behandlung bei anderen Durchfallerkrankungen Rückweisung für 3 Monate nach vollständiger Genesung bei Cholera Rückweisung für 6 Monate nach vollständiger Genesung bei Shigellose, Yersiniose Nicht akzeptieren bei Typhus / Paratyphus Infektion (Salmonella typhi)
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	<u>siehe auch</u>	<u>Typhus / Paratyphus</u>
Nahrungsmittelvergiftung	Definition	Nahrungsmittelunverträglichkeit ausgelöst durch den Verzehr von Nahrungsmitteln mit giftigen (toxischen) Inhaltsstoffen a) Lebensmittelinfektion durch Aufnahme pathogener Keime (z.B. Campylobacter, Salmonellen, Cholera) b) Lebensmittelintoxikation: durch bakterielle Toxine (z.B. Enterotoxine von Staphylokokkus aureus, Bacillus, Clostridien), toxische Metalle, Pilztoxine, pflanzliche Toxine, Meerestier-Toxine Symptome je nach Toxin unterschiedlich, z.B. Pilze, Pflanzen
	Registrierung	Rückweisung 1/3/6 Monaten nach vollständiger Genesung und je nach Ursache Nicht akzeptieren bei Typhus- / Paratyphus-Infektion Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	<u>Siehe auch</u>	<u>Durchfallerkrankung</u> <u>Typhus</u>
	<u>Gehe zu</u>	<u>Durchfallerkrankung</u>



Typhus / Paratyphus	Definition	Typhus / <u>Paratyphus</u> ist eine meldepflichtige systemische Infektionskrankheit, die durch das Bakterium Salmonella typhi <u>bzw. Salmonella Paratyphi</u> hervorgerufen wird <u>und bei 1-4% der Genesenen zur Dauerausscheidung führt.</u>
	Registrierung	<u>Nicht akzeptieren</u>
	CT / VT	<u>Ausschluss Rückweisung für 1 Woche nach Abschluss der Behandlung und der vollständigen Genesung</u>
	MC	<u>Ausschluss wie CT / VT</u>
Hornhaut, Transplantation	Definition	Übertragung von Hornhaut (Cornea), Risiko der Übertragung von Prionen, vCreutzfeld-Jakob Krankheit
	Registrierung	<u>Nicht akzeptieren</u>
	CT / VT	<u>Ausschluss Wie Registrierung, Information an das TZ</u>
	MC	<u>Ausschluss Wie Registrierung, Risk acceptance durch TZ</u>
	Siehe auch	Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, Risiko 1_Übertragung von menschlichem Gewebe
Hypertonie, arteriell	Definition	Erhöhter Druck im arteriellen Gefässsystem. Meist nur unspezifische Symptome. <u>Definition: $\geq 160/100$ (Grad 2 gemäss ESH European Society of Hypertension)</u> Ursachen: Bis zu 95% primäre (essentielle Hypertonie): keine organische Ursache. In 5-15% sekundäre Hypertonie wegen Grundkrankheit, z.B. Störungen des Hormonsystems, Herz-Kreislaufsystems sowie Nierenschäden. Mögliche Folgeschäden: Koronare Herzkrankheit, Nierenversagen, Schlaganfall
	Registrierung	Akzeptieren, wenn unter antihypertensiver Therapie Blutdruck gut eingestellt und symptomfrei <u>Nicht akzeptieren, solange unter Abklärung</u> <u>Nicht akzeptieren, wenn dazu die Einnahme von Medikamenten mit mehr als 3 Wirkstoffen notwendig ist</u>
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
	Siehe auch	Bradykardie Kardiovaskuläre Erkrankung



Malaria, durchgemacht	Definition	Durchgemachte Infektion, Erreger: Parasit der Gattung Plasmodium
	Registrierung	Akzeptieren, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • Erkrankung vor > 3 Jahren und keine Krankheitszeichen mehr
	CT / VT	Akzeptieren wenn: <ul style="list-style-type: none"> • Erkrankung vor > 3 Jahren • Spender behandelt und seither asymptomatisch • Malaria-Test <u>vor CT negativ ist durchführen</u> (Antikörpertest und NAT) <p><u>(Durchführung im Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut, Basel empfohlen)</u></p>
	MC	Wie CT / VT Test bei Medical CheckUp wiederholen, auch wenn Test bei CT negativ war
Nadelstichverletzung	Definition	Verletzung mit potentiell kontaminierter Punktions- oder Injektionsnadel <u>vor allem im medizinischen Bereich. Dazu gehören auch: Tätowierung, Piercing, (Semi-) Permanentes Make-Up, elektrische Epilierung, Mikroblading.</u>
	Zu beachten	<u>Immer auf sterile Arbeitstechnik mit Einwegnadeln achten, Vorsicht bei Tätowierung / Piercing in Land mit erhöhtem Infektionsrisiko (nachfragen!)</u>
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren nur wenn kein Hinweis auf (bakteriellen) Infekt und keine Komplikationen vorliegen Rückweisung für 1 Monat nach Ereignis Rückweisung für 12 Monate, wenn Verabreichung von Hepatitis-B-Immunglobulin nach Nadelstichverletzung
	MC	Akzeptieren nur wenn kein Hinweis auf (bakteriellen) Infekt und keine Komplikationen vorliegen Rückweisung für 2 Monate nach Ereignis Rückweisung für 12 Monate, wenn Verabreichung von Hepatitis-B-Immunglobulin nach Nadelstichverletzung
Siehe auch	Akupunktur <u>Tätowierung, Piercing, (Semi-) Permanentes Make-Up, elektrische Epilierung, Mikroblading</u>	



Thrombophilie	Definition	<p>Thromboseneigung. Genetisch bedingte oder erworbene Neigung zur Bildung von Blutgerinnseln innerhalb von Blutgefässen (infolge veränderter Eigenschaften von Blutzellen, Blutplasma, Blutströmung oder Gefässwänden).</p> <p>Bis zu 50% erbliche Veranlagung, Faktoren der Blutgerinnung sind durch Genmutationen verändert.</p> <p>(Zusätzliche) Risikofaktoren: Rauchen, Übergewicht, Bewegungsmangel, Medikamente (v.a. oestrogenhaltige Kontrazeptiva), Schwangerschaft, Immobilisierung</p> <p>Die häufigsten sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • APC-Resistenz (Faktor-V-Leiden-Mutation) • Protein-C-Mangel • Protein-S-Mangel • Prothrombinmutation 20210 Mutation • Antithrombin-Mangel • Antiphospholipid-Antikörper / Lupus-Antikoagulans • Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ II <p>Andere Formen nach Rücksprache mit Arzt.</p>
	Registrierung	<p>Akzeptieren bei milder Thrombophilie (heterozygote Faktor-V-Leiden-Mutation, heterozygote Prothrombin 20210 Mutation), wenn</p> <ul style="list-style-type: none"> • Familienanamnese-Anamnese bland bezüglich thromboembolischen Ereignissen • Keine weiteren Risikofaktoren für Thrombosen bekannt sind <p>Nicht akzeptieren aller anderer Thrombophilien</p>
	CT / VT	Wie Registrierung
	MC	Wie Registrierung
Zöliakie	Definition	Glutenunverträglichkeit (Klebereiweiss von Weizen), Mischform einer Allergie und einer Autoimmunerkrankung.
	Registrierung	Nicht akzeptieren
	CT / VT	<p>Akzeptieren, bei gut kontrollierter Erkrankung mit minimalen Symptomen Ausschluss</p> <p>Nur Knochenmark-Spende erlaubt; Information an das TZ</p>
	MC	<p>Ausschluss wie CT / VT</p> <p>Risk acceptance durch TZ</p>
	Siehe auch	Autoimmunerkrankung



Tätowierung, Piercing, (Semi-) Permanentes Make-Up, elektrische Epi- lierung, Mikroblanding Neues Kriterium	Definition	Verletzung mit potentiell kontaminierter Punktions- oder Injektionsnadel
	Zu beachten	Immer auf sterile Arbeitstechnik mit Einwegnadeln achten, Vorsicht bei Tätowierung / Piercing in Land mit erhöhtem Infektionsrisiko (nachfragen! -> Information an TZ)
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Akzeptieren nur wenn kein Hinweis auf (bakteriellen) Infekt und keine Komplikationen vorliegen Rückweisung für 1 Monat nach Ereignis
	MC	Akzeptieren nur wenn kein Hinweis auf (bakteriellen) Infekt und keine Komplikationen vorliegen Rückweisung für 2 Monate nach Ereignis
	Siehe auch	Akupunktur Nadelstichverletzung
Nadelphobie Neues Kriterium	Definition	Ausgeprägte Angst vor Spritzen und Nadeln.
	Registrierung	Akzeptieren, wenn der Spender, die Spenderin umfassend über die Voruntersuchungen und das Verfahren der Blutstammzellspende aufgeklärt wurde und sich eine Entnahme vorstellen kann.
	CT / VT	Wie Registrierung Ermessen der Spendetauglichkeit durch Arzt
	MC	Wie CT / VT
Schwierige Venenverhältnisse Neues Kriterium	Zu beachten	Beim Vorliegen von schwierigen Venenverhältnissen müssen die Spenderinnen und Spender ausführlich über die Möglichkeit eines zentralen Venenkatheters aufgeklärt werden.
	Registrierung	Akzeptieren
	CT / VT	Beurteilung der Venenverhältnisse durch Blutentnahmeteam Der endgültige Entscheid über die Art der Entnahme liegt im Entnahmezentrums.
	MC	Wie CT / VT