



Annexe au mail d'information sur les changements des Prescriptions SBSC valide de 11.08.2025

Modifications des critères d'aptitude – Don de cellules souches du sang

1410 / 1411 / 1412_DOK_Donor_Eligibility_Criteria_Blood_Stem_Cell_Donation_D / F / I

Ce document décrit les nouveaux critères et les critères modifiés. Dans le cas des critères modifiés, les changements sont marqués.

Allergie	Définition	Réaction immunologique à un allergène (p. ex. médicament, aliment, piqûre d'abeille/de guêpe, etc.)
		<u>Classification des stades pour ce qui est des réactions aiguës :</u> Stade 1 : démangeaisons, rougeurs, urticaire, enflure Stade 2 : stade 1, rhinorrhée (nez qui coule) , enrrouement, essoufflement, nausées, vomissements, élévation de la fréquence cardiaque, chute de pression, arythmie Stade 3 : stade 1, vomissements, enflure des voies respira-toires, bronchospasme, choc Stade 4 : stade 1, vomissements, arrêt respiratoire, arrêt circulatoire
	À noter	Toujours informer le centre de prélèvement et le centre de transplantation de toute allergie Prendre garde en particulier aux réactions graves aux médicaments, tels les anesthésiques!!
	Enregistrement	Accepter en cas de stade 1 avec / sans traitement: <ul style="list-style-type: none">• seul traitement local / seul en cas de crise / seul thérapie par inhalation Ne pas accepter si <ul style="list-style-type: none">• réactions de stade 2 - 4• traitement peroral requis régulièrement• réaction anaphylactique connue
	CT / VT	Accepter en cas de stade 2 s'il s'agit d'un événement unique avec des allergènes connus qui ne pose pas de problème critique pour la mobilisation/le prélèvement Ne pas accepter si : <ul style="list-style-type: none">• Stade 3 - 4 Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT Aptitude à déterminer par le médecin
	Voir aussi	Allergie alimentaire Asthme bronchique Désensibilisation Eczéma Rhume des foins Traitement médicamenteux Urticaire



Anticoagulation	Définition	Inhibition médicamenteuse de la coagulation
	À noter	Toujours déterminer la cause de la médication
	Enregistrement	Ne pas accepter pendant la médication. Selon la maladie de base, évent. enregistrement après l'arrêt du traitement.
	CT / VT	<u>Ne pas accepter pendant la médication. Accepter selon maladie de base si arrêt de la médication possible jusqu'au prélèvement</u> <u>Accepter selon maladie de base si arrêt de la médication possible jusqu'au prélèvement</u> <u>Aptitude à déterminer par le médecin</u>
	MC	Comme CT / VT
	Voir aussi	Liste des médicaments Maladie cardiaque Maladie cardiovasculaire Maladie vasculaire artérielle Phlébothrombose
Blessure par piqûre d'aiguille	Définition	Blessure par piqûre d'une aiguille de ponction ou d'injection potentiellement contaminée. En font partie: le tatouage, le piercing, le maquillage permanent, l'épilation par aiguille, Microblading. <u>Blessure par piqûre d'une aiguille de ponction ou d'injection potentiellement contaminée, surtout dans un contexte médical.</u>
	À noter	Toujours veiller à une technique de travail stérile en utilisant des aiguilles à usage unique. <u>Attention si tatouage/piercing effectué dans un pays à risque élevé d'infections (demander!)</u>
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter seulement si aucun signe d'infection (bactérienne) et en absence de complications CIT de 1 mois après l'évènement CIT de 12 mois, si administration d'immunoglobulines anti-hépatite B après une piqûre d'aiguille
	MC	Accepter seulement si aucun signe d'infection (bactérienne) et en absence de complications CIT de 2 mois après l'évènement CIT de 12 mois si application d'Immunoglobulines anti-hépatite-B après une piqûre d'aiguille
	Voir aussi	Acupuncture <u>Tatouage, piercing, maquillage (semi-)permanent, épilation électrique, microblading</u>



Fièvre typhoïde / <u>paratyphoïde</u>	Définition	La fièvre typhoïde / <u>paratyphoïde</u> est une maladie infectieuse systémique soumise à l'obligation d'annoncer causée par la bactérie Salmonella typhi <u>ou paratyphi</u> . 1-4% des patients guéris restent porteurs à vie.
	Enregistrement	Ne pas accepter <u>Accepter</u>
	CT / VT	<u>CID-CIT d'une semaine après la fin du traitement et le rétablissement complet</u>
	MC	<u>CID-Comme CT / VT</u>
Greffe de la cornée	Définition	Greffe de la cornée, risque de transmission de prions, maladie de vCreutzfeldt-Jakob
	Enregistrement	<u>Accepter</u> Ne pas accepter
	CT / VT	<u>CID-Comme enregistrement, information au centre de transplantation</u>
	MC	<u>CID-Comme enregistrement, acceptation du risque par le centre de transplantation</u>
	Voir aussi	Creutzfeldt-Jakob, maladie de, risque 1_Greffe de tissu humain
Hypertension artérielle	Définition	Pression élevée dans le système artériel. Symptômes généralement non spécifiques <u>Définition : ≥160/100 (stade 2 conformément à l'European Society of Hypertension ou ESH)</u> Causes : primaires pour jusqu'à 95% des cas (hypertension essentielle) : aucune cause organique. Dans 5-15% des cas, hypertension secondaire due à une maladie de base, p. ex. troubles du système hormonal, du système cardiovasculaire et lésions rénales. Conséquences possibles : maladie coronarienne, défaillance rénale, accident vasculaire cérébrale (AVC)
	Enregistrement	Accepter si la pression sanguine est stable et que le donneur ne présente pas de symptôme grâce au traitement antihypertenseur <u>Ne pas accepter tant que l'évaluation est en cours</u> <u>Ne pas accepter si le donneur a besoin de médicaments contenant plus de trois principes actifs</u>
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	Voir aussi	Bradycardie Maladie cardiovasculaire



Intoxication alimentaire

Définition

~~Intolérance alimentaire déclenchée lors de la consommation de denrées alimentaires aux ingrédients toxiques~~

~~a) Infection par les denrées alimentaires causée par l'ingestion de germes pathogènes (p. ex. campylobacter, salmonelles, choléra)~~

~~b) Intoxication alimentaire due à des toxines bactériennes (p. ex. entérotoxine du staphylocoque doré, bacilles, clostridies), métaux toxiques, toxines fongiques, toxines végétales, toxines de poissons et fruits de mer~~

~~Symptômes variant selon la toxine, p. ex. champignons, plantes~~

Enregistrement

~~CIT de 1/3/6 mois après rétablissement complet et selon la cause~~

~~Ne pas accepter en cas d'infection par la fièvre typhoïde/paratyphoïde~~

~~Aptitude à déterminer par le médecin~~

CT / VT

~~Comme enregistrement~~

MC

~~Comme enregistrement~~

Voir aussi

~~Maladie diarrhéique~~

Se référer à

~~Maladie diarrhéique~~



Maladie auto-immune	Définition	Réaction excessive du système immunitaire contre ses propres tissus/cellules. La réaction peut être renforcée / déclenchée par le G-CSF. Maladies concernées,p.ex.: <ul style="list-style-type: none">• Sang: anémie hémolytique auto-immune• Maladies rhumatismales inflammatoires chroniques (p. ex. spondylarthrite ankylosante / maladie de Bechterew, syndrome de Reiter)• Maladies intestinales inflammatoires chroniques (p. ex. maladie de Crohn, colite ulcéreuse, voir aussi maladie cœliaque)• Peau & cheveux: lichen scléreux, sclérodermie, pemphigus, alopecie en aires, syndrome de Sjögren)• Reins: glomérulonéphrite• Thyroïde: voir Thyroïdite de Hashimoto / maladie de la thyroïde• SNC: syndrome de Guillain-Barré, sclérose en plaques, myasthénie grave• Maladies systémiques: sarcoïdose, lupus érythémateux systémique (SLE)
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID
	MC	CID
	Voir aussi	Maladie thyroïdienne Thyroïdite de Hashimoto Maladie cœliaque
Maladie cœliaque	Définition	Intolérance au gluten (protéine présente dans les céréales), forme mixte d'une allergie et d'une maladie auto-immune.
	Enregistrement	Ne pas accepter
	CT / VT	CID-Accepter en cas de maladie bien contrôlée avec des symptômes mineurs Seul don de moelle osseuse admis ; Information au centre de transplantation
	MC	CID Comme CT / VT Acceptation du risque par le centre de transplantation
	Voir aussi	Maladie auto-immune



Maladie diarrhéique	Définition	Agents possibles : Bactéries : p. ex. E. coli entérotoxique, Vibrio cholerae (choléra), <u>Salmonelles-Salmonella enteritidis (salmonellose)(typhus)</u> , Yersinia enterocolitica, Shigelles, Campylobacter, Clostridium difficile, <u>Salmonella typhi (fièvre typhoïde, fièvre paratyphoïde)</u> Virus: rotavirus, norovirus Parasites intestinaux: vers ou protozoaires, Giardia lamblia (lambliaise)
	À noter	Demander la fréquence et la durée, déterminer la cause
	Enregistrement	CIT de 2 semaines après rétablissement complet et arrêt du traitement lors des autres maladies diarrhéiques CIT de 3 mois après rétablissement complet en cas de choléra CIT de 6 mois après rétablissement complet en cas de shigellose, yersiniose Ne pas accepter en cas de typhus / d'infection paratyphoïde (Salmonella typhi)
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement
	<u>Voir aussi</u>	<u>Fièvre typhoïde / paratyphoïde</u>
Malaria, histoire de	Définition	Infection confirmée, pathogène: parasite du genre Plasmodium
	Enregistrement	Accepter si: <ul style="list-style-type: none">infection il y a > 3 ans et donneur est sans symptômes de la maladie depuis lors
	CT / VT	Accepter si: <ul style="list-style-type: none">infection il y a > 3 annéesdonneur a eu traitement et il est sans symptômes depuis lors<u>effectuer test de dépistage de la malaria malaria effectué avant le CT est négatif</u> (anticorps & NAT) <u>(exécution recommandée à l'Institut Tropical et de Santé Publique Suisse, Bâle)</u>
MC	Comme CT / VT Le test est répété au moment du Medical CheckUp, même si le résultat était négatif au CT	



Thrombophilie	Définition	<p>Prédisposition aux thromboses. Prédisposition génétique ou acquise à la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins (suite à une mutation des propriétés des cellules sanguines, du plasma sanguin, de la circulation sanguine ou de la paroi des vaisseaux sanguins). Prédisposition génétique dans jusqu'à 50% des cas, les facteurs de coagulation sanguine sont modifiés suite à des mutations génétiques.</p> <p>Facteurs de risque (supplémentaires) : tabagisme, excès pondéral, sédentarité, médicaments (surtout contraceptifs à base d'œstrogènes), grossesse, immobilisation.</p> <p>Facteurs les plus fréquents:</p> <ul style="list-style-type: none">• Résistance APC (mutation du facteur V de Leiden)• Carence en protéine C• Carence en protéine S• Mutation 20210 de la prothrombine• Carence en antithrombine• Anticorps antiphospholipides / anticoagulants lupiques• Thrombocytopénie induite par l'héparine de type II <p>Autres formes à discuter avec le médecin.</p>
	Enregistrement	<p>Accepter en cas de thrombophilie modérée (mutation hétérozygote du facteur V de Leiden, mutation 20210 hétérozygote de la prothrombine) si</p> <ul style="list-style-type: none">• l'anamnèse familiale ne contient pas d'événement thromboembolique pas d'antécédent d'événement thromboembolique• on ne connaît à la personne aucun autre facteur de risque de <p>Ne pas accepter toute autre forme de thrombophilie</p>
	CT / VT	Comme enregistrement
	MC	Comme enregistrement



Tatouage, piercing, maquillage (semi-)permanent, épilation électrique, microblading Nouveau critère	Definition	Blessure par piqûre d'une aiguille de ponction ou d'injection potentiellement contaminée, surtout dans un contexte médical.
	À noter	Toujours appliquer une technique de travail stérile avec aiguilles à usage unique, la prudence étant de mise en cas de tatouage / piercing dans un pays présentant un risque infectieux accru (demander! -> information au centre de transplantation)
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Accepter seulement si aucun signe d'infection (bactérienne) et en absence de complications CIT de 1 mois après l'évènement
	MC	Accepter seulement si aucun signe d'infection (bactérienne) et en absence de complications CIT de 2 mois après l'évènement
	Voir aussi	Acupuncture Blessure par piqûre d'aiguille

Phobie des aiguilles Nouveau critère	Définition	Peur démesurée des seringues et des aiguilles
	Enregistrement	Accepter si la donneuse ou le donneur, une fois informé-e de façon exhaustive des examens préalables et de la procédure de prélèvement de cellules souches du sang, peut envisager de s'y soumettre.
	CT / VT	Comme enregistrement Aptitude à déterminer par le médecin
	MC	Comme CT / VT

Accès veineux difficile Nouveau critère	À noter	En cas d'accès veineux difficile, la donneuse ou le donneur doit être informé-e avec précision de la pose possible d'un cathéter veineux central.
	Enregistrement	Accepter
	CT / VT	Evaluation de l'accès veineux par l'équipe responsable de la prise de sang. La décision définitive quant aux modalités du prélèvement incombe au centre de prélèvement.
	MC	Comme CT / VT